



GOVERNMENT OF TAMIL NADU

ہائر سکینڈری - سال دوم

HIGHER SECONDARY SECOND YEAR

کیمیاء

CHEMISTRY
(URDU MEDIUM)

جلد - I

VOLUME - I

Department of School Education

Untouchability is Inhuman and a Crime

Government of Tamil Nadu


First Edition - 2021

Revised Edition - 2022, 2023

Reprint - 2024

(Published under New Syllabus)

Content Creation



State Council of Educational
Research and Training
© SCERT 2021

Printing & Publishing



Tamil Nadu Textbook and Educational
Services Corporation

www.textbooksonline.tn.nic.in

Key features ...

	Scope of Chemistry	Awareness about higher education avenues in the field of Chemistry	
	Learning objectives	Describe the specific competency / performance capability acquired by the learner	
	Do you know	Additional information provided to relate the content to day-to-day life / development in the field	
	Example Problems	Model problems worked out for clear-cut comprehension by the learners	
	Evaluate yourself	To help the students to assess their own conceptual understanding	
	QR code	Quick access to concepts, videos, animations and tutorials	
	ICT	opens up resources for learning; enables the learners to access, extend transform ideas / informations	
	Summary	A glance on the substance of the unit	
	Concept map	Inter relating the concepts for enabling learners to visualize the essence of the unit	
	Evaluation	To assess the level of understanding through multiple choice question, numerical problems etc...	
	Books for Reference	List of relevant books for further reading	
	Key answers	To help the learners confirm the accuracy of the answers arrived and remedy the gaps in learning	
	Glossary	Important terms are enlisted with equivalent Tamil words	

VARIOUS RESEARCH INSTITUTES IN INDIA, RESEARCH AREAS AND WEBSITES ARE SUMMARIZED BELOW.

 INSTITUTE	 RESEARCH AREAS	 WEBSITE
Indian institute of Science (IISC) <i>Bengaluru, Karnataka</i>	❖ Peptides and peptidomimetics: Sugar amino acids ❖ Delivery of therapeutic oligonucleotides ❖ Carbohydrate-protein interactions ❖ Functional soft and hybrid materials ❖ Studies of dendrimers and liquid crystals ❖ Inorganic and organic semiconductors	www.iisc.ac.in
Indian Institute of Technology (IITM) <i>Chennai, Tamilnadu</i>	❖ Statistical Correlations and Information Processing ❖ Ionic liquid-templated ordered mesoporous aluminosilicates ❖ Energy and fuel research ❖ Molecular engineering of materials ❖ Environmental science and engineering ❖ Catalysis and soft matter ❖ System engineering and data science	www.iitm.ac.in
National Chemical Laboratory(NCL) <i>Pune, Maharashtra</i>	❖ Chemical Science ❖ Chemical Engineering ❖ Catalytic materials ❖ Nano materials ❖ Chemical looping combustion(CLC)	www.ncl-india.org
Indian Institute of Chemical Technology (IICT) <i>Hyderabad, Telangana</i>	❖ Pharmaceuticals & Drugs ❖ Energy (Solar Coal) ❖ Polymer & Functional Technology ❖ Chemical Engineering ❖ Membrane Technology	www.iictindia.org
Central Electrochemical Research Institute (CECRI) <i>Karaikudi, Tamil Nadu.</i>	❖ Li Batteries ❖ Corrosion ❖ Bio-Sensors ❖ Materials Electrochemistry ❖ Electro catalysis and Fuel Cells	www.cecni.res.in

 INSTITUTE	 RESEARCH AREAS	 WEBSITE
Central Drug research institute (CDRI) <i>Lucknow, Uttar Pradesh.</i>	❖ Drug design ❖ Pharmaceuticals and Biomedical Research	www.cdri.res.in
Central Salt & Marine Chemicals Research Institute <i>Bhavnagar, Gujarat</i>	❖ Salt and Marine Chemicals ❖ Inorganic Materials and Catalysis ❖ Electro Membrane Processes ❖ Reverse Osmosis	www.csmcri.org
National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) <i>Mohali, Punjab.</i>	❖ Development of oral anti diabetic drugs ❖ Nano crystalline solid ❖ Xanthine oxidase inhibitors ❖ Microbial and marine origin for therapeutic purposes ❖ Standardization and quality control of herbal drugs and products ❖ Development of chemical process technologies for important natural products involving isolation	www.niper.gov.in
Institute of Nano Science and Technology (INST) <i>Mohali, Punjab</i>	❖ Bio-inspired soft nanostructures ❖ Bio-sensors and online diagnostics ❖ Bio-targeting and therapeutics ❖ Microfluidics based devices ❖ Materials and devices for energy storage and harvesting ❖ Nanotechnology in Agriculture and Rural Development ❖ Nano toxicology	www.inst.ac.in
Laboratory of Advanced Research in Polymeric Materials (LARPM) <i>Bhubaneswar, Orissa.</i>	❖ Biopolymer ❖ Fuel Cells ❖ Polymer Nano composite ❖ Carbon Nanotubes ❖ Polymer Blends & Alloys ❖ E Waste Recycling	www.larpm.gov.in
Tata institute of fundamental research (TIFR) <i>Mumbai, Maharashtra</i>	❖ Molecular biophysics and imaging ❖ Chemical biology and synthetic chemistry ❖ Bioinorganic and biomimetic chemistry ❖ Nano science and catalysis ❖ Chemical physics and dynamics	www.tifr.res.in

LIST OF ENTRANCE EXAMINATIONS AFTER HSC

 NAME OF THE EXAM	 MODE OF SELECTION	 COURSE	 WEBSITE
NEET (National Eligibility cum Entrance test)	Written test	MBBS., BDS.,	www.cbseet.nic.in
AIIMS (All India Institute of Medical Sciences)	Written test	MBBS.,	www.aiimsexams.org
JIPMER (Jawaharlal Institute Of Postgraduate Medical Education & Research)	Computer based test	MBBS.,	www.jipmer.edu.in
AFMC (Armed Forces Medical College Entrance Exam)	Written test	M.B.B.S., (Should Serve 7 Years in Armed Forces)	www.afmc.nic.in
IIT – JEE (IIT- Joint Entrance Exam)	Written test	B.E., B.Tech., B.Arch.,	www.jeemain.nic.in
CUCET (Central Universities Common Entrance Test)	Written test	Integrated M.Tech., B.Tech., Integrated B.Sc., B.Ed., Integrated M.Sc., Integrated M.A., B.Des., (craft and design)	www.cucet.co.in
NISER (National Institute of Science Education and Research)	Written test	Integrated M Sc., (Biology, Chemistry, Mathematics and Physics)	www.niser.ac.in
IISC (Indian Institute of Science Bangalore)	Written test	B.Sc., (4 years)	www.iisc.ernet.in

 NAME OF THE EXAM	 MODE OF SELECTION	 COURSE	 WEBSITE
IISER (Indian Institutes of Science Education and Research)	Written test	5-year BS-MS dual degree (Biology, Chemistry, Mathematics and Physics) **IISER Kolkata offers major in Earth Sciences	www.iiserpune.ac.in
NATA (National Aptitude Test in Architecture)	Computer Based Test	B.Arch.,	www.nata.in
NIFT (national institute of fashion technology)	Written test	B.Des., BFTech.,	www.nift.ac.in
IIFT (indian institute of fashion technology)	Written test	B.Sc., (in fashion & apparel design)	www.iiftbangalore.com
NID NEED (National Entrance Exam for Design)	Written test	B.Des., (4 years)	www.nid.edu
IIST (Indian Institute of Space Technology)	Written test	B.Tech., (Avionics/ Aerospace Engineering/ Physical Science)	www.iist.ac.in
CLAT (Common Law Admission Test)	Written test	Integrated LLB (5 years)	www.cbcsneet.nic.in
NCHMCT (National Council for Hotel Management Catering Technology Joint Entrance Exam)	Written test	B.Sc., (Hospitality and Hotel Administration)	www.nchm.nic.in
NDA and NA (National Defence Academy and Naval Academy)	Written Exam	3 Years Training for entry into ARMY/ NAVY/AIRFORCE	www.nda.nic.in
AIMNET (All India Merchant Navy Entrance Test)	Written Exam	B.Tech., Marine Engineering B.Sc., Nautical Science B.Tech.,Navel Architecture and Ship Building	www.aim.net.co.in

VARIOUS SCHOLARSHIP SCHEME OFFERED AFTER HSC

 CENTRAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS OFFERED	 OFFERED BY	 APPLICATION PERIOD
Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students	Ministry of Human Resource Development, Government of India	July to October
Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (KVPY)	Department of Science and Technology (DST), Government of India	June to August
Inspire Scholarship	Department of Science and Technology (DST), Government of India	October to December
ONGC scholarship (Applicable for SC/ST Students)	Oil and Natural Gas Corporation Limited	January to March
National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students	Ministry of Tribal Affairs, Government of India	July to October
MOMA scholarship (applicable only for Minority students)	Ministry of Minority Affairs, Government of India	July to September
Scholarships for Top Class Education for Students with Disabilities	Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India	July to October
Saksham Scholarship (Applicable for Disable students)	AICTE	September to November
AICTE Pragati scholarship for Girls	AICTE	September to November

مضامین CONTENTS

CHEMISTRY کیمیاء

نمبر	عنوان	Topic	صفحہ نمبر	مہینہ
I	دھات سازی	Metallurgy	01	جون
2	p- بلاک عناصر - I	p-Block Elements-I	26	جون
3	p- بلاک عناصر - II	p-Block Elements - II	56	جولائی
4	مروری (عبوری) اور اندرونی مروری (عبوری) عناصر	Transition and Inner Transition Elements	100	اگست
5	کوآرڈینیٹیشن کیمیاء	Coordination Chemistry	130	اکتوبر
6	ٹھوس حالت	Solid State	176	جون
7	کیمیائی حرکیات	Chemical Kinetics	204	جولائی
	جوابات	Answers	234	
	عملی مشق (پریکٹس)	Practicals	256	
	اصطلاحات	Glossary	280	



E-book



Assessment

دھات سازی (METALLURGY)

اکائی
1



سیکھنے کے مقاصد



اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء یہ جان چکے ہوں گے۔

❖ کچھ دھاتوں کی ارتکاز کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں گے۔

❖ خام دھاتوں کی تخلص کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں گے۔

❖ دھات سازی کے عمل میں مختلف حرر کی اصولوں کا اطلاق کریں گے۔

❖ پلنگھم نقشوں کے ذریعہ تحویل کے عمل کے لئے مناسب حالت کا اندازہ لگائیں گے۔

❖ دھات سازی کے عمل میں برق کیمیائی اصولوں کی وضاحت کریں گے۔

❖ دھات سازی کے حصول میں برقی کیمیائی اصولوں کو عمل میں لائیں گے۔

❖ برقی تخلص کے لئے برقیروں کے تعامل کی وضاحت کریں گے۔

❖ Al, Sn, Fe, Cu, Au کے استعمالات کی فہرست بنائیں گے۔



Harold Johann Thomas Ellingham
(1897–1975)

ہیرالڈ جوہان تھامس پلنگھم

پلنگھم ایک انگریزی طبیعیاتی کیمیاء دان اپنے پلنگھم کے نقشوں کے لئے پہچانے جاتے ہیں۔ دھاتوں کے پلنگھم کے نقشے بہت زیادہ اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ یہ نقشے مناسب حرر کی حالت پیش کرتے ہیں، جس سے ایک دھات تحویل پاتی ہے۔ پلنگھم نے مختلف دھاتی آکسائیڈوں کی تپش کا استحکام کا موازنہ کیا۔ پلنگھم کے دور سے پہلے سے بھی کاربن یا کاربن مونوآکسائیڈ کی مدد سے دھاتی آکسائیڈ سے دھاتوں کی تحویل کا عمل چلا آ رہا ہے، مگر پلنگھم نے اسے سائنسی طریقہ سے ثابت کیا۔

تعارف (Introduction)

دھات سازی، دھاتوں سے متعلق سائنس اور ٹکنالوجی پیش کرتے ہیں۔ قدرت میں صرف بعض دھاتیں فطری طور پر پائے جاتے ہیں۔ اکثر دھاتیں اُن کے آکسائیڈ، سلیکیٹ یا سلفائیڈ وغیرہ کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ انسان، قدیم تہذیب کے دور ہی سے دھات سازی کے عمل سے واقف ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ آس پاس موجود دھاتوں کو آگ میں پگھلا کر استعمال کرنے کے عمل سے واقف تھے۔ وہ زمین کے اوپر موجود کچے دھاتوں کو پگھلا کر استعمال کرتے تھے۔ موجودہ دور میں ہم جس دھات سازی کے طریقے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی قدیم زمانے کی دھات سازی کی جدید قسم ہے۔ بھرتوں کے خواص کے مطابق ان کا حصول ہماری ضرورت بن گیا ہے۔ دھات سازی کے لئے ایسے مناسب طریقے تلاش کئے جائیں جو ماحول دوست ہوں اور کم سے کم فضلات ماحول میں خارج کریں اور توانائی کو کارکردگی سے استعمال کریں۔ اقتصادی اور ٹکنیکی ترقی کے لئے ایسے ہی جدید طریقے درکار ہیں جن سے دھات سازی کا عمل آسانی سے ساتھ ہو۔ اس اکائی میں ہم دھات سازی کے مختلف مرحلوں اور اس میں کونسا اصول استعمال ہوتا ہے، اس سلسلے میں جانکاری حاصل کریں گے۔

1.1 دھاتوں کا پایا جانا (Occurrence of metals)

عام طور پر خالص دھاتیں چمک دار، متوتر اور متورق ہوتے ہیں، جب کہ قدرت میں اکثر یہ ان کے مرکبات کے طور پر پائے جاتے ہیں، جن کے کیمیائی خواص مختلف ہوتے ہیں۔ دھاتیں جن کی متعاملیت بالکل کم ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پر اصلی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ تانبا، چاندی، سونا، اور پلاٹینم جیسی دھاتوں کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ زیادہ تعامل پذیر دھاتیں، جیسے قلعہ دھاتیں، مخلوط حالت میں پائی جاتی ہیں۔ ان کو بعض مخصوص دھات سازی کے عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

1.1.1 معدنیات اور کچے دھاتیں (Minerals and ore)

قدرتی طور پر موجود شے جو آکسائیڈ یا سلفائیڈ کی شکل میں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی دھات پائی جاتی ہے معدنیات (Mineral) کہلاتی ہے۔ اکثر معدنیات میں مطلوبہ دھاتوں کی مقدار کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تقریباً 800 معدنیات ہی میں کچے دھات پائے جاتے ہیں۔ تاہم لوہے کے حصول کے لئے ہیماٹائیٹ اور میگنائٹ استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں لوہے کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ ایسی معدنیات جن میں دھات کافی صد زیادہ ہوتا ہے، اور جن کا حصول آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ کچے دھات (Ore) کہلاتی ہیں۔ لہذا تمام کچے دھاتیں معدنیات ہیں، جب کہ تمام معدنیات کچے دھات نہیں ہوتیں۔

ایک اور مثال پرغور کیجئے۔ باکسائیٹ اور چینی چکنی مٹی (China clay) ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$) دونوں الوٹیم کی معدنیات ہیں۔ باکسائیٹ سے الوٹیم آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جبکہ چینی چکنی مٹی سے نہیں۔

میلا چائٹ - تانبے کا معدن



چنانچہ باکسائیٹ ایک کچے دھات ہے اور چینی مٹی کچے دھات نہیں۔

کسی کچے دھات سے مطلوبہ دھات کو حاصل کرنے کے درج ذیل مرحلے ہیں۔

(i) کچے دھات کا ارتکاز

(ii) خام دھات کا حصول

(iii) خام دھات کی تخلیص

جدول 1.1 بعض دھاتوں کی فہرست اور ان کی عام کچ دھاتیں اور ان کے کیمیائی ضابطے

دھات Metal	کچ دھات Ore	ترکیب Composition	دھات	کچ دھات Ore	ترکیب
Aluminum الومینیم	Bauxite	$Al_2O_3 \cdot nH_2O$	Zinc	Zinc blende or Sphalerite	ZnS
	Diaspore	$Al_2O_3 \cdot H_2O$		Calamine	$ZnCO_3$
	Kaolinite	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$		Zincite	ZnO
Iron لوہا	Haematite	Fe_2O_3	Lead	Galena	PbS
	Magnetite	Fe_3O_4		Anglesite	$PbSO_4$
	Siderite	$FeCO_3$		Cerrusite	$PbCO_3$
	Iron pyrite	FeS_2	Tin	Cassiterite (Tin stone)	SnO_2
	Limonite	$Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$	Silver	Silver glance (Argentite)	Ag_2S
Copper تانبا	Copper pyrite	$CuFeS_2$		Pyrargyrite (Ruby silver)	Ag_3SbS_3
	Copper glance	Cu_2S		Chlorargyrite (Horn Silver)	$AgCl$
	Cuprite	Cu_2O		Stefinite	Ag_5SbS_4
	Malachite	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$		Proustite	Ag_3AsS_3
	Azurite	$2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$			

1.2 کچ دھاتوں کا ارتکاز (Concentration of ores)

عام طور پر دھاتوں میں غیر دھاتی لوٹ، چٹانی اشیاء اور سیلکانی اشیاء پائی جاتی ہیں۔ جنہیں مجموعی طور پر گل معدن کہا جاتا ہے۔ دھات سازی کا اولین مرحلہ ان لوگوں کو الگ کرنا ہے۔ الگ کرنے کے مرحلے کو ارتکاز کہتے ہیں۔ یہ مطلوبہ دھات کے ارتکاز کو بڑھاتا ہے۔ کچ دھات کی فطرت، لوٹ کی قسم اور ماحول، عوامل کی مناسبت سے ارتکاز کے لئے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض عام طریقے یہاں زیر بحث ہیں۔

1.2.1 تجاذبی طریقہ یا ماقوائی دھلائی (Gravity separation or Hydraulic wash)

اس طریقے میں زیادہ کثافت اضافی والی کچ دھات سے کم کثافت اضافی والی گل معدن کو دوڑتے ہوئے پانی میں بہا کر الگ کیا جاتا ہے۔ کچ دھات کو پٹیں کرنیس ذرات بنائے جاتے ہیں۔ ان کو دوڑتے پانی میں بہایا جاتا ہے۔ ہلکے لوٹ بہتے پانی میں بہہ جاتے ہیں جب کہ وزنی کچ دھات نیچے جمع ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ سے عام طور پر سونا، ہیماٹائٹ (Fe_2O_3) اور ٹن اسٹون (SnO_2) وغیرہ کو ارتکاز کیا جاتا ہے۔

1.2.2 جھاگ کے تیراؤ کا طریقہ : (Froth Flotation)

اس طریقہ سے عام طور پر سلفائڈ کی کچھ دھات جیسے PbS، سیسہ کی کچھ دھات (Zns) کا ارتکا ز کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں کچھ دھات کے دھاتی ذرات جوتیل میں بھیک جاتے ہیں، گل معدن سے جدا ہو کر انہیں الگ کر لیا جاتا ہے۔




Figure 1.1 Froth Flotation

خاکہ 1.1 جھاگ کا تیراؤ


شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے دیگر کچھ دھات میں مطلوبہ کچھ دھات کی جھاگ نہ مل جائے۔ مثال کے طور پر PbS کی کچھ دھات میں ZnS جیسی لوٹ شامل ہو تو، ZnS کو جھاگ بننے سے روکنے کے لئے سوڈیم سیانائڈ شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے $Na_2[Zn(CN)_4]$ نامی پیچیدہ مرکب بن جاتا ہے جو ZnS کی سطح پر ایک تہہ بنالیتا ہے۔

1.2.3 دھلائی یا ترویق (Leaching)

آبی محلول میں ایک مناسب محلل کے ذریعہ کچھ دھات کو حاصل کرنے کا طریقہ دھلائی کہلاتا ہے۔ اس طریقہ میں پسی ہوئی کچھ دھات کو ایک مناسب میں حل کیا جاتا ہے اور جو کچھ دھات اس میں پائی جاتی ہے، اسے اس کے حل پذیر نمک یا پیچیدہ (Complex) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب کہ نائل پذیر گل معدن الگ ہو جاتا ہے۔ درج ذیل مثالیں دھلائی کے عمل کی وضاحت کرتا ہے۔

سیانائڈ کی دھلائی : (Cyanide leaching)

فرض کریں کہ سونا کی کچھ دھات کا ارتکا ز کیا جا رہا ہے۔ سونے کی کچھ دھات کو پسی کر سوڈیم سیانائڈ کے ہلکے ہوئے ہوائی محلول سے دھوئیں۔ سونا حل پذیر سیانائڈ پیچیدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الومینوسلیکیٹ بطور گل معدن نائل پذیر رہتا ہے۔



تحویل کے عمل سے مطلوبہ دھات کو اس کے پیچیدہ سے حاصل کرنا

بغیر آکسیجن کے دھلائی کے محلول کے ساتھ Zn کو تعامل کر کے سونے کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں سونے کو اس کی عنصری حالت (صفر تکسیدی حالت) (Zero Oxidation state) میں تحویل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو جوڑنے کا عمل Cementation کہا جاتا ہے۔




امونیا دھلائی (Ammonia leaching)


نکل، تانبا اور کوہالت کی پسی ہوئی کچھ دھات کو مناسب دباؤ پر مائع شدہ امونیا کے ساتھ تعامل کیا جائے تو تمام دھاتیں اپنے مناسب حل پذیر پیچیدہ (Complex) بناتے ہیں اور گل معدن کو تہہ نشین کر دیتے ہیں۔ یہ گل معدن لوہا (III) آکسائیڈ یا ہائیڈراکسائیڈ اور الومینوسیلیکیٹ کی شکل میں موجود رہتا ہے۔

قلوی (القلی) کی دھلائی (Alkali leaching)

اس طریقے میں کچھ دھات آبی قلوئی محلول کے ساتھ تعامل کی جاتی ہے، جس سے وہ حل پذیر پیچیدہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر باکسائیٹ جو الومینیم کی ایک اہم کچھ دھات ہے، اسے سوڈیم ہائیڈراکسائیڈ یا سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ 470-520 K تپش اور 35 فضائی دباؤ پر گرم کیا جاتا ہے تو حل پذیر سوڈیم میٹالو مینیٹ بنتا ہے، اور لوئش ائرن آکسائیڈ اور ٹیٹانیم آکسائیڈ کی صورت میں الگ ہو جاتی ہیں۔



اس گرم محلول کو دھلا کر ٹھنڈا کر کے ہلکایا جاتا ہے۔ اس محلول میں CO₂ گیس گزار کر ہائیڈریٹ Al₂O₃ کا رسوب بننے دیا جاتا ہے۔



اس رسوب کو تقطیر کر کے 1670 K تپش پر گرم کر کے خالص Al₂O₃ حاصل کیا جاتا ہے۔

ترشوی دھلائی (Acid leaching)

ZnS, PbS جیسی سلفائیڈ کی کچھ دھاتیں کی دھلائی کے لئے گرم آبی سلفیورک ترشہ کی دھلائی کی جاتی ہے۔




اس عمل میں نائل پذیر سلفائیڈ کی کچھ دھات حل پذیر سلفیٹ اور عنصری سلفر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

خود کا محاسبہ 1

- 1۔ سوڈیم سلفائیڈ کی دھلائی کے طریقہ سے چاندی کے حصول کے لئے مساوات لکھئے۔
بتائیے کہ دھلائی کا یہ عمل ایک تکسلی (Redox) تعامل ہے۔

1.2.4 متناطیسی علیحدگی (Magnetic Separation)



متناطیسی خصوصیت پائی جانے والی اشیاء کو ان کے لوٹوں سے الگ کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر Tinstone کو اس کے Wulframite کی لوٹ سے الگ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں متناطیسی خواص پائے جاتے ہیں۔

اسی طرح کرومائٹ، پیرولوسائٹ، جن میں متناطیسی خواص پائے جاتے ہیں، ان کو ان کے غیر متناطیسی سیلکانی لوٹ سے الگ کیا جاتا ہے۔ پسپ ہوئی کچ دھات کو

ایک بیلٹ سے گزارا جاتا ہے، جو دو متناطیسی پہیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ متناطیسی کچ دھات کا ڈھیر ایک طرف جمع ہو جاتا ہے جب کہ غیر متناطیسی لوٹ کا ڈھیر الگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ خاکہ 1.2 میں دکھایا گیا ہے۔



1.3 خام دھات کا حصول (Extraction of crude metal)

خام دھات کے حصول کے دو مرحلے ہیں۔ (i) آکسائیڈ والی کچ دھات کو مطلوبہ دھات میں تبدیلی (ii) دھاتی آکسائیڈ کی دھات میں تحویل مرکز کچ دھات میں دھات مثبت تکسیدی حالت (positive oxidation state) میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اس کو بھی اس کی عنصری حالت میں تحویل کیا جاسکتا ہے۔ حرکیات کے اصول سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دیگر مرکبات کی بہ نسبت کچ دھات کے آکسائیڈ کی تحویل آسان ہے۔ لہذا تحویل سے پہلے کچ دھات کو اس کے آکسائیڈ کی شکل میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ کچ دھاتوں کو ان کے دھاتی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے بعض عام طریقوں آئیے تبادلہ خیال کریں گے۔

1.3.1 کچ دھاتوں کو ان کے آکسائیڈ میں تبدیل کرنا (Conversion of ores into oxides)


بھونا (Roasting)

عام طور پر سلفائیڈ کی کچ دھات کو آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لئے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں مرکز کچ دھات کو آکسجن کے ساتھ ایک مناسب بھٹی میں اس کے نقطہ پگھلاؤ سے کم تپش پر گرم کیا جاتا ہے۔



بھوننے کے عمل سے ارسنک، سلفر، فاسفورس جیسے لوٹ ان کے طیران پذیر (Volatile) آکسائیڈ میں تبدیل ہو کر الگ ہو جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر



بھوننے کے دوران خارج ہونے والی SO_2 گیس ماحول کے لئے بہت ہی مضر ہے۔ جدید دھات سازی کی صنعتوں میں SO_2 کو حاصل کر کے H_2SO_4 تیار کیا جاتا ہے تاکہ ہوائی آلودگی نہ ہو۔




تقلیس کاری (Calcination)

ہوا کی غیر موجودگی میں مرکب شدہ کچھ دھات کو اچھی طرح گرم کرنے کا عمل تقلیس کہلاتا ہے۔ اس عمل کے دوران آئیدہ آکسائیڈ میں موجود قلماء کا پانی، بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی نامیاتی مادہ ہو تو وہ بھی مسام دار کچھ دھات کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ کو کم ہوا داخل کر کے بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر تقلیس کے دوران کاربونیٹ کی کچھ دھات سے CO_2 گیس خارج ہوتی ہے۔



آئیدہ کچھ دھات میں، آئیدہ پانی، بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔



خود کا محاسبہ 2

2- میگنسا سائٹ (Magnesium Carbonate) کی تکلیس سے میگنیشیا حاصل کیا جاتا ہے، جس کو آگ مزاحم اینٹیں بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تخلیقی تعامل کی مساوات لکھئے۔

1.3.2 دھاتی آکسائیڈس کی تحلیل (Reduction of metal Oxides)


کاربن، کاربن مونو آکسائیڈ، ہائیڈروجن، الوٹیم اور دیگر متعامل دھاتیں جیسے سوڈیم وغیرہ تھویلی عامل ہیں۔ ان کے استعمال سے دھاتی آکسائیڈ کو خام دھات میں تحلیل کیا جاتا ہے۔ تھویلی عامل کا اختیار اس دھات کی خصوصیت پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سوڈیم، پوٹاشیم، الوٹیم وغیرہ جیسی متعامل دھاتوں کو حاصل کرنے کے لئے کاربن کو استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ZnO , Al_2O_3 جیسے آکسائیڈ کی تحلیل کے لئے CO کو استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ لنگھم کے نقشے کے استعمال سے دھاتوں کی تحلیل کے لئے مناسب تھویلی عامل تجویز کیا جاسکتا ہے۔

پگھلانا (Smelting)



اس طریقہ میں ایک مناسب گدازندہ (Flux) (ایک کیمیائی شے جو کاربن، کاربن مونو آکسائیڈ یا الوٹیم جیسے تھویلی عامل کے ساتھ مل کر آسانی سے پگھلنے والا دھاتی میل بن جائے) کو کچھ دھات کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اور اس آمیزہ کو ایک بھٹی میں دھات کے نقطہ پگھلاؤ سے زیادہ تپش پر گرم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کاربن مونو آکسائیڈ کے استعمال سے لوہے کے آکسائیڈ کی کچھ دھات کی تحلیل اس طرح سے کی جاتی ہے۔



حصول کے دوران، چونے کے پتھر (CaO) کو بنیادی گدازندہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ کچھ دھات میں موجود سیلیکا کے گل معدن کی خاصیت ترشوی ہے، یہ چونے کے پتھر کے ساتھ مل کر کیلشیم سلیکیٹ نامی دھاتی میل (Slag) بن جاتا ہے۔



کا پر پریٹس سے تانبے کے حصول کے دوران، مرکب شدہ کچھ دھات کو انوکاسی بھٹی (reverberatory furnace) میں گرم کرتے وقت سیلیکا شامل کیا جاتا ہے جس کی نوعیت ترشوی ہے۔ فیرس آکسائیڈ کچھ دھات کی نوعیت اساسی ہے۔ یہ سیلیکا کے ساتھ تعامل پا کر فیرس سلیکیٹ (دھاتی میل) بناتا ہے۔ باقی دھاتی سلفائیڈ جیسے Cu_2S جو حل پذیر ہیں، حل ہو کر تانبے کا میل matte بناتے ہیں۔



تانبے کے میل (matte) کو دھاتی میل سے الگ کیا جاتا ہے اور مبدل بھٹی میں داخل کیا جاتا ہے۔ تبدیلی کے دوران تانبے کے میل میں موجود FeS کی تکسید سے FeO میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کو سیلیکا کے ساتھ تعامل کر کے دھاتی میل کی طرح جدا کیا جاتا ہے۔ باقی تانبے کے سلفائیڈ کی مزید تکسید سے اس کا آکسائیڈ حاصل کیا جاتا ہے، جس کو درج ذیل طریقے سے دھاتی تانبے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔




SO₂ گیس کے خارج ہونے سے دھاتی تانبے میں آبلہ نماداغ پائے جاتے ہیں جس کو دوبارہ ٹھوس شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے تانبے کو آبلہ دار تانبا (blistered copper) کہا جاتا ہے۔

کاربن کے ذریعہ تحویل: (Reduction by Carbon)

اس طریقہ میں دھاتی آکسائیڈ کی کچھ دھات کو کونڈ (کوک) کے ساتھ ایک بھٹی (جھکڑ بھٹی) کے ذریعہ گرم کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایسی دھاتوں کے ساتھ عمل میں لایا جاتا ہے، جو تحویلی تپش میں کاربن کے ساتھ تعامل پا کر کاربائیڈ نہ بنے۔

مثالیں:




ہائیڈروجن کے ذریعہ تحویل: (Reduction by Hydrogen)

اس طریقہ کو ایسی دھاتی آکسائیڈ (Fe, Pb, Cu) کے ساتھ عمل میں لایا جاتا ہے، جن کی برق مثبت خاصیت (Electropositive charge) ہائیڈروجن سے کم ہو۔



ہائیڈروجن اور کاربن مونو آکسائیڈ (آبی گیس) کے آمیزہ کو استعمال کر کے نکل آکسائیڈ کو تحویل کر کے نکل حاصل کیا جاتا ہے۔



دھاتوں کے ذریعہ تحویل: (Reduction by metals)

الومینو تھرمک روش کے ذریعہ Cr₂O₃ جیسی دھاتی آکسائیڈ کی تحویل کی جاسکتی ہے۔ اس عمل کے دوران دھاتی آکسائیڈ کے ساتھ الومینیم کے سفوف کو شامل کیا جاتا ہے اور اسے آگ مزاحم مٹی کے کٹورے میں رکھا جاتا ہے۔ تحویلی عمل کو شروع کرنے کے لئے احتراقی آمیزہ (عام طور پر میگنیشیم اور بیریم پر آکسائیڈ) کو استعمال کیا جاتا ہے۔




اوپر کے تعامل کے دوران کثیر مقدار میں تپش کا اخراج ہوتا ہے 2400°C تک تپش اور تعامل کی حرر کی توانائی [Enthalpy]

$(852 \text{ KJ mol}^{-1})$ ۔ اس سے الوٹیم کے سفوف کے ذریعہ Cr_2O_3 کی تحویل کامل شروع ہو جاتا ہے۔




دھاتی آکسائیڈ کی تحویل کے لئے اعلیٰ تعامل والی دھاتیں جیسے سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔




خود کار تحویل (Auto-reduction)

بعض کچ دھاتوں کو محض بھوننے سے خام دھاتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں تحویلی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر پارہ کی کچ دھات (HgS) سنا بار کو بھون کر پارہ حاصل کیا جاتا ہے۔



1.4 دھات سازی میں حرر کیاتی اصول (Thermodynamic principle of Metallurgy)

جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، کسی بھی دھات کو اس کے دھاتی آکسائیڈ کی تحویل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دھاتی آکسائیڈ M_xO_y کی تحویل کو فرض کریں۔



اوپر کے تعامل کو کاربن کے بغیر بھی تحویل کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تحویلی عامل کاربن کو تکسید کر کے CO یا CO_2 بنایا جاسکتا ہے۔



اگر کاربن مونو آکسائیڈ کو بطور تحویلی عامل استعمال کیا جاتو، وہ تکسید پا کر CO_2 بن جاتی ہے، اس کی وضاحت اس طرح سے ہے۔




حرر کیات کی سفارشات کے مطابق ایک مناسب تحویلی عامل کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک فوری تعامل میں آزاد توانائی (ΔG)

(Free energy) منفی ہونی چاہئے۔ چنانچہ حرر کیاتی طور پر، ایک تحویلی عامل [مساوات (2)، (3)، (4)] کے استعمال سے کسی دھاتی آکسائیڈ

[مساوات (1)] کی تحویل اُسی وقت ہوگی، جب اس کے تعامل کی آزاد توانائی منفی ہو۔ [مساوات (1) اور (2)، (1) اور (3)، یا (1) اور (4)]۔
لہذا تحویلی عامل کا انتخاب اس طرح سے کیا جاتا ہے وہ تعامل میں ΔG کی زیادہ منفی قیمت رکھتا ہو۔

1.4.1 آئکنگھم کا نقشہ (Ellingham diagram)



1.4 آئکنگھم کا نقشہ (Ellingham diagram)

ایک تعامل میں گیس فری انرجی (گیس کی آزاد توانائی) (ΔG) کو اس جملے کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \text{ ----- (1)}$$

جس میں ΔH انتھالپی کی تبدیلی ہے، T کلون اسکیل میں پیش اور ΔS انٹروپی کی تبدیلی ہے۔ ایک متوازن عمل میں متوازن کامستقلہ کے استعمال سے DG° کو اس طرح محسوب کیا جاسکتا ہے۔

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p$$

ہیرالڈ ایلنگھم نے اوپر کے اس تعلق کو استعمال کر کے دھاتی آکسائیڈ مختلف پیشوں پر تحویل کے لئے ΔG° کی قیمتیں محسوب کیں اور وہ ایک متوازن عمل کے طور پر لیا گیا۔

انہوں نے پیش کو x -محور پر اور دھاتی آکسائیڈ کے بننے کے لئے معیاری فری انرجی کو y -محور میں مرتسم کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک خط مستقیم حاصل ہوا، جس میں ΔS بطور میلان اور ΔH y -مقطع حاصل ہوا۔ مختلف دھاتی آکسائیڈوں کے بننے کے لئے معیاری گیس فری انرجی کی تبدیلی کا تریسی اظہار ایلنگھم نقشہ کہلاتا ہے۔

ایلنگھم نقشوں سے مشاہدہ (Observations from the Ellingham diagram)

1- اکثر دھاتی آکسائیڈ کے بننے کے لئے میلان مثبت ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے۔ دھاتی آکسائیڈوں کے بننے کے لئے آکسیجن استعمال ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بے ترتیبی کم ہوتی ہے۔ لہذا ΔS مثبت ہو جاتی ہے اور اس سے یہ اصطلاح حاصل ہوتی ہے کہ خط مستقیم کی مساوات میں $T.\Delta S$ مثبت ہوتا ہے۔

2- کاربن مونو آکسائیڈ کے بننے کے دوران کی ترسیم ایک خط مستقیم ہے، جس کا میلان منفی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ΔS مثبت ہوتا ہے، کیوں کہ ایک مول آکسیجن کے استعمال کے دوران دو مول CO گیس بنتی ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اعلیٰ پیش پر CO زیادہ مستحکم ہے۔

3- جیسے جیسے پیش میں اضافہ ہوتا ہے، دھاتی آکسائیڈ کے بننے کے دوران ΔG کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اور ایک مخصوص پیش پر صفر ہو جاتی ہے۔ اس پیش میں ΔG منفی ہو جاتی ہے اور آکسائیڈ مستحکم ہو جاتا ہے۔ لہذا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اعلیٰ پیش پر دھاتی آکسائیڈ کم مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تحلیل کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔

4- MgO , HgO جیسی دھاتی آکسائیڈوں کے لئے ایک مخصوص پیش پر میلان میں فوری تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ حالت کی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ (پگھلاؤ یا تبخیر)

1.4.2 ایلنگھم نقشوں کے استعمالات (Applications of the Ellingham diagram)

دھاتوں کے حصول میں ایک مناسب تھرمو کیمیکل عامل اور تھرمو کیمیکل کے لئے مناسب پیش معلوم کرنے کے لئے ایلنگھم نقشے استعمال ہوتے ہیں۔ دھاتی آکسائیڈ کا دھات میں تھرمو کیمیکل کے عمل کو، وہ عنصر جو تھرمو کیمیکل پاتا ہے اور جو دھات آکسیجن کے ساتھ شامل ہو کر تھرمو کیمیکل کا عمل لاتی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ کہا جائے گا۔ اگر دھاتی آکسائیڈ زیادہ مستحکم ہو تو آکسیجن، دھات کے ساتھ موجود رہے گی اور اگر عنصر کا آکسائیڈ جو تھرمو کیمیکل کے عمل میں استعمال ہوتی ہے، وہ زیادہ مستحکم ہو تو دھاتی آکسائیڈ میں موجود آکسیجن، عنصر کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ایلنگھم نقشوں سے ہم دی گئی پیش پر مختلف دھاتی آکسائیڈوں کی اضافی استحکامیت معلوم کر سکتے ہیں۔



1- Ag_2O اور HgO کے بننے کے لئے درکار ایلنگھم نقشہ، ترسیم کے اوپر موجود ہے اور ان کی تجلی تپش بالترتیب 600 اور 700 کیلون

ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آکسائیڈ اوسط تپش پر غیر مستحکم (غیر قیام پذیر) ہیں اور یہ ایک تجلی عامل کے بغیر بھی تجلیل پاسکتے ہیں۔


2- ایک دھاتی آکسائیڈ کا دوسرے دھات سے تجویل کے لئے حرری کیفیت (ممکن صورت) کا پتہ لگانے میں ایلنگھم نقشہ مددگار ہیں۔ ایک دھات، دوسرے دھاتی آکسائیڈ کی تجویل کرے گی یا نہیں وہ، نقشے کے اوپر ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر Cr_2O_3 کے لئے درکار تجویلی عامل اس کے نیچے الومینیم کی صورت میں موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ Cr_2O_3 کی بہ نسبت زیادہ مستحکم ہے۔ چنانچہ Cr_2O_3 کی تجویل میں Al_2O_3 بطور تجویلی عامل کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ Al کو میکینیشیم اور کیلشیم کے آکسائیڈوں کی تجویل کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ نقشے میں Al_2O_3 سے بہت نیچے موجود ہیں۔

3- کاربن کی خط کئی دھاتی آکسائیڈوں کے خطوط کو کاٹتی ہے۔ لہذا یہ اعلیٰ تپش پر ان تمام دھاتی آکسائیڈوں کی تجویل کر سکتی ہے۔ آئیے حرریات کی مدد سے یہ جانچ کریں کہ لوہے کے آکسائیڈ کی تجویل کے لئے کاربن کے استعمال کی درکار شرائط کیا ہیں۔ ایلنگھم نقشے میں FeO اور CO کے بننے کے لئے کاٹنے والی خط تقریباً 1000 K پر ہے۔ اس تپش کے نیچے کاربن کا خط، لوہے کے خط کے اوپر موجود ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ CO کی بہ نسبت زیادہ مستحکم ہے۔ لہذا حرری طور پر یہ زیادہ ممکن نہیں ہے۔ جب کہ 1000 K سے اوپر کاربن کا خط، لوہے کے خط کے نیچے موجود ہے۔ چنانچہ اس سے اعلیٰ تپش پر ہم کوک کو بطور تجویلی عامل استعمال کرتے ہیں۔ درج ذیل فری انرجی (آزاد توانائی) کے حسابات بھی یہ بتاتے ہیں کہ تجویل کا عمل حرری طور پر ممکن ہے۔

ایلنگھم نقشے کے مطابق 1500K پر



تعال (1) کو اُلٹنے پر



تعال (2) اور (3) کو جوڑنے پر



ایک مول FeO کی تجویل کے عمل کے لئے درکار معیاری آزاد توانائی (Standard free energy)

$$\text{DG}_{3/2} = -65 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ ہے۔}$$

ایلنگھم نقشوں کی حد بندیاں (خامیاں) (Limitations of Ellingham diagram)

1- ایلنگھم کے نقشے صرف حرری اصولوں ہی پر تیار کئے گئے ہیں۔ یہ ایک تعال کے حرری ممکنات سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ شرح

تعال سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ یہ وہ معلومات بھی فراہم نہیں کرتے جس میں تجویل کے دوران دیگر تعاملات واقع ہوتے ہیں۔

2- DG کی پیشین گوئی اس طرح سے کی گئی ہے کہ تعاملات اور حاصلات دونوں توازنی حالت میں ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔

خود کا محاسبہ 3

3۔ ایلنگھم نقشہ (خاکہ 1.4) کے استعمال سے کم سے کم تپش کی نشان دہی کیجئے، جس سے کاربن کی مدد سے ZnO تھویل پا کر Zn بنتا ہے۔ اس تپش پر مکمل تھویل مساوات لکھئے۔

1.5 دھات سازی کا برقییمیائی اصول (Electrochemical principle of metallurgy)

حرر کی اصولوں ہی کی طرح، دھات سازی میں برقییمیائی اصول بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تعامل پذیر دھاتیں جیسے سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ کے آکسائیڈ کی تھویل، کاربن کے ذریعہ حرر کی طور پر ممکن نہیں ہیں۔ ایسی دھاتوں کو ان کی کچ دھاتوں سے برقییمیائی طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں دھاتی نمکوں کو ان کی پگھلی ہوئی یا محلول کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ بعض مناسب تھویل عاملوں یا برق پاشیدگی کے ذریعہ کچ دھات میں موجود دھاتی روانوں کی تھویل کی جاتی ہے۔

ایک برقییمیائی تعامل میں گیس فری انرجی (Gibb's free energy) (گیس کی آزاد توانائی) (ΔG) کو اس جملے کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ$$

جس میں تھویل کے دوران استعمال شدہ n الیکٹرانوں کی تعداد ہے۔ F فیراڈے اور E° ، تسلیلی جوڑی (Redox couple) کے برقریرے کی برقی قوت (Electrode potential) ہے۔



اگر E° مثبت ہو تو ΔG منفی ہوگا اور تھویل عمل فوراً واقع ہوگا۔ چنانچہ تسلیلی تعامل کی اس طرح منصوبہ بندی کی جائے کہ جملہ تسلیلی تعامل کی محرکہ برق مثبت ہو۔ جب ایک کم متعامل والی دھاتی روانوں کے محلول میں زیادہ متعامل والی دھات کو شامل کیا جائے تو زیادہ متعاملیت والی دھات محلول میں چلے جائے گی (حل ہو جائے گی)۔ مثال کے طور پر



1.5.1 برقییمیائی طریقے سے الوئیم کا حصول - ہال-ہیرولٹ کا طریقہ :

(Electrochemical extraction of Aluminium - Hall-Heroult process)


اس طریقے میں ایک لوہے کے ٹینک، جس پر کاربن کی استرکاری کی گئی ہو، اس میں برق پاشیدگی کا عمل واقع ہوتا ہے۔ کاربن کی استرکاری کی تھوڈ (منفیرہ) کے طور پر کام کرتا ہے۔ برق پاشیدہ میں ڈوبے ہوئے کاربن کی سلاخیں اینوڈ (مثیرہ) کے طور پر کام کرتا ہے۔ باکسائیڈ کی کچ دھات سے حاصل کردہ الوئیم کے 20% محلول کے ساتھ پگھلی ہوئی کریولائیٹ کو ایک برق پاشیدہ خانہ میں لیا جاتا ہے۔ اس محلول میں 10% کیلشیم کلورائیڈ شامل کیا جاتا ہے۔ اس آمیزہ کے نقطہ پگھلاؤ کو کم کرنے میں کیلشیم کلورائیڈ استعمال ہوتا ہے۔ پگھلے ہوئے اس آمیزہ کی تپش 1270 K سے زیادہ برقرار کی جاتی ہے۔ اس عمل میں واقع ہونے والا کییمیائی تعامل اس طرح سے ہے۔



چونکہ کاربن بطور اینوڈ استعمال ہوتا ہے، درج ذیل تعامل بھی اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔



اوپر کے دو تعاملات کی وجہ سے برق پاشیدگی کے دوران اینوڈ آہستہ سے استعمال ہوتے ہیں۔ کیتھوڈ پر خالص الوٹیم حاصل ہو کر تہہ نشین ہو جاتا ہے۔ جملہ برق پاشیدگی کی تعامل کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔



خود کا محاسبہ 4

4- نمکاب (آبیدہ NaCl) کی برق پاشیدگی سے دھاتی سوڈیم حاصل کیا جاتا ہے۔ برق پاشیدگی کے بعد برق پاشیدہ محلول کی نوعیت اساسی ہو جاتی ہے۔ ممکن برقیہ کے تعامل کو لکھئے۔

1.6 تخلیص (Refining)

کچھ دھات سے حاصل ہونے والی دھات میں عام طور پر لوہیں جیسے غیر تعامل پذیر آکسائیڈ کی کچھ دھات، دیگر دھاتیں، ادھاتیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ خام دھات میں موجود ایسی لوہوں کو الگ کرنے کا عمل تخلیص (Refining) کہلاتا ہے۔ اس باب میں آئیے بعض عام تخلیص کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔

1.6.1 تقطیر (Distillation)

یہ طریقہ طیران پذیر دھاتیں جیسے جست (نقطہ جوش 1180 K) اور پارہ (630 K) وغیرہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں خام دھات (غیر خالص) کو بخارات بننے تک گرم کیا جاتا اور اس کے بخارات کی تکثیف سے خالص دھات حاصل ہوتی ہے۔

1.6.2 سیال بنانا (Liquation)

اس طریقہ میں ایسی دھاتوں کی تخلیص کی جاتی ہے، جن کے لوٹ کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت اس دھات کے، جیسا کہ سیسہ (Sn: mp= 904 K)، جست (Pb : mp = 600 K)، پارہ (Hg: mp = 234K) اور بسمتھ (Bi: mp=545 K) اس عمل کے دوران خام دھات کو پگھلا کر مائع بنایا جاتا ہے اور اس مائع کو ایک مائل سطح پر انڈیلا جاتا ہے۔ غیر خالص دھات کو انعکاسی بھٹی میں اس کے نقطہ پگھلاؤ سے تھوڑی زیادہ تپش پر آکسیجن کی غیر موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے۔ خالص دھات پگھل کر نیچے اترنے لگتی ہے جب کہ لوہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات کو جمع کر کے ٹھوس بنا لیا جاتا ہے۔

1.6.3 برقیاتی تخلیص (Electrolytic refining)


خام دھات کو برق پاشیدگی کے ذریعہ تخلیص کی جاتی ہے۔ یہ عمل ایک بڑے برقیاتی خانے میں کیا جاتا ہے جس میں مطلوبہ دھات کے آبی نمک کے محلول موجود ہوتے ہیں۔ خام دھات کی سلاخوں کو اینوڈ (مثبہ) کے طور پر اور خالص دھات کی باریک پٹری کو کیتھوڈ (منفیہ) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ دھات اینوڈ سے حل ہو کر محلول میں داخل ہو جاتی ہے اور محلول سے اسی مقدار کے دھاتی رواں کیتھوڈ (منفیہ) کی سطح پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ برق پاشیدگی کے دوران کم برقی مثبت لوہیں اینوڈ کے قریب تہہ نشین ہو جاتے ہیں اور یہ اینوڈ کے کیچڑ (Anode mud) کی طرح نکال لئے جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر چاندی کی برق پاشیدہ تخلیص کے عمل کو فرض کرتے ہوئے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

کیتھوڈ : خالص چاندی اینوڈ : خام چاندی کی سلاخیں

برق پاشیدہ محلول : سلور نائٹریٹ کا ترشوی آبی محلول

جب برقیروں کے ذریعہ برقی روگزاری جاتی ہے تو درج ذیل تعامل واقع ہوتا ہے۔



برق پاشیدگی کے دوران اینوڈ میں چاندی کے جوہر الکٹران کو کھو کر محلول میں داخل ہوتے ہیں۔ مثبت بار والے چاندی کے مثبتروں کی طرف الکٹران حاصل کر کے بے بار ہو کر کیتھوڈ پر جمع ہونے لگتے ہیں۔ دیگر دھاتیں جیسے تانبا، جست، وغیرہ کو بھی اسی طرح کے عمل سے تخلص کیا جاسکتا ہے۔

1.6.4 منطقه وار تخلیص (Zone refining)

اس میں کسری قلماء (جزوی قلماء) (Fractional crystallisation) کا اصول استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک غیر خالص دھات کو پگھلا کر اسے ٹھوس بنایا جاتا ہے تو اس کے لوٹ اس کے پگھلے ہوئے علاقے میں موجود ہو گے۔ یعنی ٹھوس دھات کی بہ نسبت پگھلی ہوئی حالت میں لوٹیں زیادہ حل پذیر ہوں گی۔ اس عمل میں غیر خالص دھات کو ایک سلاخ کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ سلاخ کے ایک کنارے کو موبائل انڈکشن ہیٹر کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کنارے کی دھات پگھلنے لگتی ہے۔ ہیٹر کو آہستہ سے سلاخ کے دوسرے کنارے تک ہٹایا جائے تو پہلے کے کنارے کی پگھلی ہوئی دھات ٹھوس بننے لگتی ہے جب کہ لوٹیں دوسرے منطقہ کی جانب ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ہیٹر آگے بڑھتا ہے، لوٹیں بھی اسی کے ساتھ ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ ہیٹر کو سلاخ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کئی دفعہ ہٹا کر اس عمل کو دہرایا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ خالص پن حاصل ہو۔ دھاتوں کو تسکید کے عمل سے بچانے کے لئے اس عمل کو جامدگیوں کے کمرے میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جرمانیم (Ge)، سیلیکان (Si)، گلیمیم (Ga)، جنہیں نیم موصل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ان دھاتوں کی تخلیص کی جاتی ہے۔

1.6.5 بخاراتی حالت کا طریقہ : (Vapour phase method)

اس طریقہ میں دھات کو ایک مناسب متعامل کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے جو دھات کے ساتھ مل کر ایک طیران پذیر مرکب بناتا ہے۔ اس کے بعد اس طیران پذیر مرکب کو تحلیل کر کے خالص دھات حاصل کی جاتی ہے۔ درج ذیل عمل کے ذریعہ ہم اس طریقہ کو سمجھ سکتے ہیں۔

مونڈ کے عمل سے نکل کی تخلیص (Mond process for refining Nickel)

اس طریقہ میں نکل کو کاربن مونو کسائیڈ کے ساتھ 350K تپش پر گرم کیا جاتا ہے۔ نکل، CO کے ساتھ تعامل پا کر اعلیٰ طیران پذیر نکل ٹرائکاربونیل کاپیچیدہ (Complex) بن جاتا ہے۔ ٹھوس لوٹیں نیچے رُک جاتی ہیں۔



نکل کاربونیل کو 460 K پر گرم کرنے پر کاپیکس تحلیل پا کر خالص دھات بنتا ہے۔




زکونیم / ٹائٹانیئم کی تخلص کے لئے وین آرکل کا طریقہ (Van-Arkel method for refining Zirconium/Titanium)

یہ طریقہ دھاتی مرکبات کی حرارتی تحلیل کی بنیاد پر ہے، جس کی وجہ سے خالص دھاتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹائٹانیئم اور زکونیم کو اس طریقہ سے خالص کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر خالص ٹائٹانیئم دھات کو ایک خلا کار برتن میں ایوڈین کے ساتھ 550K تپش پر گرم کیا جاتا ہے۔ اس سے طیران پذیر ٹائٹانیئم ٹیٹرائائیڈ (TiI₄) حاصل ہوتا ہے۔ لوہیں تہہ نشین ہو جاتی ہیں، کیوں کہ یہ ایوڈین کے ساتھ تعامل نہیں کرتیں۔



طیران پذیر ٹائٹانیئم ٹیٹرائائیڈ کے بخارات کو 1800K تپش پر ٹنگسٹن کی بتی سے گزارا جاتا ہے۔ ٹائٹانیئم ٹیٹرائائیڈ تحلیل پا کر خالص ٹائٹانیئم بتی کی سطح پر جمع ہو جاتا ہے۔ ایوڈین کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے۔



1.7 دھاتوں کے استعمالات (Applications of metals)

1.7.1 Al کے استعمالات (Applications of Al)

الومینیم سب سے زیادہ حاصل ہونے والی دھات ہے۔ یہ حرارت اور برق کی اچھی موصل ہے۔ یہ تاکل مزاحم بھی ہے۔ اس کے استعمالات درج ذیل ہیں۔

- ❖ کئی حرارتی تبدلات (Heat exchangers) اور جاذب (Sinks) اور روزمرہ کے استعمال کے برتن الومینیم سے تیار کئے جاتے ہیں۔
- ❖ الومینیم کے ورق کو غذائی اشیاء اور دیگر پیکنگ کی اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ الومینیم اتنی سخت اور مضبوط دھات نہیں ہے۔ تاہم یہ تانبا، میگنیز، میکینیشیم اور سلیکون کے ساتھ بھرت بنا کر ہلکی اور مضبوط بن جاتی ہیں اور ان کو ہوائی جہاز کے جسم کی تیاری اور دیگر نقل و حمل کے اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ چونکہ الومینیم تاکل کی بہترین مزاحم ہے، اس کو کیمیائی تعامل گروں، ادویاتی آلوں، فرڈج کے اسپیر اور گیس کی پائپ لائنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ الومینیم برق کی ایک اچھی موصل اور سستی ہے۔ لہذا مضبوطی کے لئے اس کے ساتھ فولاد کے قالب بنا کر اوپر سے لے جانے والے برقی کیبل بنائے جاتے ہیں۔

1.7.2 Zn (جست) کے استعمالات (Applications of Zn)

- ❖ دھاتی جست کو لوہے اور فولاد اور فولاد کی ساختوں کی جست کاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انہیں تاکل اور زنگ لگنے سے بچاتے ہیں۔
- ❖ جست کو موٹر کار، برقی اور ہارڈویری کی صنعتوں میں ڈھال بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ رنگ و روغن، ربڑ، بناؤ سنگھار، ادویات، پلاسٹک، انک، بیٹری، ملبوسات اور برقی اشیاء بنانے کے لئے زنگ آکسائیڈ استعمال ہوتا ہے۔
- ❖ چمکیلے پیٹ، فلوریت والے بلب اور x-ray کے اسکرین بنانے کے لئے زنگ سلفائیڈ استعمال ہوتا ہے۔

❖ پیتل بھی جست ہی کی ایک بھرت ہے۔ چونکہ یہ تاگل کی زیادہ مزاحم ہے، اس لئے اس کو پانی کے صمام Valve بنانے، ٹیلی فون اور وائرلیس کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

1.7.3 Fe کے استعمالات (Applications of Fe)

- ❖ لوہا بہت ہی استعمال میں آنے والی دھات ہے اور اس کی بھرتیں ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ پُل، برقی کھبے، سائیکل کی زنجیریں، کاٹنے کے آلے اور بندوق کی نالیاں سب لوہے سے بنائی جاتی ہیں۔
- ❖ ڈھلوان لوہا (Cast iron) کو پائپ، صمام اور پمپ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ لوہے کی بھرتوں اور مرکبات سے مقناطیس بنائے جاتے ہیں۔
- ❖ بے داغ فولاد، لوہے کی ایک اہم بھرت ہے۔ اور یہ بہترین تاگل مزاحم بھرت ہے۔ اس کو عمارتیں، بیرنگ، گھریلو اشیاء، جراحی کے آلے وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نکل اسٹیل کو کیبل، آٹوموبائل، ہوائی جہاز کے پرزے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کروم اسٹیل کو کاٹنے اور کوٹنے والے آلے بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

1.7.4 Cu کے استعمالات (Applications of Cu)

- ❖ انسان کی سب سے پہلی استعمال کردہ دھات تانبا ہے۔ اس کی بھرت، کانسی نے نئے دور کو جنم دیا جسے کانسی کا دور کہتے ہیں۔
- ❖ تانبے کو سکے اور سونے کے ساتھ ملا کر زیورات بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ تانبے کو برقی تاریں، پانی کی نالیاں اور دیگر برقی پرزے بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

1.7.5 Au (سونے) کے استعمالات (Applications of Au)

- ❖ سونا ایک قیمتی اور بیش بہا دھات ہے۔ اس کو سکے بنانے اور بعض ممالک میں زر کا نظام (Monetary system) میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ❖ تانبے کے ساتھ بھرت بنا کر اسے زیورات بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ سونے کو برقی ملمع کاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کلائی کی گھڑیوں، مصنوعی اعضاء، سستے زیورات، دانتوں میں بھرنے کے لئے اور برقی آلوں میں اس کی ایک باریک پرت چڑھائی جاتی ہے۔
- ❖ شمسی خانوں میں کارکردگی کو بڑھانے کے لئے سونے کے نینوذرات (nano particles) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے بطور تماسی عامل (Catalyst) کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

لوہے کا ستون - دہلی (The Iron Pillar - Delhi)

دہلی میں واقع لوہے کا ستون، جسے اشوک کی لاٹ بھی کہتے ہیں، اس کی اونچائی 23 فٹ 8 انچ اور اس کی چوڑائی 16 انچ ہے۔ اس کا وزن 6000 کلوگرام سے بھی زیادہ ہے۔

اس کی عمر کا اندازہ 1600 سال لگایا گیا ہے۔ اتنے سالوں میں یہ زنگ آلود ہو کر کبھی ختم ہو چکا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آج تک یہ زنگ آلود ہوئے بغیر اپنی جگہ ساکن کھڑا ہے۔ یہ قدیم ہندوستانیوں کی دھات سازی کے فن کی ایک عظیم مثال ہے۔

ماحول کے پھیڑوں اور دیگر عوامل نے اس ستون کے اطراف misawite کی ایک قدرتی پرت چڑھادی ہے۔ misawite لوہا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک مرکب ہے، جس کو زنگ نہیں لگتا اور یہ تاکل کا مزاحم ہے۔



خلاصہ

- ❖ دھات سازی کا تعلق دھاتوں کے حصول کی سائنس اور ٹکنالوجی ہے۔
- ❖ قدرتی طور پر موجود ایک شے جو کان کنی سے حاصل ہوتی ہے اور جس میں دھات آزادانہ حالت میں یا اس کی آکسائیڈ یا سلفائیڈ کی شکل میں ہوتی ہے، معدن کہلاتی ہے۔
- ❖ وہ معدنیات جس میں دھاتوں کا فی صد زیادہ ہوتا ہے، اور ان سے آسانی کے ساتھ دھاتوں کا حصول کیا جاسکتا ہے، کچھ دھاتیں کہلاتی ہیں۔
- ❖ درج ذیل طریقوں سے مطلوبہ دھات کو اس کی کچھ دھاتوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
 - (i) کچھ دھاتوں کا ارتکاز
 - (ii) خام دھاتوں کا حصول
 - (iii) خام دھاتوں کی تخلیص
- ❖ مرکب کچھ دھاتوں سے خام دھاتوں کا حصول دو مرحلوں میں کیا جاتا ہے۔ (i) کچھ دھات کو مطلوبہ دھات کے آکسائیڈ میں تبدیل کرنا اور (ii) دھاتی آکسائیڈوں کی تحویل سے عنصری دھات کو حاصل کرنا۔
- ❖ مختلف تپشوں پر دھاتی آکسائیڈوں کو حاصل کرتے وقت کسی تعامل کی معیاری گیس کی آزادانہ توانائی کی تبدیلی کا اظہار ایک ترسیم سے کیا جاتا ہے، جسے ایلنگھم نقشے کہتے ہیں۔
- ❖ تحویل کے عمل کے لئے مناسب تحویلی عامل اور تپش معلوم کرنے کے لئے ایلنگھم کے نقشے استعمال ہوتے ہیں۔

- ❖ حرر کی اصول ہی کی طرح، برقیائی اصول بھی دھاتوں کے حصول میں استعمال ہوتے ہیں۔
- ❖ اگر En مثبت ہو تو DG منفی ہوگا اور تھویلی عمل فوری طور پر واقع ہوگا۔ لہذا ایک تکسیلی تعامل کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ جملہ تکسیلی تعامل کی برق محرکہ قوت مثبت ہو۔ جب ایک زیادہ متعاملیت والی دھات کو ایسے محلول میں شامل کیا جائے جس میں کم متعاملیت والے دھاتی رواں ہوں، تو زیادہ متعاملیت والی دھات محلول میں حل ہو جائے گی۔
- ❖ عام طور پر دھات کے حصول کے دوران دھات میں بعض لوٹ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آکسائیڈ کی کچ دھات، دیگر دھاتیں، ادھاتیں وغیرہ۔ ان لوٹوں سے خالص دھات کو الگ کرنے کا عمل تخلیص کہلاتا ہے۔



محاسبہ



صحیح جواب منتخب کیجئے :

- 1- باکسائیڈ کی ترکیب اس طرح ہے۔
 - a) Al_2O_3 b) $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ c) $Fe_2O_3 \cdot 2H_2O$ d) اس میں سے کوئی بھی نہیں
- 2- سلفائیڈ کی کچ دھات کو بھوننے پر (A) نامی گیس خارج ہوتی ہے۔ (A) ایک بے رنگ گیس ہے۔ (A) کا آبی محلول ترشوی ہوتا ہے۔ گیس (A) یہ ہے۔
 - a) CO_2 b) SO_3 c) SO_2 d) H_2S
- 3- درج ذیل میں سے کونسا تعامل تکلیس کو ظاہر کرتا ہے؟
 - a) $2Zn + O_2 \longrightarrow 2ZnO$ b) $2ZnS + 3O_2 \longrightarrow 2ZnO + 2SO_2$
 - c) $MgCO_3 \longrightarrow MgO + CO_2$ d) (a) اور (c) دونوں
- 4- کاربن کے ذریعہ تھویل نہ ہونے والا دھاتی آکسائیڈ
 - a) PbO b) Al_2O_3 c) ZnO d) FeO
- 5- درج ذیل میں سے کونسی دھات ہال-ہیرولٹ کے عمل سے حاصل کیا جاتا ہے؟
 - a) Al b) Ni c) Cu d) Zn
- 6- تھویل کے عمل سے پہلے سلفائیڈ کی کچ دھات کو بھوننے کے کیا فائدے ہیں۔ اس سے متعلق ان میں سے کونسا جملہ درست نہیں ہے؟
 - a) CS_2 اور H_2S سے زیادہ سلفائیڈ کا DG_f^0 ہونا چاہئے۔
 - b) آکسائیڈ کی بہ نسبت سلفائیڈ کا DG_r^0 کی قیمت منفی ہونی چاہئے۔
 - c) حرر کی طور پر آکسائیڈ کی بہ نسبت سلفائیڈ کی کچ دھات کو بھوننا آسان ہے۔
 - d) دھاتی سلفائیڈ کے لئے کاربن اور ہائیڈروجن مناسب تھویلی عامل ہیں۔

7۔ کالم I- میں موجود کوکالم II- کے ساتھ جوڑے اور صحیح کوڈ دیجئے۔

Column-II		Column-I	
خالص ترین Ge	(i)	سیانائیڈ کا عمل	A
ZnS کی تیاری	(ii)	جھاگ کے تیراؤ کا عمل	B
Al کا حصول	(iii)	برق پاشیدہ تحویل	C
Au کا حصول	(iv)	منطقہ کی تخلیص	D
Ni کی تخلیص	(v)		

	A	B	C	D
(a)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(b)	(iii)	(iv)	(v)	(i)
(c)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(d)	(ii)	(iii)	(i)	(v)

8۔ ولفرامائیٹ کوٹن اسٹون سے جدا کرنے کا عمل

(a) پگھلاؤ (b) تکلیس (c) بھوننا (d) مقناطیسی علیحدگی

9۔ درج ذیل میں سے کونسا تعامل بن سکتا ہے۔

- a) $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$
b) $\text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
c) $\text{Cu(s)} + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Ag(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$
d) $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$

10۔ برقییمیائی عمل کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔

(a) لوہا (b) جست (c) سوڈیم (d) چاندی

11۔ گدازندہ ایک شے ہے جو ذیل کو تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(a) معدن سے سلیکیٹ میں (b) بغیر پگھلے لوٹوں سے حل پذیر لوٹ میں

(c) حل پذیر لوٹوں سے بغیر پگھلے ہوئے لوٹ میں (d) یہ تمام کے تمام

12۔ درج ذیل میں سے کونسی دھات کاربن کا زجھاگ کے تیراؤ کے طریقہ سے بہتر طریقہ سے کیا جاسکتا ہے؟

(a) میکناٹائیٹ (b) ہیماٹائیٹ (c) گیلینا (d) کیسی ٹرائٹ

13- الوینا کی برق پاشیدگی سے الوینیم کی دھات کے حصول کے دوران کریولائٹ اس لئے شامل کیا جاتا ہے۔

(a) الوینا کے نقطہ پگھلاؤ کو کم کرنے کے لئے (b) الوینا سے لوٹوں کو جدا کرنے کے لئے

(c) برقی ایصالیت کو کم کرنے کے لئے (d) تحویل کی شرح کو بڑھانے کے لئے

14- ZnO سے Zn کو اس طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

(a) کاربن کے ذریعہ تحویل (b) چاندی کے ذریعہ تحویل (c) برقیائی طریقہ (d) ترشہ کی دھلائی

15- سونے اور چاندی کے حصول کے لئے سیانائیڈ کے روانوں کے ساتھ دھلائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد چاندی کو اس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔


(NEET - 2017)

(a) تقطیر (b) منطقہ وار تخلص (c) جست سے ہٹاؤ (d) سیال بنانا

16- ایلنگھم کے نقشے کو مد نظر رکھتے ہوئے، درج ذیل میں سے کونسی دھات کو الوینا کی تحویل کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے؟ (NEET-2018)

(a) Fe (b) Cu (c) Mg (d) Zn

17- درج ذیل تعاملات کی جوڑی کو زکونیم کی تخلص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔



(a) سیال بنانا (b) وین-آرکل کا طریقہ (c) منطقہ وار تخلص (d) مونڈ کا طریقہ

18- درج ذیل میں سے کونسا طریقہ کچھ دھاتوں کو ارتکا کرنے میں استعمال ہوتا ہے؟

(a) دھلائی (b) بھونا (c) جھاگ کے تیراؤ کا طریقہ (d) (a) اور (c) دونوں

19- ذیل میں سے کونسا جملہ غلط ہے۔

(a) مونڈ کے طریقہ سے نکل کی تخلص کی جاتی ہے۔ (b) وین آرکل کے طریقہ سے ٹائٹانیئم کی تخلص کی جاتی ہے۔

(c) جھاگ کے تیراؤ کے طریقہ سے زک بلنڈ کا ارتکا کیا جاتا ہے۔

(d) سونے کی دھات سازی کے دوران دھات کو ہلکائے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ کے محلول کے ساتھ دھلائی کی جاتی ہے۔

20- تانبے کی برق پاشیدگی کی تخلص کے دوران، درج ذیل میں سے کونسا اینوڈ (مثبہ) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

(a) خالص تانبا (b) غیر خالص تانبا (c) کاربن کی سلاخ (d) پلاٹینم کی سلاخ

21۔ درج ذیل میں سے کوئی ترسیم ایلنگھم کے نقشے فراہم کرتے ہیں۔

a) ΔS Vs T

b) ΔG^0 Vs T

c) ΔG^0 Vs $\frac{1}{T}$

d) ΔG^0 Vs T^2

22۔ ایلنگھم کے نقشوں میں، کاربن مونوآکسائیڈ کی تشکیل کے لئے شرط


a) $\left(\frac{\Delta S^0}{\Delta T}\right)$ منفی ہو

b) $\left(\frac{\Delta G^0}{\Delta T}\right)$ مثبت ہو

c) $\left(\frac{\Delta G^0}{\Delta T}\right)$ منفی ہو

d) $\left(\frac{\Delta T}{\Delta G^0}\right)$ 700°C کے بعد $\left(\frac{\Delta G^0}{\Delta T}\right)$ منفی ہو

23۔ درج ذیل میں سے کونسا تعامل حرر کی طور پر نہیں بن سکتا۔



24۔ ایلنگھم نقشوں سے متعلق کونسا بیان درست نہیں ہے؟

(a) آزاد توانائی کی تبدیلیاں خط مستقیم دیتی ہیں۔ اگر حالت میں تبدیلی ہو تو اس میں انحراف ہوتا ہے۔

(b) CO_2 کی تشکیل کی ترسیم ایک خط مستقیم ہے، جو آزاد توانائی کے محور سے تقریباً متوازی ہے۔

(c) CO کی منفی میلان کا مطلب، تپش کے اضافہ کے ساتھ یہ زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

(d) دھاتی آکسائیڈوں کا مثبت میلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا استحکام تپش کے اضافہ کے ساتھ کم ہوتا ہے۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1۔ معدنیات اور کچھ دھاتوں میں کیا فرق ہے؟

2۔ خالص دھاتوں کو ان کے کچھ دھاتوں سے حصول کے لئے کونسے مختلف مرحلے اپنائے جاتے ہیں؟

3۔ کچھ دھات Fe_2O_3 سے لوہے کے حصول کے دوران چونے کے پتھر کا کیا رول ہے؟

4۔ جھاگ کے تیراؤ کے طریقہ سے کوئی کچھ دھات کا ارتکاڑ کیا جاتا ہے؟ دو کچھ دھاتوں کی مثالیں دیجئے۔

5۔ نکل کی تخلص کے طریقہ کی وضاحت کیجئے۔

6۔ ایک مثال کے ساتھ منطقہ وار تخلص کی وضاحت کیجئے۔

7۔ پلنگھم کے نقشے کو استعمال کرتے ہوئے

(A) شرط پیش کیجئے جس میں (i) میگنیشیا کو الوٹیم کے ذریعہ تھویل کیا جاسکتا ہے۔ (ii) الوٹینا کی تھویل میگنیشیم سے کی جاسکتی ہے۔

(B) Fe_2O_3 کو 1200K تپش پر کوک کے ذریعہ تھویل ممکن ہے؟

8۔ زنک (جست) کے استعمالات بیان کیجئے۔

9۔ الوٹیم کی برقی دھات سازی کے عمل کی وضاحت کیجئے۔

10۔ مثالوں کے ساتھ درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجئے۔

(i) گل معدن (gangue) (ii) دھاتی میل (slag)

11۔ بخاراتی حالت کے طریقہ سے تخلص کے لئے بنیادی ضروریات یا شرائط بتائیے۔

12۔ درج ذیل طریقوں کے دوران ان کا کیا رول ہے؟

(i) تانبے کے حصول کے دوران سیلیکا کا رول

(ii) الوٹیم کے حصول کے دوران کریولائٹ کا رول

(iii) زکونیم کی تخلص کے دوران ایوڈین کا رول


(iv) جھاگ کے تیراؤ کے عمل کے دوران سوڈیم سیانائیڈ کا رول

13۔ ایک مثال کے ساتھ برق پاشیدگی کے ذریعہ تخلص کے اصول کی وضاحت کیجئے۔

14۔ تھویل عامل کا انتخاب کرنا، حرر کی عوامل کی بنیاد پر ہے۔ ایک مثال کے ساتھ اس کی وضاحت کیجئے۔

15۔ پلنگھم نقشوں کی خامیاں بیان کیجئے۔

16۔ دھات سازی کے دوران برقییمیائی اصولوں سے متعلق ایک مختصر نوٹ لکھئے۔



p بلاک عناصر-I

(p-BLOCK ELEMENTS-I)

اکائی
2



Kenneth wade
(1932–2014) کینتھ ویڈ

کینتھ ویڈ ایک انگریز کیمیا دان اور دُرہام یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے بورین کی گچھا دار شکلوں کو حاصل کرنے کے طریقوں کی پیشین گوئی کی۔ انہوں نے گچھا دار بندشوں (Cluster bonding) میں موجود الیکٹرانوں کی جوڑیوں کے ڈھانچوں (Skeletal electron pair) کی جملہ تعداد کو محسوب کرنے کے لئے ویڈ کے اصول بنائے۔

ان کے اس کارنامے کی وجہ سے 1989 میں رائل سوسائٹی لندن کی جانب سے انہیں FRS کے اعزاز سے نوازا۔

1999 میں ان کو جدید کیمیائی تحقیق کے لئے شاہی کیمیائی سوسائٹی والوں نے Tilden انعام سے نوازا گیا۔



سکینے کے مقاصد



اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے۔

❖ p- بلاک کے عناصر کا کیمیائی رجحان اور خصوصیات کو بیان کر سکیں گے۔

❖ p- بلاک کے عناصروں کی anomalous غیر مربوط خاصیت کو سیکھ سکیں گے۔

❖ بوران کے استعمالات۔ خواص اور تیاری کے بارے میں متبادل خیال کر سکیں گے۔

❖ بوران اور البومینیم کے اہم مرکبات کی تیاری پر متبادل خیال کر سکیں گے۔

❖ کاربن اور سیلیکان کے اہم مرکبات کی تیاری اور خاصیتوں پر متبادل خیال کر سکیں گے۔

تعارف (Introduction)

پچھلی جماعت میں ہم نے عناصروں کی جماعت بندی یعنی s-بلاک، p-بلاک، d-بلاک اور f-بلاک سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گیارھویں جماعت میں ہم s-بلاک کے عناصر اور اس کے اہم مرکبات کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں۔ اس سال ہم بقیہ عناصر کی جماعت بندی p-بلاک سے شروع کرتے ہیں۔

عناصر جن کا آخری الیکٹران p مدار میں داخل ہوتا ہو تو، وہ p-بلاک عناصر کہلاتے ہیں۔ انہیں جدید دوری جدول کے 13 سے 18 ویں گروپ میں رکھا گیا ہے۔ اس گروپ کے پہلے ممبر B, C, N, O, F, He ہیں۔ ان عناصر کے خواص مختلف ہیں اور اس بلاک میں دھاتیں، ادھاتیں اور دھتھونٹ (metalloids) شامل ہیں۔ اس بلاک کے عناصر ہماری روزمرہ زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سالماتی آکسیجن کے بغیر جانداروں کی زندگی ناممکن ہے۔ سب سے زیادہ حاصل ہونے والی دھات الوٹیم اور اس کی بھرتوں کے بے حساب استعمالات ہیں، جس میں گھریلو برتن سے ہوائی جہاز کے حصے تک شامل ہیں۔ سیلیکان اور جرمنیم جیسے عناصر کی نیم دھاتی خاصیت نے جدید الیکٹرانکس میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس اکائی میں ہم p-بلاک کے پہلے تین گروپ (گروپ 13-15) کے عناصر یعنی بوران، کاربن اور نائٹروجن کے خاندان اور ان کے اہم مرکبات کا مطالعہ کریں گے۔

2.1 p-بلاک عناصر کے عام رجحانی خواص (General trends in the properties of p- block elements)

پچھلے اسباق میں ہم جان چکے ہیں کہ عناصر کی خصوصیت زیادہ طور پر ان کے الیکٹران کی تشکیل، جسامت، رواں سازی، انتھالپی اور برقی منفیت وغیرہ پر منحصر ہے۔ چلئے اب یہاں پر طرح طرح کے p-بلاک عناصر کی عام رجحانیت پر بحث کریں گے۔

2.1.1 الیکٹران کی تشکیل اور تفسیدی حالت (Electronic Configuration and Oxidation state)

p-بلاک عناصر کی عام الیکٹران کی تشکیل ns^2, np^{1-6} ہے۔ اس گروپ کے ہر عنصر کی بیرونی خول کی الیکٹران کی تشکیل میں مشابہت پائی جاتی ہے اور صرف n پرنسپل قدریہ عدد (Principal quantum number) کی قیمت میں فرق پایا جاتا ہے۔ گروپ 18 (جامدگیس) کے عناصر کے p-مدار مکمل طور پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ زیادہ مستحکم (Stable) اور کم تعامل پذیر ہیں۔ اس بلاک کے تمام عناصر اپنی اعلیٰ ترین تفسیدی حالت (group oxidation state) میں متغیر تفسیدی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ان کے گرنفی الیکٹرانوں کی تعداد کے مساوی ہے۔ p-بلاک کے عناصر منفی تفسیدی حالت بتاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب کہ s-بلاک کے عناصر صرف مثبت تفسیدی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لوئجن کے پاس الیکٹران کو اپنے پاس کھینچ کر بیرون ترین مدار کو مکمل طور پر بھر کر ہیلانڈ کے رواں بنانے کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ لوئجن میں 1- تفسیدی حالت بہت عام ہے۔ اسی طرح دوسرے عناصر جو Pnictogen اور چیلکو جن (Chalcogen) سے تعلق رکھتے ہیں، منفی تفسیدی حالت ظاہر کرتے ہیں۔

خود کی جانچ

گروپ 18 کے تمام عناصر کو کیوں نوبل گیس (جامدگیسیں) کہا جاتا ہے۔ گروپ 18 کے تمام عناصر کی الیکٹران کی تشکیل لکھئے۔

جدول 2.1 P بلاک عناصر کی عام الیکٹرانیک تشکیل اور تفسیدی حالت

Group No.	13	14	15	16	17	18
گروپ کا نام	Icosagens	Tetragens	Pnictogens	Chalcogens	Halogens	Inert gases
عام بیرونی الیکٹرانیک تشکیل	$ns^2 np^1$	$ns^2 np^2$	$ns^2 np^3$	$ns^2 np^4$	$ns^2 np^5$	$ns^2 np^6$
اعلی ترین تفسیدی حالت (گروپ کی تفسیدی حالت)	+3	+4	+5	+6	+7	+8
دیگر مشاہدہ کردہ تفسیدی حالتیں	+1	+2, -4	+3, -3	+4, +2, -2	+5, +3, +1, -1	+6, +4, +2

2.1.2 دھاتی خاصیت (Metallic Nature)

وہ عناصر جو اپنے الیکٹران کو کھو کر منفرواں cation بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں، برقی مثبت (Electropositive) یا دھاتی خاصیت والے کہلاتے ہیں۔ یہ خاصیت روانی توانائی (ionisation energy) پر منحصر ہے۔ عام طور پر گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے وقت روانی توانائی کھٹتی ہے اور دھاتی خاصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

p-بلاک کے عناصر اور ان کی رواں سازی، انتہائی، برقی منفیت اور دھاتی خصوصیت
خاکہ 2.1

Group No	13	14	15	16	17	18	
	IE-800.63 B Boron EN-2.04	IE-800.63 C Carbon EN-2.55	IE-1402.33 N Nitrogen EN-3.04	IE-1313.94 O Oxygen EN-3.44	IE-1681.04 F Fluorine EN-3.98	IE-2372.32 He Helium EN-	
	IE-577.54 Al Aluminium EN-1.61	IE-786.52 Si Silicon EN-1.90	IE-1011.81 P Phosphorus EN-2.19	IE-999.59 S Sulfur EN-2.58	IE-1251.19 Cl Chlorine EN-3.16	IE-1520.57 Ar Argon EN-	Metals
	IE-578.84 Ga Gallium EN-1.81	IE-762.18 Ge Germanium EN-2.01	IE-944.47 As Arsenic EN-2.18	IE-940.96 Se Selenium EN-2.55	IE-1139.86 Br Bromine EN-2.96	IE-1350.76 Kr Krypton EN-	Metalloids
	IE-558.3 In Indium EN-1.78	IE-708.58 Sn Tin EN-1.96	IE-830.58 Sb Antimony EN-2.1	IE-869.29 Te Tellurium EN-2.1	IE-1008.39 I Iodine EN-2.66	IE-1170.35 Xe Xenon EN-2.60	Non Metal
	IE-589.35 Tl Thallium EN-1.8	IE-715.57 Pb Lead EN-1.8	IE-702.94 Bi Bismuth EN-1.9	IE-811.82 Po Polonium EN-2.0	IE- At Astatine EN-2.2	IE-1037.07 Rn Radon EN-	Radio active
	IE- Nh Nihonium EN-	IE- Fl Flerovium EN-	IE- Mc Moscovium EN-	IE- Lv Livermorium EN-	IE- Ts Tennessine EN-	IE- Og Oganesson EN-	IE- First ionisation energy EN- Electro negativity

p- بلاک میں نیچے بائیں جانب کے عناصر دھاتیں ہیں جب کہ اوپر دائیں کی جانب موجود عناصر ادھات ہیں۔ گروپ 13 کے تمام عناصر دھاتی خاصیت رکھتے ہیں سوائے بوران کے جو ایک دھتونت metalloïd ہے، اور دھات اور ادھات دونوں کی درمیانی خاصیت رکھتا ہے۔ بوران کا جوہری نصف قطر (Atomic radius) بہت چھوٹا ہے اور اسی طرح اس کا نیوکلیائی بار (high nuclear charge) زیادہ ہے۔ لہذا ان خاصیتوں کی وجہ سے یہ ادھات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے نیچے کے گروپ میں ادھاتی خاصیت بڑھتی جاتی ہے۔ گروپ 14 میں کاربن ادھات ہے، جب کہ سیلیکان اور جرمانیم دونوں دھتونت ہیں۔ گروپ 15 میں نائٹروجن اور فاسفورس دونوں ادھات ہیں جب کہ آرسنک arsenic اور اینٹی مونی antimony دھتونت ہیں۔ گروپ 16 میں آکسیجن، سلفر اور سلیمن Selenium ادھات ہیں جب کہ Tellurium دھتونت ہے۔ گروپ 17 اور 18 کے تمام عناصر ادھات ہیں۔

2.1.3 روانی انتھالپی (Ionisation enthalpy)

ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو جوہری نصف قطر کے بڑھنے کی وجہ سے عناصر کی روانی انتھالپی بتدریج گھٹتی جاتی ہے۔ p- بلاک عناصر میں اس رجحان میں تھوڑا انحراف پایا جاتا ہے۔ گروپ 13 میں بوران سے الوئیم تک روانی انتھالپی بتدریج گھٹتی ہے، جیسا کہ توقع کی گئی ہے۔ مگر الوئیم سے تھالیم تک صرف تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ s اور p کی نسبت ان میں اندرونی d اور f الیکٹران پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور ڈھال کی قوت (Shielding effect) پائی جاتی ہے۔ (الیکٹران ایک ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں)۔ اس کے نتیجے میں گرتی الیکٹرانوں کی جملہ نیوکلیائی بار بڑھ جاتا ہے۔ 14 ویں گروپ میں بھی اسی طرح کا رجحان پایا گیا ہے۔ باقی کے گروپ (15 سے 18) تک عام رجحان رکھتے ہیں۔ ان گروپوں میں جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو روانی انتھالپی بڑھتی ہے۔ یہاں پر کمزور ڈھال کی قوتوں پر اضافی p- الیکٹران غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے گروپوں میں عناصر کی روانی توانائی پہلے کے گروپوں سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

2.1.4 برق منفیت (Electronegativity)

جب ہم 13 ویں گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو بوران سے الوئیم تک برق منفیت کم ہوتی ہے، اس کے بعد گلیئم میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔ اسی طرح کا رجحان 14 ویں گروپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ دیگر گروپوں میں جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو برق منفیت کم ہوتی جاتی ہے۔ مشاہدہ کردہ اس رجحان کو اس کے جوہری نصف قطر کے ساتھ موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

2.1.5 پہلے عناصر کی غیر مربوط خصوصیات: (Anomalous properties of the first elements)

p- بلاک عناصر میں ہر گروپ کا پہلا عنصر اس کے بعد کے گروپ کے پہلے عنصر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس غیر مربوط خصوصیت کے لئے ذیل کے عوامل ذمہ دار ہیں۔

- 1- پہلے عنصر کی چھوٹی جسامت
- 2- اعلیٰ روانی انتھالپی اور زیادہ برقی منفیت
- 3- گرتی خول میں d مداروں کی غیر موجودگی

گروپ 13 کا پہلا ممبر بوران ایک دھتونت ہے، جب کہ دیگر متعاملیت والی دھاتیں ہیں۔ مزید یہ کہ بوران، گروپ 14 کے ممبروں کے ساتھ وتر (Diagonally) میں سیلیکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بوران اور سیلیکان کے آکسائیڈوں کی ترشوی نوعیت مشابہ ہوتی ہے۔ بوران اور سیلیکان دونوں ہم گرتہ ہائیڈرولائٹ بناتے ہیں، جنہیں ہائیڈرولائس (Hydrolyse) کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سوائے بوران ٹری فلورائیڈ کے، دونوں عناصر کے ہائیڈرولائٹ آسانی کے ساتھ ہائیڈرولائٹس ہو جاتے ہیں۔

گروپ 14 کا پہلا عنصر کاربن صحیح معنوں میں ایک ادھات ہے، جب کہ دیگر عناصر دھتونت (سیلیکان اور جرمینیم) یا دھاتیں (جست اور قلعی) ہیں۔ اس گروپ کے دیگر ممبروں کی بہ نسبت کاربن کثیر بندشیں بناتا ہے جیسا کہ $C=C$, $C=O$ وغیرہ۔ کاربن میں خود اپنے ساتھ یا دیگر جوہروں کے ساتھ بندشوں کی ایک طویل زنجیر بنانے کا رجحان پایا جاتا ہے جسے زنجیری ترتیب (Catenation) کہتے ہیں۔ گروپ میں اوپر سے نیچے اترنے پر یہ رجحان کم ہوتا جاتا ہے۔ $(C > Si > Ge > Sn > Pb)$

گروپ 15 کا پہلا عنصر نائٹروجن بھی اپنے دیگر عناصر کی بہ نسبت اپنے خواص میں جدا ہے۔ کاربن ہی کی طرح نائٹروجن بھی کثیر بندشیں بناتا ہے۔ $(N=N, C=N, N=O)$ وغیرہ۔ دیگر ممبروں کی بہ نسبت نائٹروجن ایک دو جوہری گیس ہے۔ اسی طرح گروپ 16 کا پہلا عنصر آکسیجن بھی ایک دو جوہری گیس ہے۔ اس کی اعلیٰ برق منفیت کی وجہ سے یہ ہائیڈروجن بندش بناتا ہے۔

گروپ 17 کا پہلا عنصر فلورین اعلیٰ ترین برق منفیت رکھتا ہے۔ یہ گروپ کے دیگر ممبروں سے مختلف ہے۔ آکسیجن ہی کی طرح یہ ہائیڈروجن بندش بناتا ہے۔ یہ صرف -1 تکسیدی حالت رکھتا ہے جب کہ دیگر ہیلوجنوں میں -1 کے علاوہ +1, +3, +5, +7 تکسیدی حالت پائی جاتی ہے۔ فلورین ایک طاقتور تکسیدی عامل ہے اور ہیلوجنوں میں سب سے زیادہ تعاملیت رکھنے والا عنصر ہے۔

2.1.6 - جامد جوڑی کا اثر (Inert pair effect)

اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قلعی اور قلعوی خاکی دھاتوں (Alkali and alkaline earth metals) کی تکسیدی حالت ان میں موجود جملہ الیکٹرانوں کی تعداد کے مطابق بالترتیب +1 اور +2 ہے۔ اسی طرح p-بلاک عناصر میں موجود زیادہ سے زیادہ گرفتی الیکٹرانوں کی تعداد کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ تکسیدی حالت (oxidation state) ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ متغیر تکسیدی حالت (Variable oxidation state) کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بعد کے مروزی وزنی عناصر جو 13 سے 16 ویں گروپ میں پائے جاتے ہیں، ان میں اکثر کی مستحکم تکسیدی حالت (Stable oxidation state) ان کے گروپ کی تکسیدی حالت سے 2 کم ہوتی ہے۔ اور ان میں تکسیدی حالت کے پائے جانے کا رجحان ہوتا ہے۔ 13 ویں گروپ کے عناصر کو فرض کیجئے۔ جب ہم بوران سے وزنی عناصر کی طرف بڑھتے ہیں تو گروپ کی تکسیدی حالت کی بہ نسبت +1 تکسیدی حالت زیادہ پائی جاتی ہے جو +3 ہے۔ مثال کے طور پر Al^{+1} کی بہ نسبت Al^{+3} زیادہ مستحکم (قیام پذیر) (Stable) ہے۔ جب کہ Tl^{+3} کی بہ نسبت Tl^{+1} زیادہ مستحکم ہے۔ الوینیم (III) کلورائیڈ مستحکم ہے جب کہ، تھالیم (I) کلورائیڈ اور کلورین گیس کی بہ نسبت تھالیم (III) کلورائیڈ بہت ہی غیر مستحکم (Highly unstable) ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادنیٰ تکسیدی حالت میں تھالیم کا استحکام np الیکٹرانوں کے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ ns الیکٹرانوں کی وجہ سے۔ غرض بعد کے اعلیٰ (وزنی) مروزی عناصر میں، بیرونی s الیکٹرانوں میں (ns) میں جامد (inert) رہنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جو اسے بندش بننے سے روک رکھتا ہے۔ اس کو جامد جوڑی کا اثر (inert pair effect) کہتے ہیں۔ اسی قسم کا اثر 14, 15, 16 گروپوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

2.1.7 - p-بلاک عناصر میں بہروپیت Allotropism in p-block elements

چند ایسے عناصر ہیں، جو اپنی طبعی حالت میں ایک سے زیادہ قلمی یا سالمی شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن، ہیرا (ڈائی منڈ) اور گرافائٹ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس اثر کو بہروپیت (Allotropism) کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں allos کے معنی علاحدہ اور trope کے معنی تبدیلی ہے۔ عناصر کی مختلف شکلیں جو بنتی ہیں بہروپ کہلاتی ہیں۔ کئی p-بلاک کے عناصر بہروپیت ظاہر کرتے ہیں۔ چند عام بہروپوں کو جدول میں بتلایا گیا ہے۔

جدول 2.2 p-بلاک عناصر کے بعض عام بہروپ

Element	Most common allotropes
Boron	Amorphous boron, α -rhombohedral boron, β -rhombohedral boron, γ -orthorhombic boron, α -tetragonal boron, β -tetragonal boron
Carbon	Diamond, Graphite, Graphene, Fullerenes, Carbon nanotubes
Silicon	Amorphous silicon, crystalline silicon
Germanium	α -germanium, β -germanium
Tin	Grey tin, white tin, rhombic tin, sigma tin
Phosphorus	White phosphorus, Red phosphorus, Scarlet phosphorus, Violet phosphorus, Black phosphorus.
Arsenic	Yellow arsenic, gray arsenic & Black arsenic
Antimony	Blue-white antimony, Yellow, Black
Oxygen	Dioxygen, ozone
Sulphur	Rhombus sulphur, monoclinic sulphur
Selenium	Red selenium, Gray selenium, Black selenium, Monoclinic selenium,
Tellurium	Amorphous & Crystalline

2.2 گروپ 13 (بوران گروپ) کے عناصر (Group 13(Boron group) elements)

2.2.1 پایا جانا (Occurance)

بوران زیادہ تر بورائیٹ کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اہم کچ دھاتیں یہ ہیں۔ بوریکس $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ اور کرناٹ $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ۔ کثیر مقدار میں حاصل ہونے والی دھات الوٹیم ہے جو الوٹینوسلیکیٹ کے پتھروں میں آکسائیڈ کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ تجارتی طور پر اسے اس کی اہم کچ دھات باکسائیڈ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس گروپ کے دیگر عناصر بہت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دیگر عناصر یعنی In, Ga اور Tl ان کے سلفائیڈ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔

2.2.2 طبیعی خصوصیات (Physical properties)

گروپ 13 کے عناصر کی چند طبیعی خاصیتوں کو جدول میں بتلایا گیا ہے۔

جدول 2.3 گروپ 13 کے عناصر کے طبیعی خواص

تھلیم	انڈیم	کیلیم	الومینیم	بوران	خصوصیت
ٹھوس Solid	ٹھوس Solid	ٹھوس Solid	ٹھوس Solid	ٹھوس Solid	293K پر طبیعی حالت
81	49	31	13	5	جوہری عدد
^{205}Tl	^{115}In	^{69}Ga	^{27}Al	^{11}B	ہم جا (Isotopes)

Property	Boron	Aluminum	Gallium	Indium	Thallium
جوہری کمیت (293K) (g.mol ⁻¹ میں)	10.81	26.98	69.72	114.81	204.38
الکٹرائی تشکیل	[He]2s ² 2p ¹	[Ne]3s ² 3p ¹	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹
جوہری نصف قطر	1.92	1.84	1.87	1.93	1.96
کثافت	2.34	2.70	5.91	7.31	11.80
نقطہ پگھلاؤ	2350	933	302.76	429	577
نقطہ جوش	4273	2792	2502	2300	1746


2.2.3 بوران کے کیمیائی خواص (Chemical properties of Boron)

اس گروپ میں صرف بوران ہی ادھات ہے اور کم متعاملیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ تپش پر یہ تعامل پاتے ہیں۔ اس کے اکثر مرکبات میں الکٹران کی کمی ہوتی ہے اور ان میں ہم گرفتہ بندش غیر معمولی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی چھوٹی جسامت، زیادہ روانی توانائی اور برق منفیت میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ مشابہت ہے۔

دھاتی بورائیڈس کا بننا (Formation of metal borides)


قلوی دھاتوں کے سوا اکثر دھاتیں بورائیڈس بناتے ہیں جن کا عام ضابطہ M_xB_y ہے (x کا درجہ 11 تک اور y کا درجہ 66 تک یا اس سے زیادہ ہے)

بوران کے ساتھ دھات کا براہ راست امتزاج (تعال) (Direct combination of metals with Boron)




بوران ٹرائی ہائیڈرائڈ کی تحویل (Reduction of boron trihalides)

ڈائی ہائیڈروجن، جس کے ساتھ ایک دھات شامل ہوئی ہو، وہ بوران ٹرائی کلورائیڈ کے ساتھ تحویل پا کر دھاتی بورائیڈ Metal borides دیتے ہیں۔




ہائیڈرائڈس کا بننا (Formation of Hydrides)

بوران آسانی کے ساتھ ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل نہیں پاتا۔ اس کے باوجود یہ مختلف قسم کے hydrides بناتے ہیں جن کو boranes کہتے ہیں۔ ان میں سادہ ترین borane ڈی بورین B_2H_6 ہے۔ اسی طرح ڈی بورین سے اعلیٰ بورین تیار کر سکتے ہیں۔ کیسی حالت کے بوران ٹرائی فلورائیڈ کو سوڈیم ہائیڈرائڈ کے ساتھ 450 K کی تپش پر تعامل کیا جائے تو ڈی بورین حاصل ہوتا ہے۔ مسلسل تخریب کے عمل (pyrolysis) کو روکنے کے لئے حاصل شدہ ڈی بورین کو فوری طور پر باہر نکال لیا جاتا ہے۔




بوران ٹرائی ہائیڈرائڈ کی تیاری (Formation of boron trihalides)

بوران بلند تپش پر لوہجن کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو Boron trihalides بنتے ہیں۔




بوران نائٹرائڈس کی تیاری (Formation of boron nitride)

بوران بلند تپش پر ڈائی نائٹروجن dinitrogen کے ساتھ جلتا ہے تو Boron intride حاصل ہوتا ہے۔



آکسائیڈس کا بننا (Formation of Oxides)



جب بوران کو آکسیجن کے ساتھ تقریباً 900K تپش پر گرم کیا جاتا ہے تو اس کے Oxide بنتے ہیں۔




ترشے اور اساس کے ساتھ رد عمل (تفاعل) (Reaction with acids and alkali)

بوران کے ساتھ Halo acids رد عمل نہیں کرتے۔ جب کہ بوران تکسیدی ترشے جیسے کہ سلفیورک ترشہ اور نائٹریک ترشہ کے ساتھ تعامل پا کر

بورک ترشہ بناتا ہے۔



بوران پچھلے ہوئے سوڈیم ہائڈرائڈ آکسائیڈ کے ساتھ بوران تعامل پا کر سوڈیم بورائیٹ بناتا ہے۔



بوران کے استعمالات: (Uses of Boron)

- 1- بوران میں نیوٹران کو جذب کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لہذا اس کا ایسوٹوپ $^{10}B_5$ کو نیوکلیائی تعاملات میں بطور معادل گر (moderator) استعمال کرتے ہیں۔
- 2- راکٹ کے ایندھن کو جلانے کے لئے بوران کے سفوف کو استعمال کرتے ہیں۔
- 3- پودوں کی خلوی دیوار کے لئے بوران بہت مفید اور کارآمد ہے۔
- 4- بوران مرکبات کے کئی استعمالات ہیں۔ مثلاً آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے۔ ضد حیاتیات، دھونے والا سفوف، وغیرہ۔ جن میں بورک ترشہ اور بورا کس شامل ہیں۔ Pyrex glass کی تیاری میں بھی boric ترشہ کو استعمال کرتے ہیں۔

22.4 بوریکس [Na₂B₄O₇·10H₂O]

تیاری (Preparation)

بوریکس، سوڈیم نمک کا ٹٹرابورک ترشہ Sodium salt of Tetraboric acid ہے۔ جب سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ کولمانائٹ کے محلول کو جوش دیا جاتا ہے تو یہ حاصل ہوتا ہے۔



عمومی طور پر بورا کس کا فارمولا $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ہے۔ مگر اس میں Tetranuclear اکائیاں $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ شامل ہیں۔ اس کی اس شکل کو منشوری شکل (Prismatic form) کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بورا کس دوسری قسم میں بھی واقع ہوتے ہیں۔ ان کے نام Octahedral borax $[\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}]$ اور borax glass $(\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7)$ ہیں۔

خواص : (Properties)

بورا کس قدرتی طور پر اساسی نوعیت رکھتا ہے۔ یہ گرم پانی کے محلول میں قلعوی ہوتے ہیں، جب کہ یہ بورک ترشے اور sodium hydroxide میں تحلیل پاتے ہیں۔



جب ان کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ شفاف بورا کس کے موتی (borax beads) دیتے ہیں۔



بورا کس ترشوں کے ساتھ رد عمل پاتا ہے تو ناعمل پذیر بورک ترشہ بناتا ہے۔



امونیم کلورائیڈ کے ساتھ تعامل پاتا ہے تو بوران نائٹرائڈ بنتا ہے۔




بورا کس کے استعمالات (Uses of Borax)

- 1۔ بورا کس کو رنگین دھاتی روانوں کی شناخت (جانچ) کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2۔ اس کو بصری اور borosilicate glass، وارنش چینی کے برتن میں چمک پیدا کرنے اور بنانے کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔
- 3۔ دھات سازی میں تلچھٹ کے جیسا اور محافظ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔

2.2.5 بورک ایسڈ $[\text{H}_3\text{BO}_3]$ یا $\text{B}(\text{OH})_3$ Boric Acid

تیاری (Preparation) : بورک ایسڈ کو اس کی کچھ دھات بورا کس اور colemanite سے حاصل کرتے ہیں۔




خواص (Properties)



بورک ترشہ ایک بے رنگ شفاف سفوف ہے۔ یہ بہت کمزور اکھرا اساسی ترشہ ہے اور یہ پروٹان کو دینے کے بجائے ہائیڈراکسل رواں حاصل کرتا ہے۔



Sodium Hydroxide کے ساتھ تعامل پاکر Sodium meta borate اور Sodium tetra borate دیتے ہیں۔




حرارت کا اثر (Action of Heat) : 373K کی تپش پر بورک ترشہ کو گرم کیا جاتا ہے تو meta boric ترشہ حاصل ہوتا ہے اور 413K کی تپش پر یہ ٹٹرا بورک ترشہ دیتا ہے۔ گرم سرخ ہونے پر red hot یہ Boric anhydride دیتا ہے، جو ایک شیشہ جیسا شے ہوتی ہے۔



امونیا کے ساتھ تعامل (Action of Ammonia)

بورک ایسڈ کو امونیا کے ماحول میں 800-1200 K کی تپش پر یوریا کے ساتھ کچھلایا جاتا ہے تو یہ بوران نائٹرائڈ دیتا ہے۔



اتھیل بوریٹ کی جانچ (Ethyl borate test)

جب بورک ترشہ یا بوریٹ کے نمک کو مرکب سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں اتھیل الکحل کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو ٹری اتھیل بوریٹ نامی اسٹر بنتا ہے۔ اس ester کے آبی بخارات کو جلایا جاتا ہے تو یہ سبز کنارے والے شعلہ کے ساتھ جلتے ہیں۔ اس تعامل کو Borate کی موجودگی کی جانچ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔


مرکب سلفیورک ترشہ




نوٹ: سوڈیم ہائیڈرائٹ میں ٹرائی ہائیڈرو بورائیٹ کے ساتھ ٹری الکھل بوریٹ تعامل پاتا ہے تو ایک کوآرڈینیٹن کامرکب $\text{Na}[\text{BH}(\text{OR})_3]$ جو ایک طاقتور تھکیدی عامل ہے۔

بوران ٹری فلورائیڈ کا بننا (Formation of Boron trifluoride)

مرکب سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں بورک ترشہ Calcium Fluoride کے ساتھ مل کر تعامل پاتا ہے تو Boron trifluoride بنتا ہے۔



بورک ترشہ کو سوڈے کی راکھ (سوڈیم کاربونیٹ) کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو یہ بورا کس دیتے ہیں۔




بورک ترشہ کی ساخت (Structure of Boric acid)

بورک ترشہ دوابعادی سطحی ساخت رکھتا ہے۔ یہ $(\text{BO}_3)^{3-}$ اکائیوں سے بنا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ hydrogen بندشوں سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ خاکہ 2.2 میں بتایا گیا ہے۔

بورک ترشہ کے استعمالات: (Uses of Boric Acid)

- 1- بورک ترشہ کو چینی کی برتن سازی، وارنش اور رنگین مادوں کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔
- 2- ضدحیاتیات (antiseptic) کے طور پر اور آنکھ میں ڈالنے کے قطروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔
- 3- غذائی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔



خاکہ 2.2 بورک ترشہ کی ساخت

2.2.6 ڈی بورین (Diborane)


تیاری: (Preparation)

پچھلے اسباق میں ہم بحث کر چکے ہیں کہ بوران کے ساتھ metal hydride کے حرارتی اثر سے diborane بنتے ہیں۔ اس طریقہ سے صنعتی پیمانے میں تیاری کی جاتی ہے۔

کم مقدار میں بھی اس کو حاصل کرنے کے لئے Diglyme کے ساتھ ایوڈین ملا کر اس کے ساتھ Sodium boro hydride تعاملات اثر پذیر ہیں۔






HCl ترشے کے ساتھ Magenisum boride کو گرم کیا جاتا ہے تو boranes کے آبی محلول کا آمیزہ حاصل ہوتا ہے۔





خواص (Properties)

بورین بے رنگ، دوہری مقناطیسی والا مرکب، کم حرارتی طور پر کم مستحکم (قیام پذیر) مرکب ہے۔ کمرے کی پیش پر یہ گیس کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس میں میٹھی بو ہوتی ہے اور یہ نہایت ہی زہریلا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ تر تعاملات پاتے ہیں۔ بلند تپش پر یہ ہائیڈروجن کو خارج کرتے ہوئے اعلیٰ درجہ کے بورین Boranes بناتے ہیں۔



ڈی بورین، پانی اور alkali کے ساتھ تعامل پا کر بورک ترشہ اور بالترتیب Metaborate دیتے ہیں۔



ہوا کے ساتھ تعامل: (Action of air)

کمرے کی پیش پر خالص بورین ہوا اور آکسیجن کے ساتھ تعامل نہیں پاتے، مگر غیر خالص بورین زیادہ مقدار میں حرارت خارج کرتے ہوئے B_2O_3 دیتے ہیں۔



Methyl alcohol کے ساتھ تعامل diborane تعامل پا کر Trimethyl borate دیتے ہیں۔




ہائڈرو بوریشن (Hydroboration)

کمرے کی پیش پراپیٹر کے محل میں alkene اور alkyne کے ساتھ diborane کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کے تعاملات hydroboration تعاملات کہلاتے ہیں۔ نامیاتی کیمیائی صنعت گاہوں میں یہ کثیر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں۔ خاص کر Anti Markovnikov addition بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔





روانی hydrides کے ساتھ تعامل

metal hydrides کے ساتھ تعامل کرنے پر یہ metal borohydrides بناتا ہے۔




امونیا کے ساتھ رد عمل (Reaction with Ammonia)

جب افزودہ امونیا کے ساتھ کم پیش پر diborane کے ساتھ تعامل پاتا ہے تو diborane diamonate بناتا ہے۔ اعلیٰ پیش پر گرم کرنے



diborane کی ساخت (structure of Diborane)



diborane میں دو BH2

اکائیاں دو bridged hydrogen کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس میں آٹھ B-H بندشیں ہیں۔ تاہم diborane میں صرف 12 گرفت الکٹران پائے جاتے ہیں، جو عام ہم گرفت الکٹران بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ چار انتہائی B-H بندشیں، عام ہم گرفت ہیں۔ (دو درمیانی، دو الکٹران بندشی یا 2c-2e بندشیں) ہیں۔ باقی کے چار الکٹرانوں کو bridged bonds کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے۔

یعنی دو عدد تین مرکزی B-H-B بندشیں، ہر ایک دو الکٹرانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ بندشیں تین مرکزی-دو الکٹران بندشیں (3c-2e) ہوتی ہیں۔ ہائڈروجن کے bridging جو ہر ایک سطح پر اس طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ خاکہ 2.3 میں دکھایا گیا ہے۔

Diborane میں بوران sp^1 قسم سے مخلوط (Hybridise) ہوتا ہے۔ چار sp^3 مخلوط مدار یوں میں سے تین میں ایک الیکٹران پایا جاتا ہے اور چوتھا مدار یہ خالی ہوتا ہے۔ بوران کے ہر مخلوط شدہ نصف بھرے ہوئے دو مدار یے، ہائڈروجن کے دو جوہروں کے $1s$ مدار یے پر منطبق (overlap) ہو کر چار انتہائی $2c-2e$ بندشیں (terminal bonds) بناتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بوران کے ہر جوہر میں ایک خالی اور ایک نصف بھرا ہوا مخلوط مدار یہ باقی رہتا ہے۔ بوران کے ایک نصف مخلوط مدار یہ میں، تین مرکزی-دوالکٹروانی بندشیں (B-H-B بندشیں) بنتے ہیں۔ بوران کے دوسرے خالی مخلوط مدار یے میں ہائڈروجن کا نصف بھرا ہوا $1s$ مدار یہ مخلوط ہوتا ہے۔

diborane کے استعمالات:

- 1- Diborane کو propellant میں اعلیٰ توانائی والے ایندھن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- نامیاتی کیمیا میں تسیدی عامل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- اسے بطور Welding torches کی طرح دھاتوں کو جوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

2.2.7 بوران ٹری فلورائیڈ Boron Trifluoride

تیاری: Preparation:

مرکز سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں کیلشیم فلورائیڈ کے ساتھ Boron trioxide تعامل پا کر Boron trifluoride بناتا ہے۔



اس کے علاوہ اس کو Boron trioxide کے ساتھ کاربن اور فلورین تعامل پاتا ہے تو بھی Boron trifluoride حاصل ہوتا ہے۔



تجربہ خانہ میں benzene diazonium tetrafluoro borate کی حرارتی تحلیل سے خالص BF_3 حاصل ہوتا ہے۔



خواص (Properties)

BF_3 کی شکل مستوی (Planar) ہے۔ اس مرکب میں الیکٹران کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ جوڑی دار الیکٹران کو حاصل (قبول) کر کے

co-ordinate covalent bond بناتا ہے۔ یہ کمپلکس کی ایک قسم (BX_4) بناتے ہیں۔



اس کی آب پاشیدگی سے boric ترشہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ Hydrofluoboric acid میں تبدیل ہو جاتا ہے۔




BF_3 کے استعمالات

- 1- BF_3 کو BF_4H کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نامیاتی کیمیا میں ایک تماسی عامل (Catalyst) کی طرح استعمال ہوتا ہے۔
- 2- اس کو Fluorinating reagent کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔


2.2.8 الومینیم کلورائیڈ (Aluminium chloride)

تیاری (Preparation)


ہائڈروکلورک ترشہ کے ساتھ جب دھاتی الومینیم یا الومینیم ہائڈراکسائیڈ تعامل پاتا ہے تو Aluminium trichloroide حاصل ہوتا ہے۔ تعامل کے اس آمیزہ کی تیاری سے آئیدہ الومینیم کلورائیڈ حاصل ہوتا ہے۔



الومینا اور کوک (کونڈ) کے آمیزہ کو کلورین کی رو میں گرم کیا جائے تو الومینیم کلورائیڈ حاصل ہوتا ہے۔



صنعتی پیمانہ میں تقریباً 1000 k پر الومینیم کو Chlorinate کر کے الومینیم کلورائیڈ کو حاصل کیا جاتا ہے۔



خواص: (Properties)

ناہیدہ الومینیم کلورائیڈ بے رنگ، رطوبت حاصل کرنے والی شے ہے۔ الومینیم کلورائیڈ کا آبی محلول ترشوی نوعیت رکھتا ہے۔ رطوبتی ہوا میں یہ Hydrogen Chloride کا بخاراتی دھواں (fumes) دیتا ہے۔



Ammonium hydroxide کے ساتھ یہ aluminium hydroxide دیتے ہیں۔



افزودہ sodium hydroxide کے ساتھ یہ دھاتی Metal aluminate دیتے ہیں۔



یہ Lewis acid لیوس ترشوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، اور امونیا، فاسفین اور کاربونیل کلورائیڈ کے ساتھ یہ اضافی مرکبات (Addition compounds) دیتے ہیں۔ مثال $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$

الومینیم کلورائیڈ کے استعمالات

- 1- فریڈل کرافٹ تعاملات میں ناہیدہ الومینیم کلورائیڈ کو بطور تماسی عامل (Catalyst) استعمال کرتے ہیں۔
- 2- معدنیاتی تیل کے ترخاؤ کے عمل سے پٹرول بنانے کی تیاری میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔
- 3- رنگین مادے، ادویات اور خوشبودار اشیاء کی تیاری میں بطور تماسی عامل استعمال ہوتا ہے۔

2.2.9 پھلکریاں (Alums)

Potassium aluminium sulphate $[\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ کے دوہرے نمک کو پھلکری (Alum) نام دیا گیا

ہے۔ آج کل اس کو تمام دوہرے نمکوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا عام ضابطہ یہ ہے۔

$(\text{SO}_4)_3 \cdot 24 \text{H}_2\text{O} \cdot \text{M}'_2\text{SO}_4 \cdot \text{M}''$ ، جس میں M' ایک گرفت دھاتی رواں یا $[\text{NH}_4]^+$ اور M'' تین گرفت والادھاتی رواں ہوتا ہے۔


مثالیں:

Potash alum $[K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$; Sodium alum $[Na_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$,
Ammonium alum $[(NH_4)_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$, Chrome alum $[K_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$.

ٹھنڈے پانی کی بہ نسبت گرم پانی میں Alum زیادہ حل پذیر ہیں۔ محلول میں یہ اپنے ترکیبی روانوں کے خواص کو ظاہر کرتے ہیں۔

تیاری (Preparation)



قدرتی طور پر دستیاب ہونے والا پھٹکری کا پتھر alunite stone ہے۔ اس کا ضابطہ $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 4Al(OH)_3$ ہے۔ جب پھٹکری کے پتھر کو افزودہ سلفیورک ترشہ کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تو اس میں موجود الوئیم ہائڈراکسائیڈ، الوئیم سلفیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک محسوب کردہ مقدار میں پوٹاشیم سلفیٹ شامل کیا جاتا ہے اور اس محلول کو قلمایا جاتا ہے تو potash alum حاصل ہوتا ہے۔ اس کو باز قلماء (recrystallisation) کے ذریعہ مزید خالص بنایا جاتا ہے۔



خواص (Properties)

potash alum پھٹکری سفید رنگ کا ایک ٹھوس قلم ہے۔ یہ پانی میں حل پذیر ہے اور الکحل میں ناعمل پذیر ہے۔ الوئیم سلفیٹ کے آب پاشیدگی کی وجہ سے اس کا آبی محلول ترشوی خاصیت رکھتا ہے۔ الوئیم سلفیٹ کو 365 K کی تپش پر گرم کرنے سے یہ کھلتا ہے۔ 475 K کی تپش پر یہ قلماء کے پانی کو کھو کر پھول جاتے ہیں۔ پھولے ہوئے اس مادہ کو Burnt Alum کہتے ہیں۔ سرخ گرم کرنے پر یہ

Potassium Sulphate, alumina اور Sulphur trioxide میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔



Potash alum کے ساتھ ammonium hydroxide تعامل پاتا ہے تو Aluminium Hydroxide بنتا ہے۔



پھٹکری کے استعمالات: (Uses of Alum)

- 1۔ پانی کو پاک و صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
- 2۔ اس کو water proofing کرنے اور پارچہ بانی (textiles) میں استعمال کرتے ہیں۔
- 3۔ رنگ سازی میں، کاغذ اور چمڑے کی دباغی صنعتوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔
- 4۔ خون کے جاری ہونے کو بند کرنے کے لئے قابض دوا (Styptic agent) کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

2.3 گروپ 14 (کاربن گروپ) کے عناصر: (Group 14 (Carbon group) elements)

2.3.1 پایا جانا (Occurence)

کاربن قدرتی طور پر گرافائیٹ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کوئلہ، خام تیل اور کاربونیٹ کی چٹانیں جیسے Magnesite، calcite وغیرہ، جس میں کثیر مقدار میں کاربن، دیگر عناصر کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ سیلیکا (ریت اور کوارٹز کے قلموں) کی شکل میں سیلیکان پایا جاتا ہے۔ سیلیکٹ کے معدن اور چکنی مٹی، سیلیکان کے دیگر اہم ذرائع ہیں۔

طبیعی خواص : (Physical Properties)

گروپ 14 کے عناصر کی چند طبیعی خصوصیات کو ذیل کی جدول میں بتلایا گیا ہے۔

جدول 2.4 گروپ 14 کے عناصر کی طبیعی خصوصیات

سیسہ	قلعی	جرمنیم	سیلیکان	کاربن	خاصیت
ٹھوس	ٹھوس	ٹھوس	ٹھوس	ٹھوس	Physical state at 293 K
82	50	32	14	6	Atomic Number
^{208}Pb	^{120}Sn	$^{73}\text{Ge}, ^{74}\text{Ge}$	$^{28}\text{Si}, ^{30}\text{Si}$	$^{12}\text{C}, ^{13}\text{C}, ^{14}\text{C}$	Isotopes
207.2	118.71	72.63	28.09	12.01	Atomic Mass (g.mol ⁻¹ at 293 K)
$[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$	$[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^2 5p^2$	$[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^2$	$[\text{Ne}] 3s^2 3p^2$	$[\text{He}] 2s^2 2p^2$	Electronic configuration
2.02	2.17	2.11	2.10	1.70	Atomic radius (Å)
11.30	7.29	5.32	2.33	3.51	Density (g.cm ⁻³ at 293 K)
601	505	1211	1687	Sublimes at	Melting point (K)
2022	2859	3106	3538	4098	Boiling point (K)

2.3.3 زنجیری یا حلقوی مرکبات بننے کا رجحان (Tendency for catenation)


ایک عنصر کا جوہروں کے ساتھ مل کر طویل زنجیر یا حلقے بنانے کی قابلیت Catenation کہلاتی ہے۔ Catenation کے لئے درج ذیل شرائط ضروری ہیں۔ (i) عنصر کی گرفت دو یا دو سے زیادہ ہونی چاہئے۔ (ii) عنصر کے اندر وہ خاصیت ہونی چاہئے کہ وہ خود سے اپنے سے اندر بند سازی قائم کرے۔ (iii) اپنے جوہروں کے ساتھ بندش بھی اتنی مضبوط ہونی چاہئے جتنا کہ دوسرے جوہروں کے ساتھ۔ (iv) دیگر سالموں کی بہ نسبت زنجیری مرکبات کی kinetic inertness ہونی چاہئے۔

اوپر بتائے گئے خواص کی وجہ سے کاربن خود اپنے ساتھ اور دیگر جوہر جیسے H, O, N, S کے ساتھ بھی بے شمار مرکبات بناتے ہیں۔

2.3.4 کاربن کے بہروپ (Allotropes of carbon)




کاربن مختلف بہروپی شکلوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ گرافائیٹ اور ڈائمنڈ (ہیرا) اس کی دو اہم بہروپی شکلیں ہیں۔ دوسرے اہم بہروپ گرافین، فلرین اور کاربن کی nanotubes ہیں۔

کاربن سے بنا ہوا گرافائیٹ عام تپش اور دباؤ پر اہم مستحکم (قیام پذیر) بہروپ ہے۔ یہ نرم ہے اور برق کا اچھا موصل ہے۔ یہ کاربن کے دو ابعادی مستوی سطحوں (Sheet) سے بنا ہوا ہے۔ ہر سطح میں کاربن کے جوہر اپنے پڑوسی کاربن کے جوہروں کے ساتھ sp^2 مخلوط ہے۔ جس میں C-C کی بندشیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بندش کا فاصلہ 1.41 Å ہے، جو بنزین کے C-C بندشوں کے فاصلے (1.40 Å) سے قریب ہے۔ کاربن کا ہر جوہر تین کاربن کے گرفتی الیکٹرانوں کو استعمال کرتے ہوئے پڑوسی تین کاربن کے



جوہر کے ساتھ مل کر تین سیگما σ bond بناتے ہیں اور چوتھا الیکٹران جو غیر مخلوط p مدار یہ میں ہوتا ہے، π بندش (π bond) بناتا ہے۔ یہ π الیکٹران مکمل طور پر سطحوں (تہ پر) (sheet) پر گھومتے ہیں اور برقی ایصال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پے در پے جڑے ہوئے کاربن کی تہیں کمزور واٹڈ والس کی قوتوں سے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پے در پے والی ان سطحوں کا درمیانی فاصلہ $3.40 \text{ \AA}$ ہے۔ یہ مدہن lubricant کی طرح یا گرافائٹ آئل کی طرح استعمال کرتے ہیں۔


گرافائٹ کے برخلاف گرافائٹ کا دوسرا بہروپ ہیرا (diamond) نہایت ہی سخت ترین ہے۔ ہیرے میں کاربن کے جوہر اپنے پڑوسی کاربن کے جوہروں کے ساتھ sp^3 طور پر مخلوط ہے جس میں C-C کی بندشوں کا فاصلہ $1.54 \text{ \AA}$ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ چہار سطحی



(Tetrahedral) طور پر مکمل جالی (lattice) میں ترتیب پایا ہوا ہے، جیسا کہ خاکہ 2.5 میں بتایا گیا ہے۔ چونکہ کاربن کے تمام گرتی الیکٹران بندش میں ہیں، اس میں برقی ایصال کے لئے آزاد الیکٹران موجود نہیں ہیں۔ سخت ترین ہونے کی وجہ سے اسے سخت آلہ کو تیز کرنے، شیشہ کو کاٹنے، بور اور پتھروں میں سوراخ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

کاربن کا نیا تیار کردہ بہروپ فلرین ہے۔ گرافائٹ اور ہیرے کے برخلاف، یہ بہروپ سب سے الگ سالے ہیں، جیسا کہ C_{50} ، C_{32} ، C_{70} ، C_{76} ، وغیرہ۔ ان سالموں میں پنجرہ جیسی ساخت پائی جاتی ہے جیسا کہ خاکہ 2.6 میں بتایا گیا ہے۔ اس کاربن کے بہروپ کی شکل ایک ساکر بال (Soccer ball) کی طرح ہوتی ہے اور اسے بل منسٹر فلرین یا بکی بال کہتے ہیں۔ اس میں ایک لکھلی ہوئی ساخت ہے جس میں 6 ممبر والے 20 حلقے، اور 5 ممبر والے 12 حلقے پائے جاتے ہیں۔ کاربن کا ہر جوہر sp^2 کی طرح مخلوط ہے اور پڑوسی تین کاربن کے جوہر کے ساتھ مل کر تین سیگما σ bond بناتے ہیں اور چوتھا الیکٹران جو غیر مخلوط p مدار یہ میں ہوتا ہے، π بندش (π bond) بناتا ہے۔ یہ π الیکٹران مکمل طور پر سطحوں (تہ پر) (sheet) پر گھومتے ہیں اور یہ اس کے عطری خاصیت (Aromatic character) کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا C-C بندش فاصلہ $1.44 \text{ \AA}$ اور C=C بندش فاصلہ $1.38 \text{ \AA}$ ہے۔

کاربن کا ایک اور نیا تیار کردہ بہروپ کاربن نینوٹیوب ہے، جس میں گرافائٹ جیسا ٹیوب، مگر فلرین جیسے کنارے ہیں۔ محور پر یہ نینو ٹیوب فولاد سے مضبوط ہیں اور برقی رو کو ایصال کرتے ہیں۔ نینو اسکیل الیکٹرانکس، Catalysis، پالیمر اور ادویات میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔



خاکہ 2.8 گرافین کی ساخت

کاربن کی ایک اور بہروپی شکل گرافین ہے۔ اس میں کاربن کے جوہروں کی sp^2 مخلوط شدہ اکہری مستوی سطح پائی جاتی ہے، جو ایک شہد کی مکھی کے چھتہ نما قلمی جالی میں پیک کردہ ہیں۔

2.3.5 کاربن مونوآکسائیڈ (Carbon monoxide)(CO)

تیاری (Preparation)

کاربن کو آکسیجن کی کم مقدار کے ساتھ تعامل کر کے کاربن مونوآکسائیڈ

تیار کیا جاتا ہے۔



صنعتی پیمانے میں تیاری کے لئے کاربن کو ہوا کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے۔ جو کاربن مونوآکسائیڈ حاصل ہوتا ہے، اس میں نائٹروجن گیس بھی پائی جاتی ہے۔ حاصل ہونے والے نائٹروجن گیس کا آمیزہ اور کاربن مونوآکسائیڈ کے آمیزہ کو تیار کردہ گیس (producer gas) کہتے ہیں۔



تیار کردہ گیس کو copper (I) chloride کے محلول سے گزارا جاتا ہے، جس سے $CuCl(CO) \cdot 2H_2O$ بنتا ہے۔ کم دباؤ پر یہ محلول خالص CO خارج کرتا ہے۔

methanoic acid کو سلفیورک ترشہ کے ساتھ گرم کرنے سے خالص کاربن مونوآکسائیڈ گیس تیار ہوتی ہے جو ایک نابیدہ عامل (Dehydrating agent) کی طرح کام کرتی ہے۔




خواص (Properties)

یہ بے رنگ، بے بو اور زہریلی گیس ہے اور یہ پانی میں کم حل پذیر ہے۔




یہ ہوا میں نیلے رنگ کے شعلے کے ساتھ جلتے ہوئے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں۔

لکڑی کے کوئلے کی موجودگی میں کاربن مونوآکسائیڈ کے ساتھ کلورین تعامل پاتے ہیں تو زہریلی گیس کاربونیل کلورائیڈ خارج ہوتی ہے جس کو Phosgene بھی کہتے ہیں۔ اس کو isocyanate کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔




کاربن مونوآکسائیڈ طاقتور تکسیدی عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔



زیادہ دباؤ اور تپش میں کاربن مونوآکسائیڈ اور ہائیڈروجن (مصنوعی گیس یا Methanol (Syn gas دیتے ہیں۔




oxo طریقے میں ethene کے ساتھ کاربن مونوآکسائیڈ اور hydrogen gas کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو propanal حاصل ہوتا ہے۔



فشرٹراپوش کی ترکیب Fischer Tropsch Synthesis

50 atm سے کم دباؤ اور 500-700 K تپش پردھاتی تماشای عامل کے ساتھ کاربن مونوآکسائیڈ اور ہائیڈروجن ردعمل کر کے سیر شدہ اور




مروری عناصر کے ساتھ کاربن مونوآکسائیڈ تعامل پا کر لاتعداد پیچیدہ مرکبات بناتا ہے۔ جس میں ان مروری عناصر کی تکسیدی حالت صفر ہوتی ہے۔ یہ مرکبات دھات کے ساتھ کاربن مونوآکسائیڈ کو گرم کر کے حاصل کئے جاتے ہیں۔

مثالیں: Nickel tetracarbonyl $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, Iron pentacarbonyl $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, Chromium hexacarbonyl $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$.

ساخت (Structure)

اس کی ساخت خطی ہے۔ کاربن مونوآکسائیڈ میں تین الیکٹران کی مشترکہ جوڑی کاربن اور آکسیجن کے درمیان ہوتی ہے۔ گیارھویں جماعت میں سالمیاتی مداروں کے نظریہ (MOT) کی درجہ بندی سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں C-O کا بندشی فاصلہ $1.128 \text{ \AA}$ ہے۔ اس کی ساخت کو دو ساختوں کے مرکب resonane hybrid کی طرح دو معیاری شکلوں (canonical forms) میں بتایا گیا ہے۔



خاکہ 2.9 کاربن مونوآکسائیڈ کی ساخت

کاربن مونوآکسائیڈ کے استعمالات:

- 1- مساوی مول کے ہائیڈروجن اور کاربن مونوآکسائیڈ کا مرکب سے آبی گیس (water gas) تیاری کی جاتی ہے۔
- 2- کاربن مونوآکسائیڈ اور نائٹروجن کے مرکب سے پیداوری گیس (Producer gas) تیاری کی جاتی ہے، جو اہم صنعتی ایندھن ہیں۔
- 3- کاربن مونوآکسائیڈ ایک اہم لیگنڈ (ligand) ہے۔ یہ مروری عناصر کے ساتھ مل کر کاربونیل مرکبات بناتے ہیں۔

2.3.6 کاربن ڈی آکسائیڈ (Carbon dioxide)

کاربن ڈی آکسائیڈ فطرت میں آزاد حالت کے ساتھ ساتھ مشترکہ حالت میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہوا کے اجزاء میں یہ 0.03% ہوتی ہے۔ یہ چٹانوں میں Calcium carbonate اور Magenisum carbonate کے طور پر بھی پائی جاتی ہے۔

تیاری (Production)

صنعتی پیمانے پر زائد ہوا میں لکڑی کے کوئلہ کو جلا کر اسے تیار کیا جاتا ہے۔



چونے کی تکلیس (Calcination) کے دوران یہ ایک ضمنی حاصل (By product) کی طرح حاصل ہوتی ہے۔



تجربہ خانہ میں اسے ہلکائے ہوئے HCl ترشے اور دھاتی کاربونیٹ کے تعامل کر کے تیار کیا جاتا ہے۔



خواص (Properties)

1- یہ ایک بے رنگ، بے احتراق (nonflammable) گیس ہے۔ ہوا سے زیادہ وزن دار ہے۔ اس کی فاصلہ تپش

(Critical temperature) 31°C ہے اور یہ آسانی سے مائع بن سکتی ہے۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک مستحکم مرکب ہے یہاں تک کہ یہ 3100 K کی تپش میں بھی صرف 76 % تحلیل پا کر کاربن مونو آکسائیڈ اور آکسیجن بناتی ہے۔ اور بھی اعلیٰ تپش پر یہ کاربن او آکسیجن میں تحلیل پاتا ہے۔




تکسیدی عمل (Oxidising behaviour)

بلند درجہ حرارت پر یہ ایک طاقتور تکسیدی عامل کے طور پر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر



پانی گیس کا توازن (Water gas equilibrium)

کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن کے درمیان توازن رد عمل کی وجہ سے اس کے کئی صنعتی اطلاقات ہیں۔ اسے پانی گیس توازن Water gas کہا جاتا ہے۔




ترشوی نوعیت (Acidic behaviour)

کاربن ڈائی آکسائیڈ کا آبی محلول ہلکا تیزابی ہوتا ہے، کیوں کہ یہ کاربونک ترشہ بن جاتا ہے۔



کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ساخت (Structure of Carbon dioxide)

کاربن ڈائی آکسائیڈ خطی ساخت رکھتا ہے جس میں دونوں C-O کی بندشیں مساوی بندشی فاصلہ (Bond distance) رکھتی ہیں۔ اس سالمہ میں دو C-O سگما بندشیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں $3c-4e$ بندش بھی پائی جاتی ہے جو تینوں جوہروں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔



خاکہ 2.10 کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ساخت

کاربن ڈائی آکسائیڈ کے استعمالات:

- 1- کیمیائی تیاریوں کے دوران ایک جامد فضا (inert atmosphere) پیدا کرنے کے لئے کاربن ڈائی آکسائیڈ استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- حیاتیات میں یہ شعاعی ترکیب کے لئے بہت ضروری ہے۔


3- یہ آگ بجھانے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ یہ راکٹ کے انجنوں میں دھکیل پیدا کرنے والی گیس ہے۔

4- یہ کاربونیڈ مشروبات کی تیاری میں اور جھاگ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔


2.3.7 سیلیکان ٹٹراکلورائیڈ (Silicon tetrachloride)

تیاری (Preparation)

خشک کلورین گیس کو سیلیکا اور کاربن کے آمیزہ کے ساتھ 1675 K تپش پر چینی کی نالی میں گرم کرنے سے silicon tetrachloride حاصل ہوتا ہے۔



رتی پیمانے پر ہائیڈروجن کلورائیڈ گیس کے ساتھ سیلیکان کو 600 K تپش پر گرم کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے۔



خواص (Properties)

Silicon tetrachloride ایک بخاراتی دھواں دار (fuming) مائع ہے۔ یہ -70°C تپش پر منجمد freeze ہوتا ہے۔ مرطوب ہوا میں کاربن ٹٹراکلورائیڈ کے آب پاشیدگی کے عمل سے سیلیکا اور ہائیڈروکلورک ترشہ بنتا ہے۔




جب silicon tetrachloride نم ایتھر کے ساتھ آب پاشیدگی کا اثر ہوتا ہے تو خطی perchloro siloxanes بنتے ہیں،

[Cl-(Si Cl₃ O)_nSiCl₃] جس میں n کی تعداد 1 تا 6 ہے۔


الکوحلیت: (Alcoholysis)

مناسب متعامل گر (reagent) کو استعمال کر کے Silicon tetrachloride کے کلورائیڈ رواں کو OH، OR جیسے Nucleophile سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الکحل کے ساتھ یہ Silicic esters بناتے ہیں۔



امونیا لیس (Ammonialysis)

اس طرح سیلیکان ٹٹراکلورائیڈ، امونیا لیس کے عمل سے Chlorosilazanes دیتے ہیں۔



استعمالات:


- 1- Silicon tetrachloride نیم موصل سیلیکان کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- یہ سیلیکا جل۔ سلیک ایٹر کے لئے ایک binder کی ترکیب میں شروعاتی مادے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

2.3.8 سیلیکون (Silicones)



Silicone یا poly siloxanes، یہ Organo silicon کثیر ترکیبے ہیں۔ ان کا عام ضابطہ (R₂SiO) ہے۔ چونکہ ان کا عام ضابطہ Ketone (R₂CO) ہی کی طرح ہے، انہیں سیلیکون نام دیا گیا ہے۔ یہ خطی یا آڑے ترچھے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا اعلیٰ تپش کے استحکام (مزاہمت) کی وجہ سے انہیں high temperature polymers کہتے ہیں۔

تیاری (Preparation)


عام طور پر $\text{dialkyl dichloro silanes (R}_2\text{SiCl}_2)$ یا $\text{diaryldichlorosilanes (Ar}_2\text{SiCl}_2)$ کی آب پاشیدگی سے سیلیکون تیار کئے جاتے ہیں۔ تانبے کو بطور متاسی عامل استعمال کر کے RCl یا ArCl کے بخارات کو 570 K کی تپش پر سیلیکان سے گزار کر انہیں تیار کیا جاتا ہے۔



Dialkylchloro silanes R_2SiCl_2 کی آب پاشیدگی (Hydrolysis) سے ایک خطی زنجیری کثیر ترکیبہ (Polymer) حاصل ہوتا ہے جو دونوں جانب بڑھتا ہے۔



RSiCl₃ Monoalkylchloro silanes کی آب پاشیدگی سے ایک نہایت ہی پیچیدہ آڑا ترچھا کثیر ترکیبہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر خطی سلیکون کے آخری -OH گروپ کو خارج کر دیا جائے بانی کا سالمہ نکل جاتا ہے اور یہ دائری یا حلقوی سلیکون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



سلیکون کی قسمیں (Types of silicones)

(i) خطی سلیکون (Linear Silicones)

dialkyl (or) diaryl silicon chloride کی آب پاشیدگی (Hydrolysis) اور فوراً تکثیف (Condensation) کے بعد انہیں حاصل کیا جاتا ہے۔

(a) سلیکون ربڑ (Silicone rubbers) : سلیکون کو پتھیلین یا اسی طرح کے گروپ کے ساتھ جوڑنے سے سلیکون ربڑ حاصل ہوتے ہیں۔
(b) سلیکون گوند (Silicone resins) : اکریک اسٹر (Acrylic ester) جیسے نامیاتی گوند کے ساتھ سلیکون کو پیسا جاتا ہے تو سلیکون گوند حاصل ہوتے ہیں۔

(ii) دائری سلیکون (Cyclic silicone) :

R_2SiCl_2 کی آب پاشیدگی سے یہ حاصل ہوتے ہیں۔

(iii) آڑے ترچھے جڑے ہوئے سلیکون (Cross linked silicone) $RSiCl_3$ کی آب پاشیدگی سے یہ حاصل ہوتے ہیں۔

خواص (Properties)

سلیکون کے کثیر ترکیبہ (Polymer) کی نوعیت Alkyl group کے آڑے ترچھے جڑے اور حد پر منحصر ہے۔ وہ تیل نمائے سے ربڑ جیسے ٹھوس شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ تمام سلیکون پانی کے مزاحم (Water repellent)۔ organic side group کا silicone کے اطراف گھیرے رہنے کی وجہ سے یہ ایک alkane کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں پانی سے مزاحمت کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ حرارت اور برق کے غیر موصل ہیں۔ کیمیائی طور پر یہ غیر تعامل پذیر ہیں۔ ہلکے سلیکون تیل نمائے ہیں، جب کہ اعلیٰ سلیکون طویل زنجیری ساختیں ہیں اور یہ موم نما ٹھوس ہیں۔ سلیکون کے تیل کی لزوجیت (Viscosity) ہمیشہ مستقل رہتی ہے اور اس پر تپش کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سردیوں میں یہ منجمد نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی لزوجیت بڑھتی ہے (گاڑھے ہوتے ہیں)۔

استعمالات :

- 1- سلیکان کو کم تپش والے خلا کارپمپ میں بطور مدہن، اور اعلیٰ تپش والے oil bath میں استعمال ہوتا ہے۔
- 2- آب مزاحم کپڑوں (Water proofing clothes) کی تیاری میں یہ استعمال ہوتا ہے۔
- 3- برقی موٹر اور دیگر آلوں میں بطور مجوزی شے (Insulating material) (غیر موصل) کے طور پر انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 4- دھوپ، نمی اور کیمیائی اشیاء میں اعلیٰ تپش کی مزاحمت کے لئے انہیں پینٹ کے ساتھ ملا یا جاتا ہے۔

2.3.9 سلیکیٹ (Silicates)


وہ معدنیات جس میں Silicon اور Oxygen، چار سطحی شکل (Tetrahedral) $[SiO_4]^{4-}$ کی اکائیاں آڑے ترچھے طور پر مختلف نمونوں میں جڑے ہوئے ہیں، سلیکیٹ کہلاتے ہیں۔ زمینی قشر تقریباً 95%، silicate معدنیات اور Silica پر مشتمل ہے۔ Glass اور ceramics کی صنعتیں، سلیکیٹس کی کیمیاء پر مبنی ہیں۔

سلیکیٹس کی قسمیں Types of Silicates


چار سطحی شکل (Tetrahedral) $[SiO_4]^{4-}$ کی اکائیاں مختلف نمونوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر سلیکیٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

آرتھو سلیکیٹ (Ortho silicate (Neso silicates)

سادہ ترین silicate وہ ہیں جو $[SiO_4]^{4-}$ کے چار سطحی شکل کے الگ الگ اکائیوں پر مبنی ہیں۔ ortho- سلیکیٹ یا neso سلیکیٹ کہلاتے ہیں۔



مثالیس : Olivine Be_2SiO_4 - Phenacite $(\text{Fe}/\text{Mg})_2\text{SiO}_4$ اور Mg^{2+} کے مشرواں کے اطراف آٹھ سطحی طور پر O^{2-} گھرے ہوئے ہیں۔
 Be^{2+} کے رواں O^{2-} کے اطراف چار سطحی طور پر گھرے ہوئے ہیں، Olivine




: Soro silicates (یا) Pyro silicate

سیلیکٹ جس میں $[\text{Si}_2\text{O}_7]^{6-}$ کے رواں پائے جاتے ہیں، پیرو سیلیکٹ کہلاتے ہیں۔ دو $[\text{SiO}_4]^{4-}$ کی چار سطحی اکائیاں ایک آکسیجن کے جوہر کے ایک کونے میں جڑا ہوا ہے۔ (جوڑتے وقت آکسیجن کا ایک جوہر خارج کر دیا جاتا ہے)۔

مثال : Thortveitite - $\text{Sc}_2\text{Si}_2\text{O}_7$


دائری سیلیکٹس (یا حلقوی سیلیکٹس) (Cyclic or ring silicates)



سیلیکٹ جس میں $(\text{SiO}_3)_n^{6-}$ کے رواں پائے جاتے ہیں، جو تین یا اس سے زیادہ $[\text{SiO}_4]^{4-}$ کی چار سطحی اکائیاں حلقوی یا دائری طور پر جڑے ہوئے ہیں، دائری یا حلقوی سیلیکٹ کہلاتے ہیں۔ ہر سیلیکٹ کی اکائی اپنے دو آکسیجن کے جوہروں کو دوسری اکائیوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔

مثال : Beryl $[\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6]$ ایک الومینو سیلیکٹ ہے، جو آٹھ سطحی طور پر آکسیجن کے 6 جوہروں کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔

اینو سیلیکٹس (Inosilicates)




سیلیکٹ جن میں n تعداد کے سیلیکٹ کی اکائیاں دو یا دو سے زیادہ آکسیجن کے جوہر کو جوڑتے ہیں، تو انہیں اینو سیلیکٹس کہا جاتا ہے۔ انہیں مزید زنجیری سیلیکٹ (Chain silicate) اور دوہری زنجیر سیلیکٹ (Double chain silicates) میں درجہ بندی کی گئی ہے۔


زنجیری سیلیکٹ (Chain silicates) : سیلیکٹ جس میں $(\text{SiO}_3)_n^{2n-}$ کے رواں پائے جاتے ہیں، اور جس میں n تعداد کے $[\text{SiO}_4]^{4-}$ کی چار سطحی اکائیاں خطی طور پر جڑے ہوئے ہیں، زنجیری سیلیکٹ کہلاتے ہیں۔ ہر سیلیکٹ کی اکائی اپنے دو آکسیجن کے جوہروں کو دوسری

اکائیوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ مثال : spodumene $\text{LiAl}(\text{SiO}_3)_2$

دوہری زنجیر والی سیلیکٹ (یا) (Amphiboles) : اس سیلیکٹ میں $[\text{Si}_4\text{O}_{11}]_n^{6n-}$ کے رواں پائے جاتے ہیں۔ ان سیلیکٹ میں دو مختلف قسم کے چار سطحی پائی جاتی ہیں۔ (i) تین رسوں کو چھونے والے (ii) دو رسوں کو چھونے والے۔



مثالیں : اسبستوس (Asbestos) - اس میں ریشوی اور غیر احتراقی سلیکیٹ پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسے حرارتی مجوز (thermal insulation)، بریک کی لائننگ، تعمیراتی اشیاء اور فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسبستوس، چونکہ کینسرزا (Carcinogen) ہیں، اس لئے ان کے استعمال میں احتیاط برتا جاتا ہے۔



تختی دار یا Phyllo silicates

سلیکیٹ جن میں $(Si_2O_5)_{n^{2n-}}$ پائے جاتے ہیں، وہ phyllo silicates کہلاتے ہیں۔ ان میں ہر $[SiO_4]^{4-}$ کی چار سطحی اپنے تین آکسیجن کے جوہروں کو دوسری اکائیوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جس سے دو ابعادی تختی (Sheet) بن جاتی ہے۔ ان silicates کی ساخت ایک کے اوپر ایک

سطح میں ترتیب پاتی ہیں۔ ان سطحوں کے درمیان قوش کشش بہت ہی کم ہوتی ہے، لہذا ان کو گرافائٹ کی طرح آسانی سے دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ مثال : Talc, mica

سہ ابعادی سلیکیٹ (یا) Tecto silicates

سلیکیٹ جن میں $[SiO_4]^{4-}$ کی اکائیاں چار سطحی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور ان کے تمام آکسیجن جوہر جڑ کر ایک سہ ابعادی جال بناتے ہیں، وہ tecto silicates کہلاتے ہیں۔ ان کا عام ضابطہ $(SiO_2)_n$ ہے۔ مثال : کواٹز

Tecto silicates کو سہ ابعادی Aluminosilicates میں تبدیل کرنے کے لئے $[SiO_4]^{4-}$ اکائی کی جگہ $[AlO_4]^{5-}$ اکائی

تبدیل کی جاتی ہے۔ مثال : فلسپار (Felspar)، Zeolite.

2.3.10 زیولائٹ (Zeolites)

زیولٹ سہ ابعادی قلم نما ٹھوس اشیاء ہیں، جس میں المونیم، سیلیکان اور آکسیجن ان کے سہ ابعادی جال میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آئیدہ سوڈیم الومینو سلیکیٹ ہیں، جن کا عام ضابطہ $Na_2O(Al_2O_3).x(SiO_2).yH_2O$ ہے (جس میں x کی قیمت 2 سے 10 تک اور y کی قیمت 2 سے 6 تک ہے)

زیولائٹ کی ساخت مسام دار ہے جس میں اکہری گرفت والے سوڈیم کے رواں اور پانی کے سالمے ڈھیلے ڈھالے (loosely) طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ Si اور Al کے جوہر چار سطحی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اور آکسیجن کے ساتھ ہم ربط ہیں۔ زیولائٹ، چکنی مٹی کے معدن کی مشابہت رکھتے ہیں، مگر ان کی قلمی ساخت مختلف ہے۔

زیولائٹ کی سہ ابعادی ساخت، شہد کی مکھی کے چھتہ کی طرح ہوتی ہے، جس میں غار اور پنجرہ نما ساختوں کے جال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پانی کے سالمے اس کے مساموں سے اندر باہر آزادی کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود، اس کا جال سخت رہتا ہے۔ اس ساخت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مساموں کی جسامت یکساں ہوتی ہے، جس سے یہ سالمی چھلنی کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے متعلق گیارہویں جماعت میں پڑھا ہے۔ پانی کی سختی کو دور کرنے کے لئے زیولائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔



بوران نیوٹران کھینچنے کا معالجہ (Boron Neutron Capture Therapy)

بوران-10 کی نیوٹران اُلف (neutron affinity) تکنیک، ہی BNCT کی بنیاد ہے۔

اس سے ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جن کے دماغ میں رسولیاں ہوتی ہیں۔

جب بوران-10 کو کم توانائی والے حرارتی نیوٹرانوں کے ساتھ اشعاعیت (Irradiated) کی جاتی ہے تو زیادہ خطی توانائی والے α ذرات اور Li کا ایک ذرہ حاصل ہوتا ہے۔

دماغ میں رسولی والے مریض کو بوران کے مرکبات داخل کئے جاتے ہیں اور ان مرکبات کو رسولی حاصل کرتی ہے۔ اس کے بعد اس حصہ کو حرارتی نیوٹرانوں (Thermal neutrons) سے اشعاعیت کی جاتی ہے۔ اس سے خارج ہونے والے آلفا شعاعیں رسولی میں موجود خلیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہر وقت بوران-10 کا ایک جوہر ایک نیوٹران جذب کرتا ہے۔ اس سے دماغ کی بافتوں کو کم نقصان پہنچتا ہے۔ BNCT کو سرگردن، پستان، پروٹھیٹ، مثانہ اور جگر کی رسولیوں کے علاج میں بھی استعمال کرنے کی کوشش جاری ہے۔

خلاصہ

- ❖ وہ عناصر جن کا آخری الیکٹران p مدار میں داخل ہوتا ہے، p-بلاک عناصر کہلاتے ہیں۔
- ❖ p-بلاک عناصر کی عام الیکٹرانی تشکیل ns^2, np^{1-6} ہے۔ اس گروپ کے ہر عنصر کی بیرونی خول کی الیکٹرانی تشکیل میں مشابہت پائی جاتی ہے اور صرف n پرنسپل قدریہ عدد (Principal quantum number) کی قیمت میں فرق پایا جاتا ہے۔
- ❖ عام طور پر گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے وقت روانی توانائی گھٹتی ہے اور دھاتی خاصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ❖ ان گروپوں میں جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں تو روانی انتھالپی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کے گروپوں میں عناصر کی روانی توانائی پہلے کے گروپوں سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔
- ❖ جب ہم 13 ویں گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے ہیں تو بوران سے الوئیم تک برق منفیت کم ہوتی ہے، اس کے بعد گلیئم میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔

- ❖ p- بلاک عناصر میں ہر گروپ کا پہلا عنصر اس کے بعد کے گروپ کے پہلے عنصر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔
- ❖ بعد کے اعلیٰ (وزنی) مروی عناصر میں، بیرونی s الیکٹرانوں میں (ns) میں جامد (inert) رہنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جو اسے بندش بننے سے روک رکھتا ہے۔ اس کو جامد جوڑی کا اثر (inert pair effect) کہتے ہیں۔
- ❖ چند ایسے عناصر ہیں، جو اپنی طبعی حالت میں ایک سے زیادہ قلمی یا سالمی شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن، ہیرا (ڈائی منڈ) اور گرافائٹ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس اثر کو بہروپیت (Allotropism) کہتے ہیں۔
- ❖ کاربن قدرتی طور پر گرافائٹ کی شکل میں پایا جاتا ہے۔
- ❖ بوریکس، سوڈیم نمک کا ٹرا بورک ترشہ Sodium salt of Tetraboric acid ہے۔ جب سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ کولمانائٹ کے محلول کو جوش دیا جاتا ہے تو یہ حاصل ہوتا ہے۔
- ❖ بورک ایسڈ کو اس کی کچھ دھات بوراکس اور colemanite سے حاصل کرتے ہیں۔
- ❖ بورک ترشہ دو ابعادی سطحی ساخت رکھتا ہے۔
- ❖ ایک عنصر کا جوہروں کے ساتھ مل کر طویل زنجیر یا حلقے بنانے کی قابلیت Catenation کہلاتی ہے۔
- ❖ کاربن کا ایک اور نیا تیار کردہ بہروپ کاربن نینو ٹیوب ہے، جس میں گرافائٹ جیسا ٹیوب، مگر فلرین جیسے کنارے ہیں۔
- ❖ محور پر یہ نینو ٹیوب فولاد سے مضبوط ہیں اور برقی رو کو ایصال کرتے ہیں۔
- ❖ Potassium aluminium sulphate [K₂SO₄. Al₂(SO₄)₃. 24H₂O] کے دوہرے نمک کو پھٹکری (Alum) نام دیا گیا ہے۔
- ❖ سیلیکان قدرت میں سیلیکا (ریت اور کوائر کے قلم) کی طرح پایا جاتا ہے۔ سیلیکیٹ کے معدن اور چکنی مٹی بھی سیلیکان کے دیگر اہم ذرائع ہیں۔
- ❖ Silicone یا poly siloxanes، یہ Organo silicon کثیر ترکیبے ہیں۔ ان کا عام ضابطہ (R₂SiO) ہے۔
- ❖ چونکہ ان کا عام ضابطہ Ketone (R₂CO) ہی کی طرح ہے، انہیں سیلیکون نام دیا گیا ہے۔
- ❖ وہ معدنیات جس میں Silicon اور Oxygen، چار سطحی شکل (Tetrahedral) [SiO₄]⁴⁻ کی اکائیاں آڑے تریجھے طور پر مختلف نمونوں میں جڑے ہوئے ہیں، سیلیکیٹ کہلاتے ہیں۔
- ❖ سیلیکیٹس کی قسمیں :
 - آرٹھو سیلیکیٹس (Neso silicates)، Pyro silicate یا solo silicate، دائری سیلیکیٹ یا حلقوی سیلیکیٹ
 - اینوسیلیکیٹ : زنجیری سیلیکیٹ یا Pyroxenes، دوہری زنجیر والے سیلیکیٹ یا amphiboles
 - پٹرے نما سیلیکیٹ یا phyllo silicates
 - سہ ابعادی سیلیکیٹس (یا) ٹکٹو سیلیکیٹس
- ❖ زیولاٹ سہ ابعادی قلم نما ٹھوس اشیاء ہیں، جس میں المونیم، سیلیکان اور آکسیجن ان کے سہ ابعادی جال میں پائے جاتے ہیں۔
- ❖ پانی کی تختی کو دور کرنے کے لئے زیولاٹس، سالماتی چھلنی کی طرح کام کرتے ہیں۔



1- صحیح جواب منتخب کیجئے۔

1- بوراکس کا آبیدہ محلول اس نوعیت کا ہے۔

- (a) تعدیلی (b) ترشوی (c) اساسی (d) دونوں خواص رکھنے والے
- 2- بورک ترشہ ایک ترشہ ہے، کیونکہ اس کے سالمے میں (a) قابل بدل H^+ رواں پائے جاتے ہیں۔

- (b) پروٹان خارج کرتے ہیں۔
(c) پروٹان کے ساتھ مل کر پانی کے سالمے بناتے ہیں۔
(d) پانی سے OH^- اپنا کر پروٹان خارج کرتے ہیں۔

3- ذیل میں سے کونسا بورین نہیں ہے۔

- (a) B_2H_6 (b) B_2H_5 (c) B_4H_{10} (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں

4- زمین کے قشر میں سے سب سے زیادہ حاصل ہونے والی دھات کونسی ہے؟

- (a) الومینیم (b) کیلشیم (c) میگنیشیم (d) سوڈیم

5- diborane میں الیکٹرانوں کی تعداد جو کیلا نما بندش (banana bond) کے ذمہ دار ہیں۔

- (a) چھ (b) دو (c) چار (d) تین

6- P بلاک عناصروں کا وہ عنصر جو زنجیری سلسلہ (Catenation) نہیں بناتا، وہ یہ ہے۔

- (a) کاربن (b) سیلیکان (c) سیسہ (Lead) (d) جرمینیم

7- C_{60} ضابطہ والے فلٹرین fullerene میں کاربن کے جوہر اس طرح مخلوط ہیں۔

- (a) sp^3 (b) sp (c) sp^2 (d) sp^3 اور sp^2 جزوی




8- کاربن کے ہائڈرائڈس میں کاربن کی تکسیدی حالت

- (a) +4 (b) -4 (c) +3 (d) -3

9- Silicate کے بنیادی ساخت کی اکائی ہے۔ (NEET)

- (a) $(SiO_3)^{2-}$ (b) $(SiO_4)^{2-}$ (c) $(SiO)^-$ (d) $(SiO_4)^{4-}$

10- سلیکیٹ میں دہرانے والی اکائی یہ ہے۔

 SiO_2 (a)

- 11- ان یک ترکیبہ (monomer) میں سے کونسا اعلیٰ سالماتی کمیت والا سلیکون کثیر ترکیبہ (polymer) نہیں ہے؟
 Me₂SiCl₂ (d) MeSiCl₃ (c) PhSiCl₃ (b) Me₃SiCl (a)
- 12- ان میں سے کون سا sp² مخلوط نہیں ہے؟
 (a) گرافائٹ (b) گرافین (c) فلرین (d) خشک برف
- 13- ہیرے میں ہر ایک کاربن کے جوہروں کی بندشوں سے بننے والی شکل
 (a) چار سطحی (Tetrahedral) (b) مسدسی (Hexagonal)
 (c) آٹھ سطحی (Octahedral) (d) ان میں سے کوئی بھی نہیں
- 14- ان میں سے کونسا بیان درست نہیں ہے؟
 (a) Beryl ایک دائری سلیکیٹ ہے۔ (b) Mg₂SiO₃ ایک آرتھو سلیکیٹ ہے۔
 (c) سلیکیٹ کی بنیادی ساختی اکائی SiO₄⁴⁻ ہے۔ (d) Feldspar، الومینو سلیکیٹ نہیں ہے۔
- 15- کالم I- کے ساتھ کالم II- کو جوڑے اور صحیح کوڈ تفویض کیجئے۔
 (a) ایک دائری سلیکیٹ ہے۔ (b) Mg₂SiO₃ ایک آرتھو سلیکیٹ ہے۔
 (c) سلیکیٹ کی بنیادی ساختی اکائی SiO₄⁴⁻ ہے۔ (d) Feldspar، الومینو سلیکیٹ نہیں ہے۔

Column-I		Column-II	
A	Borazole	1	B(OH) ₃
B	Boric acid	2	B ₃ N ₃ H ₆
C	Quartz	3	Na ₂ [B ₄ O ₅ (OH) ₄] 8H ₂ O
D	Borax	4	SiO ₂

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	1	2	4	3
(c)	1	2	4	3
(d)	ان میں سے کوئی بھی نہیں			

- 16- Duralumin اس کی بھرت ہے۔
 Al, Cu, Mn, Mg (d) Al, Mn (c) Cu, Al, Mg (b) Cu, Mn (a)
- 17- جوہری تعامل گر میں حفاظتی ڈھال اور قابو کرنے والی سلاخوں کے طور پر استعمال ہونے والا مرکب یہ ہے۔
 (a) دھاتی بورائیڈ (b) دھاتی آکسائیڈ (c) دھاتی کاربونیٹ (d) دھاتی کاربائیڈ
- 18- +1 تکسیدی حالت کا استحکام (قیام پذیری) اس سلسلہ میں بڑھتی ہے۔
 Tl < In < Ga < Al (b) Al < Ga < In < Tl (a)
 Ga < In < Al < Tl (d) In < Tl < Ga < Al (c)

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

- 1- p- بلاک عناصر کے پہلے عنصر کے غیر مربوط خواص (anomalous properties) پر مختصر نوٹس لکھئے۔
- 2- کاربن کو مد نظر رکھتے ہوئے p- بلاک عناصر میں بہر و پیت کی مختصر وضاحت کیجئے۔
- 3- بوراکس کے استعمالات بتائیے۔
- 4- زنجیری یا حلقوی مرکبات بنا (Catenation) کیا ہے؟ کاربن کا زنجیری یا حلقوی مرکبات بننے کے خصوصیات کی وضاحت کیجئے۔
- 5- فشر ٹروپش ترکیب (Fisher tropesch synthesis) پر مختصر نوٹ لکھئے۔

6- CO اور CO₂ کی ساخت بتائیے۔

7- سیلیکون کے استعمالات بیان کریں۔

8- Diborane کے ساخت کی وضاحت کریں۔

9- hydroboration پر ایک مختصر نوٹ لکھئے۔

10- مندرجہ ذیل کی ایک ایک مثالیں لکھیں۔

Chalcogen (iv) چالکوجن










prictogen (iii)

tetragen (ii)

icosogen (i)

11-P- بلاک عناصر کی دھاتی خصوصیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔

12- درج ذیل کے تعاملات کو مکمل کریں۔



13- آپ بوریٹ radical کی شناخت کس طرح سے کریں گے ؟

14- Zeolites پر مختصر نوٹس لکھئے۔

15- بورک ترشہ کو boron trinitride میں آپ کس طرح تبدیل کریں گے؟

16- 2nd گروپ کی ایک قلعوی دھات (A) کا بوران کے ایک مرکب (B) کے ساتھ تعامل کرنے پر ایک تحویلی عامل

(C) حاصل ہوتا ہے۔ A, B, اور C کی شناخت کیجئے۔

17- ایک دوہرا نمک جس میں چوتھے دور (period) کی قلعوی دھات (A) شامل ہے، اس کو 500 K تپش پر گرم کرنے پر

(B) دیتا ہے۔ B کا آبی محلول BaCl₂ کے ساتھ ایک سفید رسوب دیتا ہے اور Alizarin کے ساتھ سرخ رنگ دیتا ہے۔

A اور B کی شناخت کیجئے۔

18- CO ایک تحویلی عامل ہے۔ مثالوں کے ساتھ ثابت کریں۔

اکائی 3

p - بلاک عناصر - II (p-BLOCK ELEMENTS - II)



سرولیم رامسے (Sir William Ramsay)
(1852 - 1916)

سرولیم رامسے، سکاٹش (Scottish) کے کیمیاء دان تھے، جنہوں نے 1885-1890 کے دوران نائٹروجن کے آکسائیڈس پر اہم مقالات شائع کئے۔ اگست 1894 میں رامسے نے ہوا کا ایک نیا بھاری عنصر الگ کیا اور انہوں نے اس کا نام، ارگان (Argon) رکھا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب 'مست' (Lazy) ہے۔ اس کے بعد کے سالوں میں انہوں نے مورس ٹریورس کے (Morris Travers) کے ساتھ تحقیقی کام کیا اور نیا، کرپٹان اور زینان جیسی جامد گیسوں کو دریافت کیا۔ 1910ء میں انہوں نے ریڈان (Radon) کا انکشاف کیا۔ اسی طرح انہوں نے ریڈان (Radon) کی کھوج کی۔ ان کی اس خدمات کے اعتراف میں 1904ء میں ان کو کیمسٹری کے نوبل خطاب سے نوازا گیا۔ غیر فعال گیس یعنی نوبل گیس کی دریافت کے بعد جدید دوری جدول میں ایک نئے گروپ کی ترقی ہوئی۔



سیکھنے کے مقاصد:



- اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے
- ◆ نائٹروجن اور فاسفورس کی تیاری، خصوصیات اور استعمالات کے ساتھ ان کے اہم مرکبات کے بارے میں جان سکیں گے۔
- ◆ آکسیجن اور سلفر کی تیاری خصوصیت اور اس کے اہم مرکبات کو بیان کر سکیں گے۔
- ◆ ہیلوجن اور ہائیڈروجن ہیلائیڈ کی تیاری اور خصوصیات کو بیان کر سکیں گے۔
- ◆ انٹرہیلوجن کے مرکبات کے کیمیاء کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ◆ نوبل گیس (Noble gases) یعنی جامد گیس کی موجودگی، ان کی خصوصیات اور استعمالات کو بیان کر سکیں گے۔
- ◆ ہماری روزمرہ زندگی میں p-بلاک عناصر اور ان کے مرکبات کی اہمیت کو بیان کر سکیں گے۔

تعارف

پچھلی اکائی میں ہم نے p-بلاک عناصر کے پہلے دو گروپ کے عام خصوصیات، یعنی 13 گروپ یعنی بوران گروپ (Icosagens) اور کاربن گروپ (Tetragens) کا مطالعہ کیا تھا۔ اس حصے میں بقیہ p-بلاک عناصر، چالکوجن، ہیلوجن اور جامدگیسوں (Noble gas) کے بارے میں پڑھیں گے۔

3.1 گروپ-15 (نائٹروجن گروپ) کے عناصر

3.1.1 پایاجانا (Occurrence)

کرہ ارض کا 78% حصہ ڈی نائٹروجن (Dinitrogen) (N_2) پر مشتمل ہے۔ قشراض میں یہ سوڈیم نائٹریٹ $NaNO_3$ (Chile saltpetre) اور پوٹاشیم نائٹریٹ (Indian saltpetre) کی شکل میں بھی پایا جاتا ہے۔ زمین میں 11 واں سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر فاسفورس ہے، جو فاسفورس یا فاسفیٹ (فلوراپٹائیٹ، کلوراپٹائیٹ اور ہائیڈراکسی پیٹائیٹ) کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آرسنک، اینٹی مونی اور ہستہ وغیرہ خاص طور پر سلفائیڈ کے معدنیات کی شکل میں کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

3.1.2 طبیعی خواص (Physical properties)

گروپ 15 کے عناصر کی بعض طبیعی خواص جدول میں دی گئی ہیں۔

جدول 3.1 گروپ 15 عناصر کے طبیعی خواص:

خواص	Nitrogen	Phosphorus	Arsenic	Antimony	Bismuth
طبیعی حالت 293K پر	Gas	Solid	Solid	Solid	Solid
جوہری عدد	7	15	33	51	83
ہم جا	$^{14}N, ^{15}N$	^{31}P	^{75}As	^{121}Sb	^{209}Bi
جوہری کمیت (g.mol ⁻¹ at 293 K)	14	30.97	74.92	121.76	209.98
الکٹرنی تشکیل	$[He]2s^2 2p^3$	$[Ne]3s^2 3p^3$	$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^3$	$[Kr]4d^{10} 5s^2 5p^3$	$[Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$
جوہری نصف قطر (Å)	1.55	1.80	1.85	2.06	2.07
کثافت (g.cm ⁻³ at 293 K)	1.14×10^{-3}	1.82 (white phosphorus)	5.75	6.68	9.79
نقطہ پگھلاؤ (K)	63	317	Sublimes at	904	544
نقطہ جوش (K)	77	554	889	1860	1837

3.1.3 نائٹروجن (Nitrogen)

تیاری (Preparation)

نائٹروجن کرہ فضا کی ایک اہم گیس ہے جو (78% حجم) صنعتی طور پر مائع ہوا کی کسری کشید سے تیاری جاتی ہے۔ Sodium Azide پر 575 K کی حرارتی تحلیل سے خالص نائٹروجن حاصل کیا جاتا ہے۔






برومین پانی سے امونیا کی تکسید سے بھی نائٹروجن کو تیار کیا جاسکتا ہے۔




خواص (Properties)

نائٹروجن ایک غیر فعال گیس ہے۔ زمین میں (مٹی) نائٹروجن میں 14% اور 15-N کا 0.4% پایا جاتا ہے۔ 15-N ہم جا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نائٹروجن کی غیر فعالیت کی وجہ اس کی اعلیٰ بندشی توانائی ہے، یعنی 225 cal mol^{-1} (946 kJ mol^{-1}) ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں موجود سہ رخ بندش (Triple bond) اس کی غیر فعالی کردار کا اہم سبب ہے، جب کہ دوسرے یکساں برقیاتی سہ رخ بندشی عناصر میں دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ $-\text{C}\equiv\text{C}-$ ، $\text{C}\equiv\text{O}$ ، $\text{X}-\text{C}\equiv\text{N}$ ، $\text{X}-\text{N}\equiv\text{C}$ ، اور $-\text{C}\equiv\text{N}$ ۔ یہ تمام گروپ عطیہ کر سکتے ہیں، جب کہ ڈائی نائٹروجن عطیہ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ دھاتوں کے ساتھ مل کر کثیر سالمے بناتے ہیں ($\text{M} \leftarrow \text{N}\equiv\text{N}$) کس حد تک CO کی طرح کم تعامل پذیر ہیں۔


کمرے کی تپش پر، نائٹروجن کا واحد رد عمل لیتھیم کے ساتھ Li_3N بنتا ہے، جب کہ دوسرے عناصر نائٹروجن کے ساتھ صرف اعلیٰ درجہ حرارت پر تعامل کر سکتے ہیں۔ گروپ 2 کی دھاتیں روانی نائٹرائڈس بناتے ہیں۔



نائٹروجن کا براہ راست، ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل پانے سے امونیا بناتا ہے۔ اس تعامل کو اعلیٰ تپش کے ساتھ لوہے کے تماسی عامل کی موجودگی میں فوری تعامل پاتے ہیں۔ اسی کیمیائی تعامل کی بنیاد پر ہمیر کے طریقے (Haber's Process) سے امونیا تیار کیا جاتا ہے۔



اعلیٰ تپش پر نائٹروجن، آکسیجن کے ساتھ تعامل پا کر نائٹرس آکسائیڈ بناتا ہے۔ یہاں تک کہ 3473 K پر نائٹروجن صرف 4.4% حاصل ہوتا ہے۔




نائٹروجن کے استعمالات (Uses of Nitrogen)

- 1۔ امونیا، نائٹرک ترشہ اور کیشیم سیانائیڈ وغیرہ کی تیاری میں نائٹروجن استعمال ہوتا ہے۔
- 2۔ مائع نائٹروجن کم درجہ حرارت پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کربو سرجری کے لئے ضروری ہے، اور یہ حیاتیاتی محافظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔



3.1.4 امونیا (NH_3)

تیاری


امونیا کو یوریا کی آبی پاشیدگی (Hydrolysis) سے تیار کیا جاتا ہے۔



تجربہ گاہ میں امونیم نمک کو اساس کے ساتھ گرم کر کے امونیا کو تیار کیا جاتا ہے۔



امونیا کو مگنیشیم نائٹرائڈ جیسے دھاتی نائٹرائڈس کو پانی سے گرم کرنے کے بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔




موزوں حالت میں نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے تعامل سے امونیا گیس کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ تعامل بروں حراری اور رجعی ہے۔

یہ تعامل 750K اور 200 فضائی دباؤ پر عمل کرایا جاتا ہے۔ تعامل کی رفتار کو بڑھانے کے لئے لوہا بطور تھامی عامل (Catalyst) استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی کم مقدار میں K_2O اور Al_2O_3 استعمال کر کے کیمیائی تعامل کی شرح کو توازن میں لایا جاتا ہے۔ اس عمل میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو مانع ہوا کے جزوی کشیدگی سے حاصل کیا جاتا ہے۔

خواص (Properties)

امونیا ایک بے رنگ گیس ہے جس میں ایک خاص چبھتی تیز بو ہوتی ہے اور یہ ہوا سے ہلکی گیس ہے۔ امونیا کو 9 فضائی دباؤ پر مائع حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مائع امونیا کا نقطہ جوش 38.4°C (198.4 K) اور نقطہ انجماد -77°C ہے۔ طبعی طور پر یہ پانی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ٹھوس حالت میں یہ ہائیڈروجن بندش سے منسلک ہو تو یہ پانی سے مشابہت رکھتا ہے۔ 20°C تپش اور 760mm دباؤ پر (ایک حجم پانی میں 702 حجم امونیا) امونیا گیس پانی میں بہت ہی اچھی طرح حل پذیر ہے۔


کم درجہ حرارت پر دو حل پذیر ہائیڈریٹ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ اور $2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ کو الگ کیا جاتا ہے۔ ان سالموں میں امونیا اور پانی کے سالمے ہائیڈروجن کے بندش سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آبی محلول میں امونیا $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ کی طرح آب پاشیدہ ہوتا ہے۔



امونیا کا دوہری برقیاتی مستقلہ (Dielectric constant) کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی کی طرح ایک اچھا روانی محلول بناتا ہے۔




$$K_{-50^\circ\text{C}} = [\text{NH}_4^+][\text{NH}_2^-] = 10^{-30}$$




$$K_{25^\circ\text{C}} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

کیمیائی خواص (Chemical properties)


حرارت کا اثر : 500°C سے اوپر گرم کرنے پر امونیا اس کے اجزاء میں تحلیل پاتا ہے۔ تحلیل میں نکل اور لوہا بطور تھامی عامل استعمال ہوتے ہیں۔ مسلسل چنگاریوں (continuous sparking) سے یہ مکمل طور پر تحلیل پاتا ہے۔



ہوا / آکسیجن کے ساتھ رد عمل : امونیا ہوا میں نہیں جلتا ہے لیکن آکسیجن کے ساتھ آزادانہ طور پر جلتا ہے اور زرد شعلہ کے ساتھ نائٹروجن اور بھاپ خارج کرتا ہے۔




پلاٹینم جسے تھامی عامل کی موجودگی میں یہ جل کر نائٹرک آکسائیڈ دیتا ہے۔ اس عمل کو نائٹرک ترشے کی صنعتی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو



Ostwald's process کہا جاتا ہے۔

تحویلی عامل : (Reducing Property)



امونیا ایک اچھا تحویلی عامل ہے۔ جب اس کو گرم دھاتی آکسائیڈ پر گزارا جاتا ہے تو یہ دھاتی آکسائیڈ کو دھات میں تحویل کرتا ہے۔





ترشوں کے ساتھ تعامل (Reaction with acids) : ترشوں کے ساتھ تعامل پا کر امونیا سے امونیم کے نمک بنتے ہیں۔ اس کیمیائی تعامل میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کم پروٹان کے لئے امونیا کی affinity (پسند) پانی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔

کلورین اور کلورائیڈ کے ساتھ رد عمل : کلورین اور کلورائیڈس کے ساتھ تعامل پا کر امونیا، امونیم کلورائیڈ دیتا ہے۔ اس تعامل میں حاصلات کا حصول امونیا کی مقدار پر منحصر ہے۔


زیادہ (excess) امونیا کے ساتھ :





زیادہ (excess) مقدار میں کلورین کے ساتھ امونیا تعامل پا کر ایک دھماکہ خیز مادہ نائٹروجن ٹری کلورائیڈ بناتا ہے۔



امینڈس اور نائٹرائڈس کی تشکیل : سوڈیم جیسے برق مثبت دھاتوں کے ساتھ امونیا تعامل کر کے امینڈس (amides) بناتا ہے۔ جب کہ دھاتیں جیسے میگنیشیم کے ساتھ نائٹرائڈ بناتا ہے۔



دھاتی نمکوں کے ساتھ رد عمل : امونیا دھاتی نمک کے ساتھ تعامل کر کے (Fe کے ساتھ) دھاتی ہائیڈرآکسائیڈس بناتا ہے، یا



Tetraamminecopper(II)ion
(a coordination complex)


امینوں (Amines) کی تشکیل : امونیا دو قطبی روانی کشش (ion dipole attraction) کے ذریعے امونیائی مرکبات بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر $[\text{CaCl}_2 \cdot 8\text{NH}_3]$ ۔ اس میں امونیا دو قطبی کے منفی سرے Ca^{2+} رواں کی طرف کشش پاتے ہیں۔

یہ ایک لگینڈ (ligand) کی طرح عمل کر کے کوآرڈینیٹن مرکبات بناتے ہیں جیسے $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ، $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ۔ مثال کے طور پر جب کا پرسلفیٹ کے آبی محلول میں امونیا کو ملا یا جاتا ہے تو گہرا نیلے رنگ کا


ایک مرکب $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ بنتا ہے۔

امونیا کی ساخت (Structure of Ammonia)

امونیا کا سالمہ ایک اہرامی (pyramidal) ساخت رکھتا ہے، جس میں N-H بند کا فاصلہ $1.016\text{\AA}$ اور H-H بند کا فاصلہ $1.645\text{\AA}$ اور بندش کا زاویہ 107° ہے۔ امونیا کے سالمے کی ساخت ایک سہ پہلوی اہرامی شکل



امونیا کے ساتھ HCl کا تعامل




(Tetrahedral) جیسی ہے، جس میں الیکٹرانوں کی تنہا جوڑی (lone pair) سہ پہلوی اہرامی شکل کے ایک کنارے پر موجود ہے، جیسا کہ شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور یہ اہرامی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔

3.1.5 نائٹرک ترشہ (Nitric acid)

تیاری :

تجربہ گاہ میں نائٹرک ترشہ کو مساوی مقدار میں پوٹاشیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو سلفیورک ترشے کے ساتھ گرم کر کے بنایا جاتا ہے۔




نائٹرک ترشہ کی تحلیل کو روکنے کے لئے پیش کو جتنا ہو سکے اتنا کم رکھا جاتا ہے۔ ترشہ تکثیف پا کر بخاراتی مائع کی طرح حاصل ہوتا ہے، تھوڑی مقدار کی نائٹروجن کی موجودگی کی وجہ سے اس کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ نائٹرک ترشہ کے تحلیل کی وجہ سے یہ نائٹروجن گیس بنتی ہے۔




تجارتی (صنعتی) طریقے سے نائٹرک ترشہ کی تیاری: (Commercial method of preparation)

بڑے پیمانے پر نائٹرک ترشہ کو اسٹوئلڈ کے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں امونیا کو دس گنا ہوا کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اس آمیزے کو گرم کر کے تماشی خانے میں داخل کیا جاتا ہے۔ جہاں وہ پلاٹینم کی جالی (gauze) کے ساتھ تماس کرتا ہے۔ درجہ حرارت کو تقریباً 1275K تک بڑھایا جاتا ہے۔ دھاتی Gauze امونیا کے ساتھ تیزی سے تکسید پا کر NO بناتا ہے جو دوبارہ تکسید پا کر نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ بن جاتا ہے۔



نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے والے میناروں کے ایک سلسلہ سے گزارا جاتا ہے۔ یہ پانی کے ساتھ تعامل پا کر نائٹرک ترشہ HNO_3 بناتا ہے۔ اس نائٹرک آکسائیڈ میں ہوا پھونک کر اس کو رنگ کٹ Bleach کیا جاتا ہے۔



خواص (Properties)



خالص نائٹرک ترشہ ایک بے رنگ رقیق (مائع) ہے۔ اس کا نقطہ جوش 86°C ہے۔ یہ پانی میں مکمل طور پر حل ہو کر ایک مستقل جوش کھانے والا آمیزہ بناتا ہے ($\text{B.P. } 120.5^\circ \text{C}$, 98% HNO_3)۔ بخاراتی (fuming) نائٹرک ترشہ میں نائٹروجن کے آکسائیڈس ہوتے ہیں۔ جو سورج کی روشنی پڑنے پر یا گرم کرنے پر تحلیل پا کر نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ پانی اور آکسیجن بناتے ہیں۔









اس رد عمل کی وجہ سے خالص ترشہ یا اس کا مرکب محلول تھوڑی دیر رکھنے پر زرد مائل ہو جاتا ہے۔

زیادہ تر رد عمل میں نائٹرک ترشہ تکسیدی عامل کی طرح کام کرتا ہے۔ لہذا تکسیدی حالت +5 سے کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ دھاتوں کے ساتھ رد عمل کر کے ہائیڈروجن گیس خارج نہیں کرتے۔ نائٹرک ترشہ بطور ترشہ تکسیدی عامل اور نائٹریٹنگ عامل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔


بطور ترشہ : دوسرے ترشوں کی طرح اساس اور اساسی آکسائیڈ کے ساتھ رد عمل کر کے نمک اور پانی بناتا ہے۔




بطورِ تکسیدی عامل: کاربن، سلفر، فاسفورس اور ایوڈین جیسے ادھاتیں نائٹرک ترشہ سے تکسید پاتی ہیں۔



بطورِ نائٹریٹنگ عامل (As an nitrating agent): نامیاتی مرکبات میں $-NO_2$ سے $-H$ کے جوہر کے تبادلہ کا عمل نائٹریشن (Nitration) کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر




یہ تعامل نائٹرونیئم رواں (nitronium ion) کے بننے سے نائٹریشن کا عمل واقع ہوتا ہے۔



دھاتوں پر نائٹرک ترشے کا رد عمل (Action of nitric acid on metals)


تمام دھاتیں (سوائے سونا، پلاٹینم، سوڈیم، ریڈیم اور ٹینگم کے) نائٹرک ترشے کے ساتھ تعامل پاتے ہیں۔ دھاتوں کو نائٹرک ترشہ تکسید کر دیتا ہے۔ کچھ دھاتیں مثلاً آلومینیم، کرومیم، نکل، کوبالٹ، وغیرہ مرتکز نائٹرک ترشے کے ساتھ تعامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کی سطح پر آکسائیڈ کی ایک غیر فعال پرت بن جاتی ہے۔ جو نائٹرک ترشہ کو دھات کے ساتھ تعامل کرنے سے روکتی ہے۔

کمزور برق مثبت دھاتیں جیسے رُن، ارسنک، اینٹی منی، ٹنگسٹن اور مالبدینم کے ساتھ نائٹرک ترشہ تعامل پا کر دھاتی آکسائیڈ بناتے ہیں، ان میں دھات اعلیٰ تکسیدی حالت میں پائی جاتی ہے اور ترشہ ادنیٰ تکسیدی حالت میں پائی جاتی ہے۔ جب نائٹرک ترشہ، دھاتوں کے ساتھ تعامل پاتا ہے تو عام طور پر NO_2 ، NO اور H_2O جیسے حاصلات حاصل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار N_2 ، NH_2OH اور NH_3 بھی حاصل ہوتے ہیں۔







دھاتوں کے ساتھ نائٹرک ترشے کے رد عمل کو تین مرحلوں میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔



ابتدائی تعامل: نائٹرک ترشہ، دھات کے ساتھ تعامل پا کر دھاتی نائٹریٹ اور نوزائیدہ ہائیڈروجن خارج کرتا ہے۔






ثانوی تعامل: اس تعامل میں نوزائیدہ ہائیڈروجن نائٹرک ترشے کی تحویلی حاصلات یا مصنوعات تیار کرتا ہے۔





ثلاثی تعامل : ثانوی تعاملات کے حاصلات تحلیل پاکر اختتامی حاصلات دیتے ہیں۔
 ثانوی کی تحلیل پذیری :



ثانوی حاصلات کے کیمیائی تعاملات :



مثالیں : نائٹرک ترشے کے ساتھ تانبہ مندرجہ ذیل طریقے سے تعامل پاتا ہے۔






overall reaction




مرکز نائٹرک ترشہ کے ساتھ تانبہ، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔




نائٹرک ترشے کے ساتھ میگنیشیم اس طرح تعامل پاتا ہے۔



overall reaction



اگر ترشہ ہلکا یا ہوا ہو تو ہمیں N_2O حاصل ہوتا ہے۔



نائٹرک ترشے کے استعمالات: (Uses of Nitric acid)

1- ماء الملوک (aquaregia) کی تیاری میں نائٹرک ترشہ بطور تفسیدی عامل استعمال ہوتا ہے

2- نائٹرک ترشے کے نمکوں (AgNO_3) کو فوٹو گرافی، بارود اور آتش بازی والے ہتھیاروں (NaNO_3) میں استعمال ہوتا ہے۔

خود کی تشخیص :

جست کے ساتھ مرکز اور ہلکے ہوئے نائٹرک ترشہ کا کیمیائی تعامل اور اس سے حاصل ہونے والے حاصلات لکھئے۔

3.1.6 Oxides and oxoacids of nitrogen

نام	Formula	تھکیدی حالت	طبعی خواص	تیاری
Nitrous oxide	N_2O	+1	بے رنگ گیس اور تعدیلی	$NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$
Nitric oxide	NO	+2	بے رنگ گیس اور تعدیلی	$2NaNO_2 + 2FeSO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2NaHSO_4 + 2H_2O + 2NO$
Dinitrogen trioxide (or) Nitrogen sesquioxide	N_2O_3	+3	نیا ٹھوس اور ترشوی	$2NO + N_2O_4 \rightarrow 2N_2O_3$
Nitrogen dioxide	NO_2	+4	بھوری گیس اور ترشوی	$2Pb(NO_3)_2 \rightarrow 4NO_2 + 2PbO + O_2$
Nitrogen tetraoxide	N_2O_4	+4	بے رنگ ٹھوس اور ترشوی	$2NO_2 \rightarrow N_2O_4$
Nitrogen pentoxide	N_2O_5	+5	بے رنگ ٹھوس اور ترشوی	$2HNO_3 + P_2O_5 \rightarrow N_2O_5 + 2HPO_3$

نائٹروجن کے آکسائیڈوں کی تیاری

Preparation of nitrogen oxides

نام	ضابطہ	ساخت
Nitrous oxide	N_2O	$:N \equiv N^+ - \ddot{O}^-: \leftrightarrow \ddot{N}^- = N^+ = \ddot{O}:$
Nitric oxide	NO	$\begin{array}{c} N \cdots O \\ \longleftrightarrow \\ 115 \text{ pm} \end{array}$
Dinitrogen trioxide (or) Nitrogen sesquioxide	N_2O_3	$\begin{array}{ccc} O & O^- & O & O \\ & & & \\ N & - N^+ & \leftrightarrow & N & - N^+ \\ & & & \\ & O & & O^- \end{array}$
Nitrogen dioxide	NO_2	$\ddot{O} = \dot{N} - \ddot{O}:$
Nitrogen tetraoxide	N_2O_4	$\begin{array}{ccc} O^- & O & \\ & & \\ N^+ & - N^+ & \\ & & \\ O & O^- & \end{array}$
Nitrogen pentoxide	N_2O_5	$\begin{array}{ccc} :O: & & :O: \\ & & \\ N^+ & - \ddot{O} - & N^+ \\ & & \\ :O^-: & & :O^-: \end{array}$


نام	ضابطہ	ساخت
Hyponitrous acid	$H_2N_2O_2$	$HO - N = N - OH$
Hydronitrous acid	$H_4N_2O_4$	$\begin{array}{c} HO \\ \diagdown \\ N - OH \\ \diagup \\ HO - N \\ \diagdown \\ OH \end{array}$

Nitrous acid	HNO_2	
Pernitrous acid	HOONO	
Nitric acid	HNO_3	
Pernitric acid	HNO_4	

نائٹروجن کے آکسی آکسائیڈوں کی ساخت

نام Name	ضابطہ Formula	تکسیدی حالت Oxidation state	تیاری Preparation
Hyponitrous acid	$\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$	+1	$\text{Ag}_2\text{N}_2\text{O}_2 + 2\text{HCl} \longrightarrow 2\text{AgCl} + \text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$
Nitrous acid	HNO_2	+3	$\text{Ba}(\text{NO}_2)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{HNO}_2 + \text{BaSO}_4$
Pernitrous acid	HOONO	+3	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{ON}(\text{OH}) \longrightarrow \text{ON}(\text{OOH}) + \text{H}_2\text{O}$
Nitric acid	HNO_3	+5	$4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{NO}_2$ $2\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ $2\text{N}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 4\text{HNO}_3$
Pernitric acid	HNO_4	+5	$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow \text{NO}_2\text{OOH} + \text{HNO}_3$

3.1.7 فاسفورس کے بہروپ (Allotropic forms of phosphorus)



خاکہ 3.2 سفید فاسفورس کی ساخت


فاسفورس کئی بہروپی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سفید، سرخ اور سیاہ بہروپی شکلیں عام ہیں۔ خالص تیار کردہ سفید فاسفورس بے رنگ ہوتا ہے۔

سفید فاسفورس کو تھوڑی دیر یونہی رکھنے پر سرخ فاسفورس کی پتلی تہہ جمع ہوتی ہے۔ اس کو زرد فاسفورس کہتے ہیں۔ یہ زہریلا ہوتا ہے اور لہسن کی بو رکھتا ہے۔ یہ اندھیرے میں چمکتا ہے۔ اس کی وجہ تکسید کا عمل ہے۔ اس کو Phosphorescence کہتے ہیں۔ سفید فاسفورس کم مستحکم ہے۔ یہ ہوا میں تیزی سے آگ پکڑ لیتا ہے اور P_2O_5 کا سفید دھواں پیدا کرتا ہے۔

سفید فاسفورس کو روشنی اور ہوا کی غیر موجودگی میں $420^\circ C$ پر گرم کرنے پر سرخ فاسفورس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سرخ فاسفورس، سفید فاسفورس کی طرح زہریلا نہیں

ہے۔ اس میں اندھیرے میں چمکنے کی خاصیت بھی نہیں ہے۔ سرخ فاسفورس، کیمیائی اعتبار سے سفید فاسفورس کے مقابلے میں کم تعامل پذیر ہے۔ یہ کم درجہ حرارت پر بھی نہیں جلتا۔ سرخ فاسفورس کو غیر فعالیت میں ابال کے گرم کر کے بخارات کو منجمد کرنے پر فاسفورس حاصل ہوتا ہے۔

فاسفورس کہ تہہ دار ساخت ہوتی ہے جو ایک نیم موصل (semi conductor) کا کام کرتا ہے۔ اس میں چار فاسفورس کے جوہر زنجیر کی شکل میں P_4 آپس میں جڑ کر سہ پہلوئی اہرامی (tetrahedron) ساخت کا ایک پالیر کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ نائٹروجن کی طرح فاسفورس کی ساخت میں $P \equiv P$ کی تہری بندش اتنی مستحکم نہیں ہے، جتنا $P-P$ مستحکم ہے۔ علاوہ اس کے اور دو فاسفورس کے بہروپ ہیں، جن کو scarlet اور Violet فاسفورس کہتے ہیں۔





خاکہ 3.3 سرخ فاسفورس کی ساخت



3.1.8 فاسفورس کے خواص (Properties of phosphorus)

فاسفورس انتہائی اعلیٰ تعامل کا حامل ہے۔ اس میں درج ذیل کیمیائی خصوصیات موجود ہیں۔


آکسیجن کے ساتھ تعامل : زرد فاسفورس آسانی سے جل سکتا ہے اور سفید دھواں پیدا کرتا ہے۔ سرخ فاسفورس بھی آکسیجن کے ساتھ جل کر فاسفورس ٹری آکسائیڈ اور فاسفورس پینٹا آکسائیڈ بناتے ہیں۔




کلورین کے ساتھ تعامل : کلورین کے ساتھ فاسفورس تعامل پا کر فاسفورس ٹرائی کلورائیڈ اور فاسفورس پینٹا کلورائیڈ دیتا ہے۔ کمرے کی تپش پر زرد فاسفورس، ہوا کے ساتھ تیزی سے تعامل کرتا ہے، جب کہ سرخ فاسفورس گرم کرنے پر تعامل کرتا ہے۔






قلیوں (Alkali) کے ساتھ تعامل : زرد فاسفورس، جوش کھاتے ہوئے قلی (alkali) کے ساتھ، ایک غیر فعال فضا میں فاسفین خارج کرتا ہے۔ اس تعامل میں فاسفورس ایک تجویلی عامل کی طرح کام کرتا ہے۔



نائٹرک ترشے کے ساتھ تعامل : جب فاسفورس کو مرکنز نائٹرک ترشے کے ساتھ تکسیدی تعامل کرنے پر فاسفورک ترشہ بنتا ہے۔ اس تعامل میں قلمی ایوڈین بطور متاسی عامل استعمال ہوتا ہے۔



دھاتوں کے ساتھ رد عمل : کیلشیم اور میگنیشیم جیسی دھاتوں کے ساتھ فاسفورس تعامل پا کر فاسفائیڈ بناتا ہے۔ سوڈیم اور پوٹاشیم جیسی دھاتیں،



فاسفورس کے استعمالات :

1- سرخ فاسفورس کو دیاسلانی Match Box میں استعمال کرتے ہیں۔


2- یہ بعض بھرتوں کو بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثال: فاسفور برانز

3.1.9 فاسفین (PH₃) (Phosphine)

فاسفورس کا ایک اہم ہائیڈرائڈ فاسفین ہے۔



تیاری :

سفید فاسفورس کو مرکنز NaOH محلول کے ساتھ، کاربن ڈی آکسائیڈ یا ہائیڈروجن کے غیر فعال فضا میں گرم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔



حاصل کردہ فاسفین سے فاسفین ڈائی ہائیڈرائڈ P₂H₄ کو انجمادی آمیزہ (freezing mixture) سے گزارنے پر فاسفین حاصل ہوتا ہے۔ ڈائی ہائیڈرائڈ تکثیف پاتا ہے، جب کہ فاسفین تکثیف نہیں پاتا۔


فاسفین کو دھاتی فاسفائیڈ کو پانی یا معدنی ترشے کے ساتھ آب پاشیدگی سے بھی تیار کیا جاتا ہے۔



فاسفورس ترشے کو گرم کر کے فاسفین کو اس کی خالص حالت میں حاصل کیا جاتا ہے۔



فاسفونیم ایوڈائیڈ کو کاسٹک سوڈا کے ساتھ گرم کر کے فاسفین کے خالص نمونہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔




فاسفین کی طبعی خصوصیت (Physical properties)



یہ ایک بے رنگ گیس ہے جس میں سڑی ہوئی مچھلی کی بو آتی ہے اور نہایت زہریلی ہے۔ یہ پانی میں کم حل پذیر ہے۔ لٹمس کاغذ کے ساتھ اس کا رد عمل تعدیلی ہے۔ 188K پر یہ ایک بے رنگ مائع بن کر تکثیف پاتا ہے اور 139.5 K پر منجمد ہو کر ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

فاسفین کی کیمیائی خصوصیات (Chemical properties)



حرارتی استحکام (Thermal Stability) : فاسفین کو ہوا کی غیر موجودگی میں 317K پر گرم کر کے یا برقی رو گزارنے پر یہ تحلیل پا کر اس کے اجزاء، عناصر میں تشکیل پاتے ہیں۔




احتراق پذیری (Combustion) : فاسفین کو ہوا یا آکسیجن کے ساتھ گرم کیا جائے تو یہ جل کر میٹھا فاسفورک ترشہ بنتا ہے۔




اساسی نوعیت (Basic Nature) : فاسفورس ایک کمزور اساس ہے۔ یہ ہیلوجن کے ترشوں کے ساتھ تعامل پا کر فاسفونیم نمک بناتے ہیں۔




فاسفین ہیلوجن کے ساتھ تعامل پا کر فاسفورس پنٹا ہیلائیڈ بناتے ہیں۔




تحویلی خاصیت (Reducing property) : فاسفین اپنے دھاتی نمکوں سے دھاتی رسوب بناتے ہیں۔



یہ boron trichloride جیسے لیوس ترشے کے ساتھ کوآرڈینیٹن مرکبات بناتے ہیں۔



فاسفین کی ساخت (Structure)



فاسفین میں فاسفورس sp^3 مخلوط Hybridisation رکھتا ہے۔ تین مدارے بندشی جوڑی پر اور چوتھے کو نہ پر الیکٹرانوں کی تنہا جوڑی موجود ہے۔ لہذا زاویہ کم ہو کر 93.5° ہو جاتا ہے۔ فاسفین کی ساخت اہرامی شکل کی ہے۔

فاسفین کے استعمالات (Uses of phosphine)

چونکہ فاسفین بہت زیادہ دھواں خارج کرتا ہے، اس لئے اسے دھوئیں کا پردہ (Smoke screen) بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہازوں میں کسی مسئلہ کے دوران، کیمیشم کاربائڈ اور کیمیشم فاسفائیڈ کے آمیزے کو ایک سوراخ کردہ برتن میں رکھ کر، جہاز سے سمندر کے پانی میں پھینکا جاتا ہے۔ اس سے فاسفین اور ایسیٹیلین گیس خارج ہوتی ہے۔ خارج ہونے والی فاسفین گیس، ایسیٹیلین کو جلا دیتی ہے۔ یہ گیسیں جل کر قریب سے گزرنے والے جہازوں کو اشارہ کا کام کرتی ہیں۔ اس کو Holmes signal کہا جاتا ہے۔

3.1.10 فاسفورس ٹری کلورائیڈ اور پینٹا کلورائیڈ


فاسفورس ٹری کلورائیڈ

تیاری: جب کلورین آہستہ سے سفید فاسفورس سے گزارا جاتا ہے تو فاسفورس ٹری کلورائیڈ حاصل ہوتا ہے۔ فاسفورس ٹری کلورائیڈ کو سفید فاسفورس اور تھیمونائل کلورائیڈ کے تعامل سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔




خصوصیات (Properties)

جب فاسفورس ٹری کلورائیڈ کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ آب پاشیدگی کی جاتی ہے تو وہ فاسفورس ترشہ بناتے ہیں۔



اس کیمیائی تعامل میں پانی کے سالمے کی ہم گرفتہ ہم ربط (coordination) فاسفورس میں موجود خالی 3d مدارے کو استعمال کرتے ہیں،

جس سے HCl خارج ہوتا ہے، جو $SiCl_4$ کی آب پاشیدگی کے مشابہ ہے۔



یہ تعامل مزید دو مرحلوں سے گزر کر $P(OH)_3$ یا H_3PO_3 بناتا ہے۔



اسی طرح کے تعاملات الکحل اور کارباکسلک ترشوں کے سالموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔



فاسفورس ٹری کلورائیڈ کے استعمالات:

H_3PO_3 کی تیاری کے دوران فاسفورس ٹری کلورائیڈ


chlorinating agent کی طرح کام کرتا ہے۔

فاسفورس پنٹا کلورائیڈ: (Phosphorus pentachloride)

تیاری:


جب PCl_3 کو افزہ مقدار میں کلورین کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے

تو فاسفورس پنٹا کلورائیڈ حاصل ہوتا ہے۔





کیمیائی خصوصیات (Chemical properties)


PCl_5 گرم کرنے پر فاسفورس ٹری کلورائیڈ اور کلورین میں تحلیل پاتا ہے۔



فاسفورس پنٹا کلورائیڈ پانی کے ساتھ رد عمل کر کے فاسفورس ٹری کلورائیڈ اور آرتھو فاسفورک ترشہ بناتا ہے۔




Overall reaction



فاسفورس پنٹا کلورائیڈ دھات کے ساتھ تعامل پا کر دھاتی کلورائیڈ بناتے ہیں۔ یہ فاسفورس پنٹا کلورائیڈ ہی کی طرح نامیاتی مرکبات کو کلوریناتے

(Chlorinate) ہیں۔



فاسفورس پنٹا کلورائیڈ کے استعمالات:

فاسفورس پنٹا کلورائیڈ ایک chlorinating agent ہے، اور یہ OH گروپ

کو Cl کے جوہر سے بدلنے میں استعمال ہوتا ہے۔



3.1.11 فاسفورس کے آکسائیڈس اور آکسوائیڈ (Oxoacid) کی ساخت:


فاسفورس متعدد آکسائیڈس جیسے فاسفورس ٹری آکسائیڈ، فاسفورس ٹیٹرا آکسائیڈ اور

فاسفورس پنٹا آکسائیڈس بناتا ہے۔

فاسفورس ٹرائی آکسائیڈ میں چار فاسفورس کے جوہر ٹیٹرا ہائیڈرین یعنی چار سطحی کے

کونوں پر اور چھ آکسیجن کناروں پر جڑے ہوتے ہیں۔ P-O کابندشی فاصلہ





165.6 pm ہے۔ جو تہا P-O کے بندش فاصلہ (184pm) سے کم ہے۔ اس کی وجہ $p\pi-d\pi$ کی بندش ہے جو دوہری بندش کی خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ P_4O_{10} میں P کا ہر ایک جوہر آکسیجن کے ساتھ تین بندشیں بناتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن کے ساتھ مزید ایک ہم ربط بندش بھی بناتا ہے۔ اس کے آخری سرے پر P-O بندش کی لمبائی 143pm جو متوقع اکہری بندش کے فاصلہ سے کم ہے۔ اس کی وجہ آکسیجن کے جوہر کے p مدار پر فاسفورس کے خالی d مدار کا جانبی انطباق (overlap) ہے۔

فاسفورس کے آکسوائسڈ کی ساخت (Oxoacids of Phosphorous structure)

نام	ضابطہ	ساخت
Hypophosphorous acid	H_3PO_2	$\begin{array}{c} H \\ \\ H - P - OH \\ \\ O \end{array}$
Orthophosphorous acid	H_3PO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ HO - P - OH \\ \\ H \end{array}$
Hypophosphoric acid	$H_4P_2O_6$	$\begin{array}{cc} O & O \\ & \\ HO - P & - P - OH \\ & \\ HO & OH \end{array}$
Orthophosphoric acid	H_3PO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ HO - P - OH \\ \\ OH \end{array}$
Pyrophosphoric acid	$H_4P_2O_7$	$\begin{array}{cc} O & O \\ & \\ HO - P & - O - P - OH \\ & \\ HO & OH \end{array}$

فاسفورس کے آکسوائیڈ (Oxoacids of Phosphorus)

نام Name	ضابطہ Formula	تکسیدی حالت Oxidation state	تیاری Preparation
Hypophosphorous acid	H_3PO_2	+1	$P_4 + 6H_2O \longrightarrow 3H_3PO_2 + PH_3$
Orthophosphorous acid	H_3PO_3	+3	$P_4O_6 + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_3$
Hypophosphoric acid	$H_4P_2O_6$	+4	$2P + 2O_2 + 2H_2O \longrightarrow H_4P_2O_6$
Orthophosphoric acid	H_3PO_4	+5	$P_4O_{10} + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_4$
Pyrophosphoric acid	$H_4P_2O_7$	+5	$2H_3PO_4 \longrightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$

گروپ-16 (آکسیجن گروپ) کے عناصر (Group-16 (Oxygen Group) Elements)

توقع پذیری

گروپ-16 کے عناصر کو چیلکو جن یا (Ore forming elements) کہتے ہیں، کیونکہ کچھ دھات اکثر آکسائیڈس یا سلفائیڈس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا ممبر آکسیجن ہے، جو بہت ہی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ہوا میں یہ ڈی آکسیجن کی شکل میں (20% وزن اور حجم دونوں میں) اور آکسائیڈ کی شکل میں بھی پایا جاتا ہے۔ آکسیجن اور سلفر دونوں مل کر کمیت کے اعتبار سے زمین کی قشر کا 46.6% اور وزن کے اعتبار سے 0.034 حصہ موجود ہیں۔ سلفر، سلیفٹ (جپسم، اپسم، ...) اور سلفائیڈ (گیلینا، زنک بلنڈ، ...) کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ آتش فشاں کے راکھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس گروپ کے دیگر عناصر بہت ہی کم دستیاب ہیں اور سلفائیڈ کی کچھ دھات کے دھات اکثر tellurides، selenides وغیرہ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔

طبیعی خواص (Physical properties) گروپ-16 کے عناصر کے عام طبیعی خواص درج ذیل جدول میں دئے گئے ہیں۔

جدول 3.2 گروپ-16 کے عناصر کے عام طبیعی خواص



خصوصیت	Oxygen	Sulphur	Selenium	Tellurium	Polonium
293 K پر طبیعی حالت	گیس	ٹھوس	ٹھوس	ٹھوس	ٹھوس
جوہری عدد	8	16	34	52	84
ہم جا (ایسٹوپ)	^{16}O	^{32}S	^{80}Se	^{130}Te	$^{209}Po, ^{210}Po$
جوہری کمیت	15.99	32.06	78.97	127.60	209
برقیاتی تشکیل (الکٹران تشکیل)	$[He]2s^2 2p^4$	$[Ne]3s^2 3p^4$	$[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^4$	$[Kr]4d^{10} 5s^2 5p^4$	$[Xe] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4$

جوہری نصف قطر (Å)	1.52	1.80	1.90	2.06	1.97
کثافت (g.cm ⁻³ at 293 K)	1.3 x 10 ⁻³	2.07	4.81	6.23	9.20
نقطہ پگھلاؤ (K)	54	388	494	723	527
نقطہ جوش (K)	90	718	958	1261	1235





3.2 آکسیجن (Oxygen)

تیاری: کرہ فضا میں 23% اور پانی میں 83% آکسیجن پایا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر چٹانوں میں آکسیجن مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ صنعتی طور پر آکسیجن کی تیاری مائع ہوا کی کسری کشید کے ذریعے کی جاتی ہے۔

تجربہ گاہ میں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کی تحلیل سے، جس میں MnO₂ کو بطور تماسی عامل استعمال کیا جاتا ہے، آکسیجن تیاری کی جاتی ہے۔





بعض دھاتی آکسائیڈ (یا) آکسوائینین (Oxoanions) کی حرارتی تحلیل سے آکسیجن تیاری کی جاتی ہے۔



خواص:

عام حالت میں آکسیجن دو جوہری گیس کی حیثیت سے پائی جاتی ہے۔ آکسیجن کی خاصیت یک مقناطیسی (paramagnetic) ہے۔ نائٹروجن کی اور فلورین کی طرح آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ مضبوط کیمیائی بندش بناتا ہے۔ آکسیجن کی دو شکلیں ڈائی آکسیجن (O₂) اور اوزون (O₃) ہیں۔ اوزون کی کچھ مقدار سمندر کی سطح پر بالا بنفشی شعاعوں کے گرنے سے بنتا ہے۔

تجربہ گاہ میں آکسیجن پر 20,000V تفاوت بالقوہ کو بے بار کرنے پر اوزون گیس تیار ہوتی ہے، جس میں تقریباً 10% آکسیجن، اوزون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس آمیزے کو ozonised oxygen کہتے ہیں۔ مائع شدہ ozonised oxygen کی کسری کشید سے خالص اوزون حاصل ہوتی ہے، جس کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے۔




اوزون کے سالمے کی ساخت خم دار ہے اور یہ آکسیجن کے جوہروں کے ساتھ delocalised بندش رکھتی ہے۔

کیمیائی خواص (Chemical properties)

آکسیجن اور اوزون کے کیمیائی خصوصیات میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ دھاتیں اور ادھاتیں، آکسیجن کے ساتھ تعامل پا کر آکسائیڈ بناتے ہیں۔ کمرے کی تپش پر آکسیجن، s- بلاک عناصر کے ساتھ تعامل کرتی ہے۔ کم تعامل پذیر دھاتوں کو سفوف کی شکل میں آکسیجن کے ساتھ کمرے کی تپش پر برون حراری تعامل پاتے ہیں، مگر ٹھوس حالت میں تعامل نہیں کرتے۔ باریک سفوف کردہ (تقسیم کردہ) دھاتیں Pyrophoric کہلاتی ہیں۔ جب یہ ذرات کو جلایا جاتا ہے تو تعامل کے دوران حرارت خارج ہوتی ہے۔

دوسری طرف اوزون ایک طاقتور تفسیدی عامل ہے۔ یہ بہت ساری اشیاء کے ساتھ مناسب حالات میں رد عمل کرتا ہے جب کہ آکسیجن تعامل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر پوٹاشیم ایوڈائیڈ KI کو ایوڈن میں تفسید کرتی ہے۔ یہ کیمیائی تعامل مقداری ہے اور اوزون کی مقدار معلوم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔



اوزون عام طور پر نامیاتی مرکبات کی تفسید کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترشوی محلول میں اوزون فلورین اور آکسیجن کی تفسیدی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اوزون کی تجلیلی شرح قلعوی محلول میں تیزی سے گھٹتی ہے۔

استعمالات:

- 1- زندہ عضویوں کی بقا کے لئے آکسیجن ایک ضروری جزء ہے۔
- 2- ویلڈنگ میں اس کا استعمال (آکسی اسی ٹی لین) ہوتا ہے۔
- 3- مانع آکسیجن کوراکٹوں میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔

3.2.1 گندھک کی بہروپی شکلیں (Allotropic forms of sulphur)

گندھک (سلفر) دو شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ قلعی (Crystalline) اور نقلمی (Amorphous)۔ قلعی سلفر میں معین نما سلفر (Rhombic sulphur) (α Sulphur) سلفر، ایک مالکی سلفر (Monoclinic Sulphur) (β Sulphur) شامل ہیں۔ نقلمی سلفر میں پلاسٹک سلفر (Plastic sulphur) (γ sulphur)، سلفر کا دودھ (Milk of sulphur) اور معلق سلفر (Colloid sulphur) شامل ہیں۔

معین نما سلفر (Rhombic sulphur)



معین نما سلفر کو α سلفر بھی کہتے ہیں۔ عام تپش اور دباؤ میں معین نما سلفر ہی حرر کی (Thermodynamically) طور پر قیام پذیر بہروپ ہے۔ قلعی سلفر زرد رنگ کا ہوتا ہے، جو S₈ سالمے سے بنا ہوا ہے۔ جب معین نما سلفر کو 96°C سے زیادہ تپش پر آہستہ گرم کرنے پر وہ ایک مالکی β سلفر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ 96°C سے کم تپش پر ٹھنڈا کرنے پر β شکل کا سلفر α کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک مالکی سلفر بھی S₈ سالمے سے بنا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑی مقدار میں S₆ سالمے بھی رکھتا ہے۔ اس کی شکل ایک سوئی نما منشور کی طرح ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ منشور نما سلفر بھی کہلاتا ہے۔ یہ 96°C - 119°C تک قیام پذیر یا مستحکم ہے اور آہستہ آہستہ معین نما سلفر میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔

جب پگھلے ہوئے سلفر کو ٹھنڈے پانی میں ڈالا جائے تو یہ جم ہو کر ربڑ کے ربن (فیٹہ) کی شکل میں پلاسٹک سلفر بن جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نرم اور پھیلنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ٹھنڈا کرنے پر سخت معین نما سلفر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



سلفر مانع اور گیس دونوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ درجہ حرارت 140°C کے قریب ایک مالکی سلفر پگھل کر زردی مال مانع λ سلفر بنتا ہے۔ مانع سلفر کے بخارات میں 90% S₈، S₇ اور S₆ سلفر اور بہت کم مقدار میں S₂، S₃، S₄ اور S₅ کا آمیزہ پایا جاتا ہے۔

3.2.2 سلفر ڈائی آکسائیڈ (Sulphur dioxide)

تیاری: سلفر کو ہوا میں جلا کر سلفر ڈائی آکسائیڈ کو وسیع پیمانے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ تقریباً 6.8% سلفر تکسید پا کر SO₃ بنتا ہے۔



سلفائیڈ سے تیاری (From sulphides): گلینا (PbS)، زنک بلنڈ (ZnS) جیسی سلفائیڈ کی کچھ دھاتوں کو ہوا میں بھونا جاتا ہے تو سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے۔ سلفر ڈائی آکسائیڈ کو وسیع پیمانے پر سلفیورک ترشہ بنانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور دیگر صنعتی ضروریات کے لئے بھی تیار کیا جاتا ہے۔



تجربہ گاہ میں تیاری: تجربہ گاہ میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو دھات یا دھاتی سلفائیڈ کو سلفیورک ترشے کے ساتھ تعامل سے تیار کیا جاتا ہے۔





خواص:

سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس آتش فشانوں کے پھٹنے کے دوران پائی جاتی ہے۔ کمرہ فضا میں زیادہ مقدار میں سلفر ڈائی آکسائیڈ بجلی کے طاقت گھروں سے خارج ہوتی ہے، جہاں پر کونلمہ، تیل اور تانبے سے پکھلنے کی وجہ سے یہ ماحول میں پھیلنے لگتی ہے۔ یہ ایک بے رنگ گیس ہے جس میں دم گھٹنے والی بو پائی جاتی ہے۔ یہ پانی میں بہت اچھی طرح حل پذیر ہے۔ یہ ہوا سے 2.2 گنا وزنی ہے۔ سلفر ڈائی آکسائیڈ کو 2.5 فضائی دباؤ اور 288°C پر مائع حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے (نقطہ جوش 263 K)۔




کیمیائی خواص (Chemical properties)

سلفر ڈائی آکسائیڈ ایک ترشوی آکسائیڈ ہے۔ یہ پانی میں حل ہو کر سلفیورک ترشہ دیتی ہے۔





سوڈیم ہائیڈرائڈ آکسائیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ تعامل:

سلفر ڈائی آکسائیڈ کو جب سوڈیم ہائیڈرائڈ آکسائیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تو سوڈیم ہائیڈرائڈ سلفائیٹ اور سوڈیم سلفائیٹ حاصل ہوتا ہے۔




تکسیدی خصوصیت: (Oxidising property)

سلفر ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن سلفائیڈ کو تکسید کر کے سلفر میں تبدیل کرتی ہے اور میکینیشیم کو میکینیشیم ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کر دیتی ہے۔






تحویلی خاصیت (Reducing property)

چونکہ سلفر ڈائی آکسائیڈ فوری طور پر تکسید پاتی ہے، یہ ایک تحویلی عامل کر کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ کلورین کو ہائیڈروکلورک ترشے میں تبدیل کرتی ہے۔




یہ پوٹاشیم پرمانگنیٹ کو Mn^{2+} اور ڈائی کرومیٹ کو Cr^{3+} میں تبدیل کرتی ہے۔





آکسیجن کے ساتھ تعامل:

سلفر ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن کے ساتھ اعلیٰ تپش پر گرم کرنے سے یہ تکسید پا کر سلفر ٹرائی آکسائیڈ بناتی ہے۔ تماس کے طریقے سے سلفیورک ترشے



سلفر ڈائی آکسائیڈ کے رنگ کٹ کا عمل (Bleaching action)

پانی کی موجودگی میں سلفر ڈائی آکسائیڈ اون، ریشم، آسفنج اور گھاس کے رنگ کٹائی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کی تحویلی خاصیت کی وجہ سے ہے۔



تاہم سلفر ڈائی آکسائیڈ کارنگ کٹائی کا عمل مستقل نہیں ہوتا، کیونکہ آہستہ آہستہ آکسیجن کے ساتھ یہ تکسید پا کر کچھ وقفہ بعد، وہ اس کے اصلی حالت پر

یعنی اس کارنگ بحال ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک عارضی عمل ہے۔

سلفر ڈائی آکسائیڈ کے استعمالات:

1- سلفر ڈائی آکسائیڈ کو اون، بال، ریشم وغیرہ کی رنگ کٹائی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

2- سلفر ڈائی آکسائیڈ کو زراعت میں بطور جراثیم کش اور حشرات کش استعمال کیا جاتا ہے۔

سلفر ڈائی آکسائیڈ کی ساخت (Structure of sulphur dioxide)

سلفر ڈائی آکسائیڈ میں سلفر کے جوہر sp^2 مخلوط

Hybridization ہے۔ S اور O درمیان دوہری بندش کی

وجہ $\text{p}\pi\text{-d}\pi$ کے درمیان انطباق (overlapping) ہے۔

3.2.3 سلفیورک ترشہ: Sulphuric acid (H_2SO_4)

تیاری:



سلفیورک ترشے کی تیاری Lead Chamber Process لیڈ چیمبر طریقہ اور Cascade (or) Contact تماسی طریقہ

یہاں پر ہم تماسی طریقہ (Contact Process) کے متعلق جانیں گے۔

تماسی طریقہ سے سلفیورک ترشے کی تیاری: (Manufacture of sulphuric acid by contact process)


تماسی طریقے سے سلفیورک ترشے کی تیاری میں تین اہم مرحلے پائے جاتے ہیں۔

i- پہلے گندھک یا Iron pyrites کو آکسیجن یا ہوا میں جلا کر سلفر ڈائی آکسائیڈ تیاری جاتی ہے۔



ii- حاصل شدہ سلفر ڈائی آکسائیڈ کو V_2O_5 یا planitised asbestos جیسے تناسی عامل کی موجودگی میں ہوا کے ساتھ تکسید کرنے پر ایک گیس بناتی ہے، جو سلفر ٹری آکسائیڈ کہلاتی ہے۔

iii- سلفر ٹری آکسائیڈ کو مرکوز سلفیورک ترشہ میں حل کیا جاتا ہے تو ایک گاڑھا مائع حاصل ہوتا ہے جو اولیم ($H_2S_2O_7$ (Oleum) کہلاتا ہے۔ اولیم کو احتیاط کے ساتھ پانی میں ہلکا یا جاتا ہے تو مرکوز سلفیورک ترشہ حاصل ہوتا ہے۔






زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لئے پلانٹ کو 2 فضائی دباؤ اور 720K درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والا سلفیورک ترشہ 96% خالص ہوتا ہے۔

طبعی خواص (Physical properties)

خالص سلفیورک ترشہ بے رنگ، بے بو اور لزوجی (Viscous) مائع ہے، جس کی کثافت 298K پر 1.84 g/mL ہے۔ اس کا نقطہ جوش اور لزوجیت بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے سالمے ہائیڈروجن بندش سے جڑے ہوئے ہیں۔

اس کا نقطہ انجماد 283.4 K اور نقطہ جوش 590 K ہے۔ یہ پانی میں اچھی طرح حل پذیر ہے۔ اس کو بطور ناہیدہ عامل (dehydrating agent) استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو پانی میں ملانے پر مونو ہائیڈریٹس ($H_2SO_4 \cdot H_2O$) اور ڈائی ہائیڈریٹ ($H_2SO_4 \cdot 2H_2O$) بنتے ہیں۔ یہ تعامل بروں حراری ہے اور اس میں حرارت خارج ہوتی ہے۔


سلفیورک ترشہ ایک ناہیدہ عامل ہے جو بہت سے اشیاء جیسے شکر، آکسلک ترشہ اور فارمک ترشہ جیسے نامیاتی مرکبات کے ساتھ رد عمل کر کے



کیمیائی خواص (Chemical properties)




سلفیورک ترشہ بہت ہی تعامل پذیر شے ہے۔ سلفیورک ترشہ ایک طاقتور تکسیدی عامل کے طور پر عمل کرتا ہے۔

تحلیل پذیری (Decomposition): سلفیورک ترشہ ایک مستحکم ترشہ ہے۔ اعلیٰ تپش پر یہ تحلیل پا کر SO_3 میں تحویل ہو جاتا ہے۔




ترشوی نوعیت (Acidic nature)







یہ ایک طاقتور دوہری اساسی ترشہ ہے۔ یہ سلفیٹ اور بائی سلفیٹ نامی دو قسم کے نمک بناتا ہے۔



تکسیدی خاصیت (Oxidising property): سلفیورک ترشہ ایک طاقتور تکسیدی عامل ہے۔ یہ نوزائیدہ آکسیجن تیار کرتا ہے جیسے نیچے بتایا گیا ہے





عناصر جیسے کاربن، سلفر اور فاسفورس کی تکسید سلفیورک ترشہ کرتا ہے اور یہ برومائڈ اور ایوڈائیڈ سے برومین اور ایوڈین کی تکسید کرتا ہے۔





دھاتوں کے ساتھ تعامل (Reaction with metals) :

سلفیورک ترشہ دھاتوں کے ساتھ تعامل پا کر متعلقہ حاصلات دیتا ہے جو متعلقات کی نوعیت اور تعاملات کی شرائط پر منحصر ہے۔

ہلکایا ہوا سلفیورک ترشہ دھاتیں جیسے، قلعی، الوئیم، جست وغیرہ کے ساتھ تعامل پا کر متعلقہ سلفیٹ دیتا ہے۔






مرکز سلفیورک ترشہ، تانبا اور جست کے ساتھ تعامل پا کر ان کے متعلقہ سلفیٹس دیتا ہے۔



سلفیورک ترشہ شریف دھاتیں جیسے سونا، چاندی اور پلاٹینم کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔


نمکوں کے ساتھ رد عمل:

یہ مختلف دھاتی نمکوں کے ساتھ تعامل پا کر دھاتی سلفیٹس اور باقی سلفیٹس بناتا ہے۔



نامیاتی مرکبات کے ساتھ رد عمل:

یہ نامیاتی مرکبات جیسے بزمین کے ساتھ تعامل پا کر سلفونک ترشہ بناتا ہے۔



Benzene

Benzene sulphonic acid

سلفیورک ترشے کے استعمالات:



1- سلفیورک ترشہ کو کھادوں جیسے امونیم سلفیٹ، سوپر فاسفیٹ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ترشے جیسے HCl ہائیڈروکلورک ترشہ، نائٹرک ترشہ

وغیرہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

2- اسے کیسوں کو خشک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رنگوں اور دواؤں میں دھماکہ خیز اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

سلفیٹ / سلفیورک ترشے کی جانچ:

ہلکائے ہوئے سلفیورک ترشے کے ساتھ بیریم کلورائیڈ ملانے پر بیرم سلفیٹ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور جانچ یہ ہے کہ اسے لیڈ اسٹیٹ کے محلول میں ملانے سے لیڈ سلفیٹ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔



سلفر کے آکسی ایسڈ کی ساخت:

سلفرکئی آکسی ایسڈ بناتا ہے۔ ان میں سب سے اہم سلفیورک ترشہ ہے۔ اس کے علاوہ سلفورس اور ڈائی تھیونک ترشے ہیں، جو ان سے بننے والے نمک سے جانے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ آزادانہ طور پر غیر قیام پذیر ہیں، لہذا یہ الگ نہیں کئے جاسکتے۔ مندرجہ ذیل جدول میں سلفر کے مختلف آکسی ایسڈ اور ان کی ساختیں دی گئی ہیں۔

نام	سالمی ضابطہ	ساخت
Sulphurous acid	H_2SO_3	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{HO}-\text{S}-\text{OH} \end{array}$
Sulphuric acid	H_2SO_4	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{HO}-\text{S}-\text{OH} \\ \\ \text{O} \end{array}$
Thiosulphuric acid	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	$\begin{array}{c} \text{S} \\ \\ \text{HO}-\text{S}-\text{OH} \\ \\ \text{O} \end{array}$
Dithionous acid	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{HO}-\text{S}-\text{S}-\text{OH} \end{array}$
Disulphurous acid or Pyrosulphurous acid	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \quad \\ \text{HO}-\text{S}-\text{S}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{O} \quad \text{O} \end{array}$

نام	سالمی ضابطہ	ساخت
Disulphuric acid or pyrosulphuric acid	$H_2S_2O_7$	$ \begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ HO-S-O-S-OH \\ \quad \\ O \quad O \end{array} $
Peroxymono sulphuric acid (Caro's acid)	H_2SO_5	$ \begin{array}{c} O \\ \\ HO-S-O-OH \\ \\ O \end{array} $
Peroxodisulphuric acid. Marshall's acid	$H_2S_2O_8$	$ \begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ HO-S-O-O-S-OH \\ \quad \\ O \quad O \end{array} $
Dithionic acid	$H_2S_2O_6$	$ \begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ HO-S-S-OH \\ \quad \\ O \quad O \end{array} $
Polythionic acid	$H_2S_{n+2}O_6$	$ \begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ HO-S-(S)_n-S-OH \\ \quad \\ O \quad O \end{array} $

3.3 گروپ 17- (ہیلوجن گروپ) کے عناصر: (Group 17 (Halogen group) elements)

3.3.1 کلورین

دفعہ پذیری:

فلورین، کلورین، برومین، ایوڈین، اسٹائن اسٹائن گروپ 17 کے عناصر ہیں۔ ان تمام کو مجموعی طور پر ہیلوجن کہا جاتا ہے۔ ہیلوجن امتزاجی حالت میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تعامل پذیر ہیں۔ ان میں ذرائع کو دیکھا جائے تو فلورین کے لئے فلورسپار یا فلورائٹ ہے۔ فلورین کی ایک اور کچھ دھات کریولائٹ اور فلوروپٹائٹ ہیں۔ کلورین کا اہم ذریعہ سوڈیم کلورائیڈ ہے، جو سمندر کے پانی میں موجود ہے۔ برومائڈ اور ایوڈائڈ بھی سمندر کے پانی میں پائے جاتے ہیں۔

طبعی خواص:

گروپ 17 عناصر کے عام طبعی خصوصیات کو جدول 3.3 میں بتایا گیا ہے۔

جدول 3.3 گروپ 17 کے عناصر کے طبیعی خواص


خصوصیت	Fluorine	Chlorine	Bromine	Iodine	Astatine
طبیعی حالت 293K پر	گیس	گیس	مائع	ٹھوس	ٹھوس
جوہری عدد	9	17	35	53	85
ہم جا	¹⁹ F	³⁵ Cl, ³⁷ Cl	⁷⁹ Br	¹²⁷ I	²¹⁰ At, ²¹¹ At
جوہری کمیت (g.mol ⁻¹ at 293 K)	18.99	35.45	79.9	126.9	210
الکٹران کی تشکیل	[He]2s ² 2p ⁵	[Ne]3s ² 3p ⁵	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵
جوہری نصف قطر (Å)	1.47	1.75	1.85	1.98	2.02
کثافت (g.cm ⁻³ at 293 K)	1.55 x 10 ⁻³	2.89 x 10 ⁻³	3.10	4.93	-
نقطہ پگھلاؤ (K)	53	171	266	387	573
نقطہ جوش (K)	85	239	332	457	623

خواص:



کلورین بہت ہی زیادہ تعامل پذیر ہے، لہذا یہ آزادانہ طور پر نہیں پایا جاتا، بلکہ مختلف دھاتی کلورائیڈ کی شکل میں پایا جاتا ہے، سب سے اہم کلورائیڈ، سوڈیم کلورائیڈ ہے جو سمندر کے پانی میں پایا جاتا ہے۔

کلورین کی تیاری:



مینکنیز ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی میں سلفیورک تڑشہ اور کلورائیڈ کے کیمیائی تعامل سے کلورین تیار کیا جاتا ہے۔



اس کو دوسرے طریقوں سے حاصل کرنے کے لئے، ہائیڈروکلورک تڑشہ کو مختلف تکسیدی عاملوں جیسے مینکنیز ڈائی آکسائیڈ، لیڈ ڈائی آکسائیڈ، پوٹاشیم پرمنگنیٹ یا پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ وغیرہ سے تکسید کی جاتی ہے۔




جب رنگ کٹ سفوف کے ساتھ معدنیاتی تڑشہ کا تعامل کیا جاتا ہے تو کلورین گیس خارج ہوتی ہے۔



3.3.1 کلورین کی صنعتی تیاری:

کلورین کو سمندری پانی کی برق پاشیدگی سے یا ہوا میں HCl کی تکسید سے Deacon's process تیار کیا جاتا ہے۔
1- برق پاشیدگی کا عمل (Electrolytic Process) : جس میں برائن (neel) کی برق پاشیدگی ہوتی ہے






2- ڈیکن طریقہ (Deacon's Process) : جس میں ہائیڈروجن کلورائیڈ کی تکسید ہوتی ہے۔

برق پاشیدگی کا طریقہ (Electrolytic Process) :

کلورین کو برائن (مرکز NaCl) محلول میں برق پاشیدگی کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح Na^+ اور Cl^- رواں بنتے ہیں۔ Na^+ رواں OH^- کے ساتھ تعامل پاتا ہے اور NaOH سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ بنتا ہے اور ہائیڈروجن اور کلورین گیس خارج ہوتے ہیں۔
ڈیکن طریقہ (Deacon's process) : اس طریقے میں ہوا اور ہائیڈروکلورک تزشے کے آمیزے کو بہت سارے خانوں والے چیمبر Chamber سے گزارا جاتا ہے اور اس میں Pumice stone کو کپرس کلورائیڈ میں بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے اور گرم گیس کو 723K پر ایک جیکٹ کے ذریعے چیمبر کے چاروں طرف گزاری جاتی ہے۔
$$4\text{HCl} + \text{O}_2 \xrightarrow{400^\circ\text{C}} 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}_2 \uparrow$$

اس طرح جو کلورین گیس حاصل ہوتی ہے، وہ بہت ہلکائی ہوئی ہوتی ہے، اور اسے رنگ کٹ سفوف بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔



طبعی خواص:





کلورین ایک سبز مائل زرد گیس ہے، جو تیکھی بو رکھتی ہے اس کو تھوڑا سا سونگھنے پر سردرد آنے لگتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں سانس لے تو یہ مہلک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہوا سے 2.5 گنا وزنی ہے۔






کلورین پانی میں حل پذیر ہے۔ اس محلول کو کلورین کا پانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں سبز مائل زرد قلمی طور پر کلورین ہائیڈریٹ ($\text{Cl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) جمع ہوتا ہے۔ اس کو مائع میں (نقطہ جوش -34.6°C) اور زرد قلمی ٹھوس (نقطہ پگھلاؤ -102°C) میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

کیمیائی خواص:

دھاتوں اور ادھاتوں کے ساتھ تعامل :


یہ دھاتوں اور ادھاتوں کے ساتھ تعامل پا کر متعلق کلورائیڈس بناتے ہیں۔






ہائیڈروجن کے ساتھ اُلف (Affinity for Hydrogen)


کلورین کوٹر پٹائن کے ساتھ گرم کیا جائے تو یہ کاربن اور ہائیڈروکلورک ترشہ بناتے ہیں۔




یہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں پانی کے ساتھ تعامل پا کر ڈائی آکسیجن بناتا ہے۔ جب کلورین کو سورج کی روشنی میں رکھا جاتا ہے تو یہ اپنا رنگ اور بو کھودیتی ہے اور ہائیڈروکلورک ترشہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔





کلورین امونیا کے ساتھ تعامل پا کر امونیم کلورائیڈ اور مناسب حاصلات دیتی ہے، جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔




افزودا امونیا کے ساتھ۔




منجملہ تعامل





افزود کلورین کے ساتھ




منجملہ تعامل



کلورین ہائیڈروجن سلفائیڈ کو سلفر میں تکسید کرتی ہے۔ یہ برومائڈ اور ایوڈائیڈ کے ساتھ تکسید پا کر برومین اور ایوڈین کو خارج کرتی ہے۔ مگر یہ فلورائیڈس کو تکسید نہیں کرتی۔







قلیوں کے ساتھ تعامل: (Reaction with alkali) : کلورین ہلکائے ہوئے ٹھنڈے قلیوں کے ساتھ رد عمل کر کے کلورائیڈ اور ہائپوکلورائیٹ بناتے ہیں اور گرم مرتکز قلی کے ساتھ کلورائیڈس اور کلورائیٹ بناتے ہیں۔



منجملہ تعامل







overall reaction






تکسیدی اور رنگ کٹ تعامل (Oxidising and bleaching Action)

کلورین ایک اچھا تکسیدی اور رنگ کٹ عامل ہے۔ یہ نوزائیدہ آکسیجن کی وجہ سے ہے۔






بے رنگ تکسیدی حاصل → نوزائیدہ آکسیجن + رنگین مادے



کلورین کارنگ کٹ عمل مستقل ہے۔ یہ فیرس کے نمکوں کو فیرک میں، سلفائٹ کو سلفیٹ میں اور ہائڈروجن سلفائیڈ کو سلفر میں تبدیل کر دیتا ہے۔



مجموعہ تعامل




مجموعہ تعامل





رنگ کٹ سفوف کی تیاری (Preparation of bleaching powder)

کلورین گیس کو خشک کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ (Slaked lime) پر گزار کر رنگ کٹ سفوف (Bleaching powder) تیار کیا جاتا ہے۔





ہٹاؤ تکسیدی تعاملات (Displacement redox reactions)




کلورین برومائڈس اور ایوڈائنڈ نمکوں کے ساتھ ہٹاؤ تعامل سے برومین اور ایوڈین بناتے ہیں۔



اضافی مرکبات کا بننا (Formation of Addition Compound)

سلفر ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ اور آکسائیڈ کے ساتھ کلورین تعامل کر کے اضافی مرکبات بناتے ہیں اور alkanes/arenes کے






کلورین کے استعمالات:

- 1- یہ پینے کے پانی کی تقطیر یعنی Purification کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- 2- یہ کپاس، پارچہ بانی، کاغذ اور rayon کے لئے رنگ کٹ عامل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
- 3- سونا اور پلاٹینم کی دھات سازی میں استعمال ہوتا ہے۔

3.3.2 ہائیڈروکلورک ترشہ (Hydrochloric acid)

تجربہ گاہ میں تیاری

ہائیڈروکلورک ترشہ کو تجربہ گاہ میں سوڈیم کلورائیڈ کو مرکب سلفیورک ترشے کے ساتھ گرم کر کے بنایا جاتا ہے۔



خشک کلورین گیس کو مرکب سلفیورک ترشے سے گذار کر خشک ہائیڈروکلورک ترشہ حاصل کیا جاتا ہے۔



خواص:

یہ ایک بے رنگ اور تیکھی بو والی گیس ہے۔ اسے آسانی سے مائع (نقطہ جوش 189K) اور سفید قلمی ٹھوس (نقطہ انجماد 159K) میں منجمد کیا جاسکتا ہے۔ یہ پانی میں اچھی طرح حل پذیر ہے۔



کیمیائی خواص:

تمام ترشوں کی طرح یہ بھی دھات سے ہائیڈروجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ تعامل پا کر کاربونیٹ اور بنی کاربونیٹ کے نمک دیتا ہے۔




یہ سوڈیم سلفائیٹ (Sodium sulphite) کے ساتھ تعامل پا کر سلفر ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہے۔



جب تین حصے مرکب HCl اور ایک حصہ مرکب HNO₃ کو (3:1) ملایا جاتا ہے تو ہے تو ماء الملوک حاصل ہوتا ہے جس کا استعمال سونا، پلٹینیم جیسی

شریف دھاتوں کو حل کرنے میں کیا جاتا ہے۔



ہائیڈروکلورک ترشے کے استعمالات (Uses of Hydrochloric acid)

- 1- ہائیڈروکلورک ترشہ کو کلورین، امونیم، کلورائیڈ اور مکئی کے نشاستہ سے گلوکوز تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- یہ ہڈیوں سے گلو (Glue) حاصل کرنے اور بون بلیک کی تخلیص میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3.3.3- ہائیڈروجن کے ہیلائیڈس کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات میں رجحانات:

(Trends in physical and chemical properties of hydrogen halides)

تیاری:


ہائیڈروجن اور ہیلوجن کا براہ راست امتزاج ہی ہائیڈروجن کلورائیڈ تیار کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ تعامل ہائیڈروجن اور فلورین کے درمیان بہت ہی شدید ہوتا ہے، جب کہ ہائیڈروجن اور برومین کے درمیان اور ہائیڈروجن اور ایوڈین کے درمیان تعامل رجعی ہوتا ہے اور اس سے خالص حاصلات پیدا نہیں ہوتے۔

ہٹاؤ تعاملات: (Displacement reactions)



مرکز سلفیورک ترشہ، روانی کلورائیڈ کے ساتھ تعامل پا کر ہائیڈروجن کلورائیڈ بناتے ہیں۔ زیادہ پیش پر ہائیڈروجن سلفیٹ بنتا ہے، جو مزید روانی کلورائیڈ کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ ہٹاؤ تعامل میں روانی فلورائیڈ سے ہائیڈروجن فلورائیڈ بناتے ہیں، مگر ہائیڈروجن برومائڈ اور ہائیڈروجن ایوڈائیڈ اس طریقے سے تعامل نہیں کرتے، بلکہ ان کو تکسید کرنے کے لئے مرکز سلفیورک ترشہ استعمال کیا جاتا ہے۔

فاسفورس ٹرائی ہیلائیڈ کی آب پاشیدگی (Hydrolysis of phosphorus trihalides)

کیسی ہائیڈروجن ہیلائیڈس تیار کرنے کے لئے پانی کے قطروں کو فاسفورس ٹرائی ہیلائیڈس میں ملایا جاتا ہے، سوائے فاسفورس ٹرائی فلورائیڈ کے۔



ہائیڈروجن برومائڈ کو تیار کرنے کے لئے برومین کو قطرہ بہ قطرہ، فاسفورس اور پانی کی لٹی پر گرایا جاتا ہے اور اسی طرح ہائیڈروجن ایوڈائیڈ کو آسانی کے ساتھ پانی کے قطروں کو سرخ فاسفورس اور ایوڈین کے آمیزے میں گرا کر حاصل کیا جاتا ہے۔




(where X=Br or I)

اگر اس میں ہیلوجن کے بخارات ہوں تو اس کو ایک نم سرخ فاسفورس کے ستون سے گزار کر انہیں خارج کر دیا جاتا ہے۔

ہم گرفتہ ہائیڈرائڈس سے: (From covalent hydrides)

ہائیڈروجن سلفائیڈ، ہیلوجن کو ہائیڈروجن کے ہیلائیڈس میں تحویل کرتا ہے۔



ہیلوجن کے ہائیڈروکاربنوں کے درمیان تعامل کے دوران ہائیڈروجن کلورائیڈ، بطور ضمنی حاصل (by-product)، حاصل ہوتا ہے۔


جدول 3.4 عام خواص

	HF	HCl	HBr	HI
بندش کے توڑنے کی توانائی (KJmol ⁻¹)	+562	+431	+366	+299
روانی خصوصیت کافی حد	43	17	13	7



ہائیڈروجن کے ہیلوائڈوں میں گھٹتی ہوئی بندشی تحلیل انتھالپی کی کمی کے ساتھ حرارتی قیام پذیری فلورائیڈ سے ایوڈائیڈ تک گھٹتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایوڈائیڈ 400°C پر تحلیل پاتا ہے جب کہ ہائیڈروجن فلورائیڈ اور ہائٹروجن کلورائیڈ اس پیش پر قیام پذیر ہیں۔ کمرے کی درجہ حرارت پر ہائیڈروجن کے ہیلوائڈ کی نوعیت گیس ہے، جب کہ ہائیڈروجن فلورائیڈ کو مانع کیا جاسکتا ہے۔ یہ گیسیں بے رنگ ہیں۔ مگر نم ہوا یعنی رطوبت کے ساتھ رد عمل کر کے سفید دھواں خارج کرتی ہیں، جو ہائیڈرو ہالک ترشہ کی بوندوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہیں۔ HF میں طاقت ور ہائیڈروجن کی بندش پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نقطہ جوش اور نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہے۔ یہ اثر دیگر ہائیڈروجن ہیلوائڈوں میں موجود نہیں ہے۔

تیزابی خواص: (Acidic Properties)

رواں سازی کی وجہ ہائیڈروجن کے ہیلوائڈ پانی میں پوری طرح حل پذیر ہیں۔





لہذا ہائیڈروجن کے ہیلوائڈس کا محلول ترشوی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کو ہائیڈرو ہالک ترشہ (Hydrohalic acid) کہتے ہیں۔ (HBr اور HI) ہائیڈرو ایوڈک ترشہ اور ہائیڈرو برومک ترشہ پانی میں مکمل روانیت پاتے ہیں۔ لہذا یہ طاقتور ترشے ہیں۔ مگر HF کمزور ترشہ ہے، کیونکہ 0.1mM کا محلول میں صرف 10% رواں بناتا ہے۔ مگر HF کا 5M اور 15M کا محلول توازن کی وجہ سے طاقت ور ترشہ ہے۔



اعلیٰ ارتکاز میں توازن حالت میں، فلورائیڈ کے رواں کا اخراج بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ہائیڈروجن فلورائیڈ کی تحلیل کو متاثر کرتا ہے اور ہائیڈروجن کے رواں کے ارتکاز کو بڑھاتا ہے۔ بہت سے نمک جیسے NaHF₂، KHF₂، اور NH₄HF₂ ہیں، جو مستحکم (قیام پذیر) جانے جاتے ہیں۔ باقی کے ہائیڈروجن ہیلوائڈس، ہائیڈروجن ڈائی ہیلوائڈ نہیں بناتے۔

Hydrohalic acids خاص ترشوی خواص رکھتے ہیں۔ یہ ترشے کے ساتھ تعامل پا کر نمک بناتے ہیں اور دھات کے ساتھ تعامل پا کر اساس بناتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتے ہیں۔ نم ہائیڈرو فلورک ترشہ (خشک نہیں) تیزی کے ساتھ سیلیکا اور شیشہ کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔




تکسید (Oxidation) ہائیڈروجن ایوڈائیڈ تکسید پا کر ایوڈین کی تشکیل کرتا ہے، اس لئے یہ ایک اچھا تھوہلی عامل ہے۔




ایوڈائیڈ کے ترشوی محلول فوری تکسید پاتے ہیں۔ مثبت نتیجے کے طور پر ایوڈین خارج ہوتا ہے۔ یہ نشاستہ کے ساتھ تعامل پا کر نیلا۔ سیاہ رنگ دیتا ہے۔

HI کی بہ نسبت ہائیڈروجن برومائڈ بہت مشکل سے تکسید پاتا ہے۔ H_2SO_4 کو HBr ، آہستہ سے تحویل کر کے SO_2 بناتا ہے۔



مگر ہائیڈروجن ایوڈائیڈ اور روائی ایوڈائیڈ فوری طور پر H_2SO_4 کو H_2S میں تحویل کرتے ہیں، نہ کہ SO_2 میں۔



ہائیڈروجن ایوڈائیڈ کی تحویلی خصوصیت کو، اس کا الکوحل کے ساتھ تعامل پا کر انتھین میں تبدیل پانے سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ یہ نائٹرک ترشہ کو نائٹرس ترشہ اور ڈائی نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کو امونیم میں تبدیل کرتا ہے۔

ہائیڈروجن کلورائیڈ، مرکب سلفیورک ترشے کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔ مگر MnO_2 ، پوٹاشیم پرمنگنیٹ یا پوٹاشیم ایوڈائیڈ جیسے طاقتور تکسیدی عاملوں کے ساتھ یہ تعامل پاتا ہے۔

جدول 3.5

درجہ (ترتیب)	خصوصیت
فلورین سے ایوڈین تک گھٹتی ہے۔	ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل
HF سے HI تک گھٹتی ہے۔	قیام پذیری
$HF < HI < HBr < HCl$	ہائیڈرائڈوں کی طیران پذیری
$HF > HCl > HBr > HI$	حرارتی قیام پذیری
$HCl < HBr < HI$	نقطہ جوش
HF سے HI تک گھٹتی ہے	ترشہ کی طاقت

3.3.4 بین ہیلوجنی مرکبات: (Inter halogen compounds)

ہر ایک ہیلوجن دوسرے ہیلوجن کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور بین ہیلوجنی مرکبات کا ایک سلسلہ بناتا ہے۔ مندرجہ ذیل کے جدول میں بین ہیلوجنی مرکبات A اور B دیا گیا ہے۔ اس میں A کی برق منفیت (electronegative) B سے کم ہے۔



جدول 3.6

AB	AB_3	AB_5	AB_7
ClF	ClF_3	IF_5	IF_7
BrF	BrF_3	BrF_5	
IF	IF_3		
BrCl	ICl_3		
ICl			
IBr			

بین ہیلوجنی مرکبات کے خواص: (Properties of Inter Halogen compounds)

- مرکزی جوہر کی جسامت زیادہ ہوگی۔
- یہ تعامل صرف دو ہیلوجنوں کے درمیان ہوگا، اور دو سے زیادہ ہیلوجنوں کے درمیان نہیں ہوگا۔



- (iii) فلورین مرکزی دھاتی عنصر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے۔
- (iv) فلورین کی برقی منفیت زیادہ اور جسامت بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس لئے یہ مرکزی جوہر کے ساتھ زیادہ کوآرڈینیٹیشن عدد زیادہ رکھتا ہے۔
- (v) یہ خود کار روایت دیتے ہیں۔



(vi) یہ ایک طاقتور تکسیدی عامل ہیں۔

قلیوں کے ساتھ تعامل :

جب قلیوں کے ساتھ گرم کرنے پر، بڑے ہیلوجن آکسی ہیلوجن اور چھوٹے ہیلوجن ہیلوآئیڈ بناتے ہیں۔



بین ہیلوجنی مرکبات کی ساخت :

ان کی سالماتی ساخت بہت دلچسپ ہے، جن کی وضاحت VSEPR نظریہ کی بنیاد پر کی جاسکتی ہے۔ اس کی تفصیلات جدول میں دی گئی ہیں۔

جدول 3.7

قسم	ساخت	مخلوطیت	بندشی جوڑی/تہا جوڑی
AX	خطی	sp ³	1 / 3
AX ₃	T نما	sp ³ d	3 / 2
AX ₅	مربع اہرامی	sp ³ d ²	5 / 1
AX ₇	پانچ سطحی دواہرامی	sp ³ d ³	7 / 0

3.3.5 ہیلوجن کے آکسائیڈس (Oxides of Halogens)

فلورین آسانی سے آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے ڈائی فلورین آکسائیڈ (F₂O) اور ڈائی فلورین ڈائی آکسائیڈ (F₂O₂) بناتے ہیں۔ اس کی تکسیدی حالت (-1) ہے۔ دوسرے ہیلوجن آکسیجن کے ساتھ تعامل نہیں، مگر مندرجہ ذیل آکسائیڈ کو کچھ بلا راست طریقوں سے تیار کیا جاسکتا ہے۔ سوائے فلورین کے، تمام ہیلوجن کی تکسیدی حالت مثبت ہوتی ہے


جدول 3.8

قسم	X ₂ O	XO ₂	X ₂ O ₅	X ₂ O ₆	X ₂ O ₇	دیگر
تکسیدی حالت	+1	+4	+5	+6	+7	-
F	-	-	-	-	-	OF ₂ (-1) O ₂ F ₂ (-1) O ₄ F ₂ (-1)
Cl	Cl ₂ O	ClO ₂	-	Cl ₂ O ₆	Cl ₂ O ₇	Cl ₂ O ₄ (+4)

Br	Br ₂ O	BrO ₂	-	-	-	-
I	-	-	I ₂ O ₅	-	-	I ₄ O ₉ I ₂ O ₄ (+4)

3.3.6 ہیلوجن کے آکسوائیڈ (Oxoacids of Halogens)

کلورین چار قسم کے آکسوائیڈ بناتے ہیں۔ وہ ہنسی پوکلورس ترشہ، کلورس ترشہ، کلورک اور پریکلورک ترشہ ہیں۔ برومین اور ایوڈین اسی طرح کے ترشے بناتے ہیں سوائے ہیلس ترشہ کے، جب کہ فلورین ہنسی پوفلورک ترشہ بناتا ہے۔ آکسوائیڈوں کی تکسیدی قوت کی ترتیب اس طرح ہے۔



جدول 3.9

قسم	HOX	HXO ₂	HXO ₃	HXO ₄
X = Cl, Br and I				
عام نام	Hypohalous acid	Halous acid	Hallic acid	Perhalic acid
تکسیدی حالت	+1	+3	+5	+7
F	HOF	-	-	-
Cl	HOCl	HClO ₂	HClO ₃	HClO ₄
Br	HOBr		HBrO ₃	HBrO ₄
I	HOI		HIO ₃	HIO ₄

3.4 گروپ 18 (جامد گیس) کے عناصر

3.4.1 وقوع پذیری

یہ تمام گیسیں کرہ فضا میں پائی جاتی ہیں۔

طبیعی خواص :

اگر ان عناصر کے خصوصیات کو گروپ میں اوپر سے (ہیلیم سے ریڈان) کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے جوہری نصف قطر اور نقطہ جوش میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی پہلی روانی توانائی ہیلیم سے ریڈان کی طرف گھٹتی ہے۔ دوسرے عناصر کے مقابلے میں جامد گیسوں میں زیادہ روانی توانائی ہوتی ہے، کیونکہ ان ایک بیرون ترین خول مکمل ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی مستحکم ہیں اور الیکٹران کو کھونے یا حاصل کرنے کا رجحان بہت کم رکھتے ہیں۔ گروپ 18 کے عام طبیعی خواص کو ذیل کی جدول میں دیا گیا ہے۔

خواص	Neon	Argon	Krypton	Xenon	Radon
293K پر طبیعی حالت	گیس	گیس	گیس	گیس	گیس
جوہری عدد	10	18	36	54	86

ہم جا	²⁰ Ne	⁴⁰ Ar	⁸⁴ Kr	¹³² Xe	²¹¹ Rn, ²²⁰ Rn, ²²² Rn
جوہری عدد (g.mol ⁻¹ at 293 K)	20.18	39.95	77.92	131.29	[222]
الکٹرائی تشکیل	[He]2s ² 2p ⁶	[Ne]3s ² 3p ⁶	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶	[Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
جوہری نصف قطر (Å)	1.54	1.88	2.02	2.16	2.20
کثافت (g.cm ⁻³ at 293 K)	8.25 x 10 ⁻⁴	1.63 x 10 ⁻³	3.42 x 10 ⁻³	5.37 x 10 ⁻³	9.07 x 10 ⁻³
نقطہ پگھلاؤ (K)	24.56	83.81	115.78	161.4	202
نقطہ جوش (K)	27.104	87.30	119.74	165.05	211.5

جدول 3.10 گروپ 18 عناصر کے عام طبیعی خواص




جامدگیوں کے طبیعی خواص (Properties of inert gases)

طبیعی خواص


سبھی نوبل گیسوں ایک جوہری ہوتے ہیں۔ یہ بے بو، بے رنگ، بغیر ذائقے اور غیر احتراق پذیر گیسوں ہوتی ہیں۔ عام طور پر نوبل گیسوں غیر تعامل پذیر ہیں اور یہ ادھات کے خواص رکھتے ہیں۔

کیمیائی خواص



صرف زینان اور کرپٹان کیمیائی تعاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ زینان اور فلورین براہ راست تعامل پا کر مناسب تجرباتی حالت کے تحت زینان




جب XeF₆ کو 50°C تک مہربند کوارٹز کے برتن میں گرم کیا جاتا ہے تو XeOF₄ بنتا ہے۔



جب کیمیائی تعاملات کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے تو درج ذیل تعامل ہوتا ہے۔




آبی بخارات کے ساتھ XeF₆ کی آب پاشیدگی سے XeO₃ حاصل ہوتا ہے۔



جب XeF₆ کو 2.5M NaOH کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تو سوڈیم پریزیٹیٹ Na₄XeO₆ حاصل ہوتا ہے۔



سوڈیم پریزیٹیٹ ایک طاقتور تکسیدی عامل ہے۔ مثال کے طور پر میکینیز (II) رواں تکسید پا کر پرمنگنیٹ کے رواں بناتے ہیں۔ بغیر کسی تماسی عامل



زینان PtF_6 کے ساتھ تعامل پا کر زرد مائل ٹھوس $[XePtF_6]$ بناتے ہیں، جو CCl_4 کے محلول میں غیر حل پذیر ہیں۔
 زینون ڈائی فلورائیڈ اضافی مرکبات $XeF_2 \cdot 2TaF_5$ اور $XeF_2 \cdot 2SbF_5$ بناتا ہے۔ زینون ہکسا فلورائیڈس، بوران اور قلعوی دھاتوں کے ساتھ مرکبات بناتے ہیں۔ مثال: XeF_6 ، BF_3 ، MF_6 - اس میں M قلعوی دھاتیں ہیں۔
 اسی طرح $XeCl_2$ زینان ڈائی کلورائیڈ کی موجودگی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
 جب کرپٹان اور فلورین کو $183^\circ C$ پر برقی رو کو گزارا جاتا ہے تو کرپٹان ڈائی فلورائیڈ بنتا ہے۔ اگر ان گیسوں کو SbF_5 کے ساتھ اشعاع (irradiated) جاتا ہے تو یہ $KrF_2 \cdot 2SbF_5$ بنتا ہے۔

جدول 3.11 زینان کے مرکب کی ساخت

مرکبات	مخلوطیت	ساخت
XeF	sp^3d	خطی
XeF_4	sp^3d^2	مربع سطحی
XeF_6	sp^3d^3	بے شکل آٹھ سطحی
$XeOF_2$	sp^3d	T نما
$XeOF_4$	sp^3d^2	مربع اہرامی
XeO_3	sp^3	اہرامی

جامد گیسوں کے استعمالات: (Uses of Nobel Gases)

نوبل گیسوں کی غیر فعالیت (جامد خاصیت) ہی ان کے عملی استعمالات کی اہم خصوصیات ہے۔

ہیلیم (Helium)

- 1- ہیلیم اور آکسیجن کے آمیزہ کو غوطہ خور، ہوا-آکسیجن کے آمیزے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو تکلیف، درد خطرناک حالت جس کو موڑ (bends) کہتے ہیں۔ ان تمام سے بچاتا ہے۔
- 2- ہیلیم کو دھاتوں کے برقی چمکاری اور دھاتی ویلڈنگ کے دوران غیر فعال ماحول کو مہیا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- ہیلیم کا نقطہ جوش بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا اس کو کرپٹونکس (بہت کم تپش کی سائنس) میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 4- یہ ہوا سے کم کثافت والی گیس ہے۔ اس لئے اس کو غباروں میں بھرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

نیان (Neon)

نیان کا استعمال اشتہارات کے فلوریت والے بلبوں اور سرخ بلبوں میں، شاندار سرخ چمک حاصل کرنے کے لئے شیشہ کی نالیوں میں کم دباؤ پر نیان گیس بھر کر ان کے اندر برقی رو گزاری جاتی ہے۔

آرگان (Argon)

آرگان کا استعمال بجلی کے بلبوں کی تلیوں (Filament) کی کارکردگی کو زیادہ کرتا ہے اور گرم ہو کر تکسید پانے سے بچاتا ہے۔

کرپٹان (Krypton)

کرپٹان کا استعمال فلوریت والے بلبوں میں اور Flash بلبوں میں ہوتا ہے۔

کرپٹان گیس بھرے لیپ ایرپورٹ میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی روشنی گہرے کہر اور دھند سے بھی گزر جاتی ہے، جس سے ہوائی جہازوں کو رن وے پر اترنے میں آسانی ہوتی ہے۔

زینان: (Xenon)

زینان کا استعمال فلوریت والے بلب، فلیش Flash بلب اور Laser لائٹ میں ہوتا ہے۔ زینان فوری طور پر تیز روشنی خارج کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا استعمال فوٹو گرافی کے بلبوں میں ہوتا ہے۔

ریڈان (Radon)

ریڈان ایک تابکار عنصر ہے۔ اس لئے یہ گاما شعاعیں بنانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ ریڈان گیس کو چھوٹے چھوٹے کپسول کی طرح مہر بند کر دیا جاتا ہے اور malignant یعنی سرطان کے خلیوں کو تباہ کرنے کے لئے جسم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔

خلاصہ

- وقوع پذیری: کرہ فضا کے تقریباً 78% حصہ میں نائٹروجن گیس موجود ہے۔ یہ زمین کے قشر میں سوڈیم نائٹریٹ (چلی سالٹ پیٹر) اور پوٹاشیم نائٹریٹ (ہندوستانی نمک) کے طور پر موجود ہے۔
- نائٹروجن: نائٹروجن ماحول میں پائے جانے والی اہم گیس ہے۔ حجم کے لحاظ سے 78% ہے۔ اس کو صنعتی طور پر نائٹروجن کو مائع ہوا کے کسری کشید کے طریقے سے الگ کیا جاتا ہے۔
- یوریا کی آب پاشیدگی سے امونیا تشکیل پاتا ہے۔
- مساوی مقدار میں پوٹاشیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو مرکب سلفیورک تیشے کے ساتھ گرم کر کے نائٹریک تیشہ تیار کیا جاتا ہے۔
- زیادہ تر تعاملات میں نائٹریک تیشہ تکسیدی عامل کے طور پر کام کرتا ہے۔ لہذا اس کی تکسیدی حالت +5 سے نچلے حصے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ دھاتوں کے ساتھ تعامل پا کر ہائیڈروجن گیس خارج نہیں کرتا۔
- نائٹریک تیشے کا دھاتوں کے ساتھ رد عمل کی وضاحت تین مراحل میں مندرجہ ذیل ہے۔
 - ابتدائی رد عمل: دھاتی نائٹریٹ بنتا ہے اور نوزائیدہ ہائیڈروجن کو خارج کرتا ہے۔
 - ثانوی رد عمل: نوزائیدہ ہائیڈروجن، نائٹریک تیشہ کے تحویلی حاصلات تیار کرتا ہے۔
 - ثلاثی رد عمل: ثانوی رد عمل سے حاصل شدہ حاصلات تحلیل پاتے ہیں یا تو کیمیائی تعامل پا کر نئے حاصلات بنتے ہیں۔
- فاسفورس کئی بہروپی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان میں سفید، سرخ اور سیاہ فاسفورس سب سے عام ہیں۔
- زرد فاسفورس کی نوعیت زہریلی ہے۔ اس میں لہسن جیسی مخصوص بو پائی جاتی ہے۔ یہ اندھیرے میں تکسید پا کر چمکتا ہے۔ جسے فاسفوریت Phosphorescence کہتے ہیں۔
- زرد فاسفورس احتراق پذیر ہے۔ ہوا میں یہ فوری طور پر جل کر فاسفورس پینٹا آکسائیڈ کا سفید دھواں خارج کرتا ہے۔
- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ اور سفید فاسفورس کے تعامل سے فاسفین تیار ہوتی ہے۔ اس دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ یا ہائیڈروجن کا غیر فعال ماحول بنایا جاتا ہے۔

- فاسفین زیادہ مقدار میں دھواں خارج کرتا ہے اس لئے اس کو دھوئیں کا اسکرین (Smoke screen) بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- کلورین کو جب سفید فاسفورس سے آہستہ سے گزارا جاتا ہے تو فاسفورس ٹری کلورائیڈ بنتا ہے۔
- فاسفورس ٹرائی کلورائیڈ اور فاسفورس پینٹا کلورائیڈ کو بطور کلورینیٹنگ ایجنٹ (عامل) استعمال کیا جاتا ہے۔
- آکسیجن ایک مقناطیسی خاصیت (Paramagnetic) رکھتا ہے اور دو بہروپی شکلوں (O_2) ڈی آکسیجن اور (O_3) ٹری آکسیجن یعنی اوزون کی شکل میں موجود ہے۔
- اوزون کو عام طور پر نامیاتی مرکبات کی تکسید کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- گندھک (سلفر) قلمی اور نقلمی بہروپ کی شکلوں میں موجود ہے۔ قلمی سلفر میں معین نما سلفر (α -sulphur) اور مونو کلینک سلفر (β -sulphur) شامل ہیں۔ نقلمی بہروپی سلفر میں پلاسٹک سلفر (γ -sulphur)، سلفر کا دودھ اور معلق سلفر شامل ہیں۔
- سلفیورک ترشے کی تیاری دو طریقوں سے ہوتی ہے۔
- (i) تماسی طریقہ (Contact process) اور (ii) سیسہ کے خانہ کا طریقہ (Lead chamber process)
- جب SO_3 کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو مونو ہائیڈریٹ ($H_2SO_4 \cdot H_2O$) اور ڈی ہائیڈریٹس ($H_2SO_4 \cdot 2H_2O$) بناتا ہے۔
- اور یہ تعامل بروں حراری ہے۔
- ہیلوجن ہمیشہ مشترکہ یا امتزاجی شکل میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انتہائی رد عمل رکھتے ہیں۔
- کلورین کی صنعتی تیاری کے لئے نمک کا پانی (brine) کی برق پاشیدگی کا طریقہ استعمال ہوتا ہے جس میں Brine ایک برق پاشیدہ محلول ہے۔
- اس عمل میں HCl کو ہوا کی موجودگی میں تکسید کیا جاتا ہے۔ اس کو Deacon's Process ڈیکن کا عمل کہتے ہیں۔
- کلورین، نوزائیڈ آکسیجن کی وجہ سے ایک طاقتور تکسیدی عامل اور بطور رنگ کٹ عامل استعمال ہوتا ہے۔
- جب مرکب ہائیڈروکلورک ترشہ کا 3 حصہ اور مرکب نائٹرک ترشہ کا ایک حصہ ملا یا جاتا ہے تو Aqua regia (ماء الملوک) حاصل ہوتا ہے۔ یہ سونا اور پلاٹینم کو حل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- ہائیڈروجن کے ہیلائیڈ پانی میں انتہائی حل پذیر ہیں، کیونکہ اس میں اعلیٰ روانیت سازی ہوتی ہے۔
- ہر ایک ہیلوجن، دوسرے ہیلوجن کے ساتھ مل کر مرکبات کا ایک سلسلہ بناتے ہیں۔ اس کو بین ہیلوجنی مرکبات کہتے ہیں۔
- فلورین آسانی سے آکسیجن کے ساتھ رد عمل کر کے ڈائی فلورین آکسائیڈ اور ڈائی فلورین ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں اور تکسیدی حالت (-1) ہے۔
- تمام جامد گیسوں کو فضا میں پائی جاتی ہیں۔
- یہ انتہائی مستحکم (قیام پذیر) ہیں۔ یہ الیکٹرانوں کو حاصل کرنے یا کھونے کا رجحان بہت کم رکھتے ہیں۔
- سوڈیم پرزینیٹ طاقتور تکسیدی خاصیت رکھتا ہے۔
- جامد گیس کی غیر محرک یا غیر فعالیت ان کے عملی استعمال کی اہم خصوصیت ہے۔



I۔ صحیح جواب منتخب کیجئے:

1۔ مندرجہ ذیل میں کس میں NH_3 استعمال نہیں کیا جاتا؟

(a) Nessler's Reagent

(b) گروپ (iv) کے بنیادی عناصر کی تشخیص کے لئے عامل

(c) گروپ (iii) کے بنیادی عناصر کی تشخیص کے لئے عامل

(d) Tollen's Reagent

2۔ ان میں کون سا بیان نائٹروجن کے بارے میں صحیح ہے؟

(a) کم ترین برقی منفیت والا عنصر

(b) آکسیجن کے مقابلے میں کم روانی انتھالپی رکھتا ہے۔

(c) d-مدار رکھتا ہے۔

(d) خود سے $p\pi-p\pi$ بندش بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔

3۔ ایک عنصر جو دوری جدول کے گروپ 15 اور تیسرے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس کی برقیاتی تشکیل (الکٹرانئی تشکیل) اس طرح ہوگی۔

a) $1s^2 2s^2 2p^4$

b) $1s^2 2s^2 2p^3$

c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

4۔ ایک ٹھوس (A) جب NaOH کے آبی محلول کے ساتھ تعامل پاتا ہے تو ایک بدبودار گیس (B) خارج ہوتی ہے جو فوری طور پر ہوا میں جلتی ہے۔

A اور B یہ ہیں۔

a) P_4 (red) and PH_3

b) P_4 (white) and PH_3

c) S_8 and H_2S

d) P_4 (white) and H_2S

5۔ PCl_5 کی آب پاشیدگی Hydrolysis سے یہ حاصل ہوتا ہے۔

a) H_3PO_3

b) PH_3

c) H_3PO_4

d) POCl_3

6۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ P_4O_6 تعامل پا کر یہ دیتا ہے۔

a) H_3PO_3

b) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$

c) HPO_3

d) H_3PO_4

7۔ پائرو فاسفورس ترشے ($\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_5$) کی اساسیت یہ ہے۔

a) 4

b) 2

c) 3

d) 5

8۔ دئے گئے ارتھو فاسفورک ترشے کی سالمیت (molarity) 2M ہے۔ اس کی نارمالٹی (Normality) یہ ہوگی۔

a) 6N

b) 4N

c) 2N

d) none of these

9۔ توثیق: فلورین گیس کی بہ نسبت، کلورین کی بندش کے توڑنے کی توانائی (bond dissociation energy) زیادہ ہے۔

سبب: فلورین کی بہ نسبت کلورین میں الیکٹرانوں کی دفع (repulsion) زیادہ ہے۔

(a) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں۔ سبب، توثیق کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔

(b) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں، مگر سبب، توثیق کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔

(c) توثیق صحیح ہے، مگر سبب غلط ہے۔

(d) توثیق اور سبب دونوں غلط ہیں۔

10۔ مندرجہ ذیل میں کون سا طاقتور تفسیدی عامل ہے۔

a) Cl_2

b) F_2

c) Br_2

d) I_2

11۔ ہائیڈروجن کے ہیلائیڈ کی حرارتی استحکام کی صحیح ترتیب اس طرح ہے۔

a) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$

b) $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

c) $\text{HCl} > \text{HF} > \text{HBr} > \text{HI}$

d) $\text{HI} > \text{HCl} > \text{HF} > \text{HBr}$

12۔ مندرجہ ذیل مرکبات میں سے کون سا مرکب تشکیل نہیں پاتا؟

a) XeOF_4

b) XeO_3

c) XeF_2

d) NeF_2

13۔ آسانی سے مائع حالت میں تبدیل ہونے والی گیس یہ ہے۔

a) Ar

b) Ne

c) He

d) Kr

14۔ XeF_4 کی مکمل آب پاشیدگی سے یہ حاصل ہوتا ہے۔

a) XeOF_4

b) XeO_2F_2

c) XeO_3

d) XeO_2

15۔ ذیل میں کون سا سب سے طاقتور ترشہ ہے۔

a) HI

b) HF

c) HBr

d) HCl

16۔ بندش کے توڑنے کی توانائی (bond dissociation energy) سے متعلق مندرجہ ذیل میں ہیلوجن کی کوئی ترتیب درست ہے؟ (NEET)

- a) $\text{Br}_2 > \text{I}_2 > \text{F}_2 > \text{Cl}_2$ b) $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$
c) $\text{I}_2 > \text{Br}_2 > \text{Cl}_2 > \text{F}_2$ d) $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{F}_2 > \text{I}_2$

17۔ مندرجہ ذیل میں ترشویت کی صحیح ترتیب یہ ہے۔ (NEET)

- a) $\text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ b) $\text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3$
c) $\text{HClO}_3 < \text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO}$ d) $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$

18۔ جب تانبے کو مرکب HNO_3 کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو یہ حاصل ہوتا ہے۔











- a) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, NO and NO_2 b) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ and N_2O
c) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ and NO_2 d) $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ and NO

درج ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔

- 1۔ جامد جوڑی (Inter pair) کا اثر کیا ہے؟
- 2۔ چالکوجن گروپ کا تعلق p-بلاک سے ہے۔ سب بتائیے۔
- 3۔ فلورین کی تکسیدی حالت ہمیشہ 1- ہوتی ہے، اس کی وضاحت کریں۔
- 4۔ مندرجہ ذیل میں ہیلوجن کی تکسیدی حالت لکھئے۔
a) OF_2 b) O_2F_2 c) Cl_2O_3 d) I_2O_4
- 5۔ بین ہیلوجنی مرکبات کیا ہیں؟ مثالیں دیجئے۔
- 6۔ دوسرے ہیلوجنوں کے مقابلے میں فلورین زیادہ تعامل پذیر ہیں۔ اس کی وجہ بتائیے۔
- 7۔ ہیلیم کے استعمالات بتائیے۔
- 8۔ IF_7 میں ایوڈین کی مخلوطیت (Hybridisation) کیا ہے؟ اس کی ساخت بتائیے۔
- 9۔ کلورین کے ساتھ ٹھنڈے اور گرم NaOH کے درمیان تعامل کے لئے متوازن کیمیائی مساوات لکھئے۔
- 10۔ تجربہ گاہ میں کلورین کس طرح تیار کی جاتی ہے؟
- 11۔ سلفیورک ترشے کے استعمالات لکھئے۔
- 12۔ ایک سبب کے ساتھ یہ بتائیے کہ سلفیورک ترشہ ایک نابیدہ عامل ہے۔
- 13۔ نائٹروجن کے خاص طرز عمل کی وجہ بیان کیجئے۔
- 14۔ مندرجہ ذیل کے سالماتی اور ساختی ضابطے لکھئے۔

- (a) نائٹرک ترشہ (b) ڈائی نائٹروجن پکٹا کسانڈ
(c) فاسفورک ایسڈ (d) فاسفین

- 15- آرگان کے استعمالات لکھئے۔
- 16- گروپ 15 کے عناصر کی گرتی خول کی الکٹرائی تشکیل لکھئے۔
- 17- فاسفین کے کیمیائی نوعیت کو ظاہر کرتے ہوئے کوئی دو مساوات لکھئے۔
- 18- نائٹرک ترشہ اور ایک اساسی آکسائیڈ کے درمیان ایک کیمیائی تعامل لکھئے۔
- 19- جب PCl_5 کو گرم کیا جائے تو کیا ہوگا؟
- 20- وجہ بتائیں کہ HF کیوں ایک کمزور ترشہ ہے جب کہ دیگر تمام ہیلوجن کے دوہری ترشے، طاقتور ترشے ہیں۔
- 21- (HOF) ہائپوفلورس ترشے میں آکسیجن کا تکسیدی عدد حاصل کیجئے۔
- 22- ان میں کس قسم کی مخلوطیت (hybridisation) ہوتی ہے؟
- BrF₃ (b) BrF₅ (a)
- 23- مندرجہ ذیل تعاملات کو مکمل کیجئے۔



مروری (عبوری) اور اندرونی مروری (عبوری) عناصر

(TRANSITION AND INNER TRANSITION ELEMENTS)

اکائی
4



Martin Heinrich Klaproth,
(1743— 1817)

مارٹن ہینرین رچ لاپ روتھ

مارٹن ہینرین رچ لاپ روتھ، ایک جرمن کیمیادان ہیں، جنہوں کی یورینیم، زرکونیم اور سیریم کی دریافت کی۔ حالانکہ انہوں نے ان کو ان کی دھاتی حالت میں حاصل نہیں کیا، انہوں نے انہیں جداگانہ عناصر (distinct elements) کہا۔ انہوں نے Strontium اور Tellurium، Titanium کے دریافت ہونے کی تصدیق کی۔ تجزیاتی کیمیاء (Analytical chemistry) اور علوم معدنیات (Mineralogy) کی ترتیب میں ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے۔



سیکھنے کے مقاصد



اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ

- دوری جدول میں d اور f عناصر کے مقام کے بارے میں سیکھ سکیں گے۔

- 3d سلسلہ میں موجود عناصر کے خواص اور رجحانات سے متعلق وضاحت کر سکیں گے۔

- Standard Electrode Potential M^{n+}/M کے رجحانات سے متعلق وضاحت کر سکیں گے۔

- E° کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تکسیدی اور تھوبلی خصوصیت کو پیشین گوئی کر سکیں گے۔

- d بلاک کے عناصر کا بھرت، کمپلکس اور بین خلوی مرکبات بننے کے رجحانات سے متعلق وضاحت کر سکیں گے۔

- Potassium اور Potassium dichromate

- Permanganate کی تیاری اور خواص کو بیان کر سکیں گے۔

- f بلاک کے عناصر کے خواص کی وضاحت کر سکیں گے۔

- Actinides اور lanthanides کے خواص کا

موازنہ کر سکیں گے۔

عام طور پر دھاتی عناصر جن کے d یا f مدار (Sub shell) میں بھرے ہوئے الیکٹران نامکمل ہوں اور ان کی تعدیلی اور مشروانی حالت کو عبوری یا مروری دھاتیں کہتے ہیں۔ اس میں Lanthanides اور actinides بھی شامل ہیں۔ IUPAC کے مطابق عبوری (مروری) عناصر وہ ہیں جن کے d اور f مداروں میں نامکمل الیکٹران پائے جاتے ہوں یا وہ اپنے الیکٹرانوں کو کھو کر مشروانی (Cation) دیتے ہیں۔ مروری جدول کی مرکزی مقام پر قائم ہیں۔ s بلاک کے عناصر جو بہت ہی تعامل پذیر دھاتیں ہیں اور p بلاک کے عناصر، جن میں سے اکثر ادھات ہیں، ان دونوں کے درمیان میں ان کا مقام پایا جاتا ہے۔ سوائے گروپ 11 کے، تمام مروری عناصر بہت سخت ہیں اور ان کا نقطہ پگھلاؤ بہت بلند ہوتا ہے۔

مروری دھاتیں لوہا اور تانبا انسانی تہذیب میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے عناصر بھی، مثلاً بلب کی بیٹوں میں Tungsten، مصنوعی جوڑ (انسانی ہڈیوں کے) بنانے میں Titanium اور مصنوعی جوڑ لگانے میں Molybdenum، جوش دان (Boiler) بنانے میں Molybdenum، تھامسی عمل (Catalysis) میں Platinum وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جاندار عضویوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خون میں لوہا (Iron) اور وٹامن B12 میں کوبالٹ (Cobalt) استعمال ہوتا ہے۔ اس اکائی میں d بلاک عناصر جس میں خاص کر 3d سلسلہ والے عناصر کے خواص، ان کے کیمیائی تعاملات، اور بعض اہم مرکبات جیسے $K_2Cr_2O_7$ اور $KMnO_4$ کے عام رجحان کا مطالعہ کریں گے۔

4.1 دوری جدول میں d بلاک عناصر کا مقام (Position of d-block elements in the periodic table)

گیارہویں جماعت میں ہم نے دوری جدول کی جماعت بندی سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ جدید دوری جدول میں عبوری (مروری) عناصر، گروپ - 3 سے لے کر گروپ - 21 تک کے مرکز میں قائم ہیں۔

s-Block										p-Block									
hydrogen 1 H 1.0079																		helium 2 He 4.0026	
lithium 3 Li 6.941	beryllium 4 Be 9.0122																	boron 5 B 10.811	neon 10 Ne 20.180
sodium 11 Na 22.990	magnesium 12 Mg 24.305																	carbon 6 C 12.011	argon 18 Ar 39.948
																		nitrogen 7 N 14.007	
																		oxygen 8 O 15.999	
																		fluorine 9 F 18.998	
																		silicon 14 Si 28.086	
																		phosphorus 15 P 30.974	
																		sulfur 16 S 32.065	
																		chlorine 17 Cl 35.453	
																		aluminum 13 Al 26.982	
																		argon 18 Ar 39.948	
																		potassium 19 K 39.098	
																		calcium 20 Ca 40.078	
																		scandium 21 Sc 44.956	
																		titanium 22 Ti 47.867	
																		vanadium 23 V 50.942	
																		chromium 24 Cr 51.996	
																		manganese 25 Mn 54.938	
																		iron 26 Fe 55.845	
																		cobalt 27 Co 58.933	
																		nickel 28 Ni 58.693	
																		copper 29 Cu 63.546	
																		zinc 30 Zn 65.38	
																		gallium 31 Ga 69.723	
																		germanium 32 Ge 72.64	
																		arsenic 33 As 74.922	
																		selecnium 34 Se 78.96	
																		bromine 35 Br 79.904	
																		krypton 36 Kr 83.798	
																		rubidium 37 Rb 85.468	
																		strontium 38 Sr 87.62	
																		yttrium 39 Y 88.906	
																		zirconium 40 Zr 91.224	
																		niobium 41 Nb 92.906	
																		molybdenum 42 Mo 95.96	
																		technetium 43 Tc [98]	
																		ruthenium 44 Ru 101.07	
																		rhodium 45 Rh 102.91	
																		palladium 46 Pd 106.42	
																		silver 47 Ag 107.87	
																		cadmium 48 Cd 112.41	
																		indium 49 In 114.82	
																		tin 50 Sn 118.71	
																		antimony 51 Sb 121.76	
																		tellurium 52 Te 127.60	
																		iodine 53 I 126.90	
																		xenon 54 Xe 131.29	
																		cesium 55 Cs 132.91	
																		barium 56 Ba 137.33	
																		lanthanum 57 La 138.91	
																		hafnium 72 Hf 178.49	
																		tantalum 73 Ta 180.95	
																		tungsten 74 W 183.84	
																		rhenium 75 Re 186.21	
																		osmium 76 Os 190.23	
																		iridium 77 Ir 192.22	
																		platinum 78 Pt 195.08	
																		gold 79 Au 196.97	
																		mercury 80 Hg 200.59	
																		thallium 81 Tl 204.38	
																		lead 82 Pb 207.2	
																		bismuth 83 Bi 208.98	
																		polonium 84 Po [209]	
																		astatine 85 At [210]	
																		radon 86 Rn [222]	
																		francium 87 Fr [223]	
																		radium 88 Ra [226]	
																		actinium 89 Ac [227]	
																		rutherfordium 104 Rf [261]	
																		dubnium 105 Db [262]	
																		seaborgium 106 Sg [266]	
																		bohrium 107 Bh [264]	
																		hassium 108 Hs [277]	
																		meitnerium 109 Mt [268]	
																		darmstadtium 110 Ds [271]	
																		roentgenium 111 Rg [272]	
																		copernicium 112 Cn [285]	
																		nihonium 113 Nh [286]	
																		flerovium 114 Fl [289]	
																		moscovium 115 Mc [289]	
																		livermorium 116 Lv [293]	
																		tennessine 117 Ts [294]	
																		oganesesson 118 Og [294]	

f-Block

خاکہ 4.1 جدید دوری جدول میں d-بلاک کے عناصر کا مقام

d بلاک عناصر میں 3d سلسلہ (چوتھے دور) Scandium سے Zinc تک (10 عناصر)، 4d سلسلہ (پانچویں دور) Yttrium سے Cadmium تک (10 عناصر)، 5d سلسلہ (چھٹی دور) Haffnium, Lanthanum سے Mercury تک۔ ہمیں معلوم ہے کہ گروپ 12 کے عناصر Cadmium, Zinc اور Mercury میں عناصر کی حالت میں ہوں یا تکسیدی حالت میں، ان کے d مدارے مکمل ہیں۔ اس کے باوجود انہیں مروری عناصر تصور کیا جاتا ہے، کیوں کہ ان کے خواص ان کے بالترتیب مروری عناصر کے خواص کے مشابہ ہیں۔ IUPAC کی وضاحت کے مطابق ساتویں دور کے عناصر جو Ac، Rf سے Cn تک بھی مروری عناصر میں شامل ہیں۔ سوائے Actinium کے تمام تابکار عناصر (Radioactive elements) مصنوعی طور پر تیار کئے گئے ہیں اور ان کی نصف مدت حیات (Half life period) بہت ہی کم ہے۔

4.2 الیکٹران کی تشکیل (Electronic configuration)

گیارہویں جماعت میں ہم نے ہنڈس کا قانون (Hund's rule)، آفبا کے اصول (Aufbau principle) کے مطابق عناصر کی برقیاتی تشکیل کو لکھنا سیکھا تھا۔ آفبا کے اصول کے مطابق الیکٹرانوں کو 3d مدارے میں پہلے 4s مدارے میں بھرنا چاہئے۔ چنانچہ 3d مداروں کی بھرتی Scandium سے شروع ہوتی ہے، اس کی الیکٹران کی تشکیل $[Ar]3d^1 4s^2$ اور اس کے بعد کے عناصر سلسلہ وار 3d کی بھرتی شروع ہوتی ہے اور Zn میں ختم ہوتی ہے، جس کی الیکٹران کی تشکیل $[Ar]3d^{10} 4s^2$ ہے۔ 3d مداروں کی بھرتی کرنے کی ترتیب میں دو طرح کی چھوٹی دی گئی ہے۔ اگر 3d مداروں کو مکمل طور پر بھرتی یا نصف بھرتی کیا جائے تو ترجیح اس طرح دی جائے گی، کیوں کہ یہ مستحکم تشکیل (Stable configuration) میں ہیں۔ مثال کے طور پر Cr اور Cu

Cr اور Cu کی الیکٹران کی تشکیل بالترتیب $[Ar]3d^5 4s^1$ اور $[Ar]3d^4 4s^1$ ہے۔ نصف بھرتی اور مکمل طور پر بھرتی d مداروں کے اس افزودہ استحکام کو اس سے پہلے گیارہویں جماعت ہی میں سمجھا گیا ہے۔ اس کی وجہ الیکٹرانوں کی تشاکلی تقسیم اور توانائی کا تبادلہ ہے۔

غور کریں : الیکٹرانوں کی تشاکلی تقسیم اور توانائی کی تبادلہ کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ جب d مداروں کو ایک ساتھ فرض کیا جاتا ہے تو وہ ایک کرہ کی طرح بن جائیں گے۔ چنانچہ نصف بھرتی شدہ اور مکمل بھرتی شدہ تشکیل کی وجہ سے الیکٹرانوں کی کثافت مکمل طور پر تشاکلی طور پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جزوی طور پر بھری ہوئی الیکٹران کی تشکیل میں ایک غیر تشاکلی الیکٹرانوں کی کثافت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تفاوت کا فرق (potential difference) پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لئے توانائی کو کم کرنے سکون کی حالت لائی جاتی ہے۔ لہذا ایک تشاکلی تقسیم کو ترجیح دیا جاتا ہے۔

ان دو چھوٹوں کی بنا پر بعض انفرادی صورتوں میں d بلاک عناصر کی عام الیکٹران کی تشکیل اس طرح لکھی جاسکتی ہے۔

$[Noble\ gas](n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ - یہاں پر n کی قیمت 4 سے 7 تک ہے۔

چھٹی اور ساتویں دور میں (سوائے La اور Ac کے) الیکٹران کی تشکیل اس طرح لکھی جاسکتی ہے۔

$(n-2)f\ orbital; [Noble\ gas](n-2)f^{1-14}(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$

4.3 خصوصیات میں عمومی رجحان (General trend in properties)

4.3.1 دھاتی خواص : تمام مروری عناصر دھاتیں ہیں۔ تمام دھاتوں کی طرح مروری دھاتیں بھی حرارت اور بجلی کے اچھے موصل ہیں۔ گروپ 1 اور گروپ 2 کے سوا اور گروپ نمبر 11 کے سوا تمام دھاتیں سخت ہیں۔ تمام دریافت کردہ عناصر میں کمرے کی تپش پر چاندی سب سے زیادہ برقی ایصال رکھتی ہے۔


اکثر مروری (عبوری) عناصر مسدی طور پر قریب ترین جڑے ہوئے (hcp)، مکعبی قریب ترین (ccp) یا جسم مرکزی مکعبی (bcc) طور پر جڑے ہوئے ہیں۔

21 Sc HCP	22 Ti HCP	23 V BCC	24 Cr BCC	25 Mn BCC	26 Fe BCC	27 Co HCP	28 Ni FCC	29 Cu FCC	30 Zn HCP
39 Y HCP	40 Zr HCP	41 Nb BCC	42 Mo BCC	43 Tc HCP	44 Ru HCP	45 Rh FCC	46 Pd FCC	47 Ag FCC	48 Cd HCP
57* La DHCP	72 Hf HCP	73 Ta BCC/ TETR	74 W BCC	75 Re HCP	76 Os HCP	77 Ir FCC	78 Pt FCC	79 Au FCC	80 Hg RHO
89* Ac FCC	104 Rf [HCP]	105 Db [BCC]	106 Sg [BCC]	107 Bh [HCP]	108 Hs [HCP]	109 Mt [FCC]	110 Ds [BCC]	111 Rg [BCC]	112 Cn [BCC]

خاکہ 4.2 4d, 3d اور 5d مروری دھاتوں کے جالیوں کی ساخت

جب ہم مروری سلسلہ میں بائیں سے دائیں کی طرف گزرتے ہیں تو چونکہ دھاتی بندش کے لئے غیر جوڑی دار d الیکٹرانوں کی تعداد بڑھتی ہے، اس لئے نقطہ پگھلاؤ پہلے بڑھتا ہے، اپنی انتہائی قیمت تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر d الیکٹران جوڑی دار ہوتے ہیں اور بندش کے لئے کم دستیاب ہوتے ہیں۔


مثال کے طور پر، پہلے سلسلہ میں نقطہ پگھلاؤ Scandium (نقطہ پگھلاؤ 1814 K) سے بڑھتا ہے اور Vanadium میں یہ انتہائی تک پہنچتا ہے (نقطہ پگھلاؤ 2183 K) اور Chromium (نقطہ پگھلاؤ 2800 K) تک رہتا ہے۔ جب کہ 3d سلسلہ کے Manganese اور 4d سلسلہ کے Technicium تک نقطہ پگھلاؤ کم رہتا ہے۔ مروری (عبوری) سلسلہ کے درمیان تک اعلیٰ نقطہ پگھلاؤ ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ d5 تشکیل مضبوط بین جوہری کشش کے لئے موزوں ہے۔ درج ذیل خاکہ مروری عناصر کے نقطہ پگھلاؤ کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔




خاکہ 4.3 3d سلسلہ کے عناصر کے نقطہ پگھلاؤ کا رجحان

4.3.2 جوہری اور روانی جسامت میں تبدیلی (Variation of atomic and ionic size)


عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایک دور میں جوہری نصف قطر بتدریج کم ہوتا ہے۔ کیونکہ مرکزی بار بڑھتا ہے اور اسی مدار یہ میں مزید الیکٹرانوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ مگر 3d مروری عناصر میں Sc سے V تک جوہری نصف قطر کم ہوتا جاتا ہے اور اور اس کے بعد Cu تک جوہری نصف قطر یکساں رہتا ہے۔ جب ہم 3d سلسلہ میں Sc سے Zn تک پہنچتے ہیں تو مزید الیکٹران 3d مدار یوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شامل شدہ



خاکہ (a) 4.4 3d عناصر کا جوہری نصف قطر



خاکہ (b) 4.4 4d عناصر کا جوہری نصف قطر



خاکہ (c) 4.4 5d عناصر کا جوہری نصف قطر

الیکٹران جزوی طور پر مرکزی بار کو روکتے ہیں (Shielding) اور Effective nuclear charge میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم 3d میں شامل شدہ مزید الیکٹران 4s میں موجود الیکٹرانوں کو دفع کرتے ہیں اور یہ دونوں قوتیں مخالف سمتوں میں عمل کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو توازن کرنا چاہتی ہیں، اس کی وجہ سے جوہری نصف قطر میں مستقلیت (Constancy) برقرار رہتی ہے۔


سلسلہ کے آخر میں Zinc کے d مدار یوں میں 10 الیکٹران پائے جاتے ہیں، جس میں الیکٹرانوں کے درمیان دفع کی قوت، Effective nuclear charge سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا مدار یہ تھوڑے پھیلتے ہیں اور جوہری نصف قطر بڑھتا ہے۔

عام طور پر جب ہم ایک گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو جوہری نصف قطر بڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح کے رجحان کی توقع d بلاک کے عناصر میں بھی ہے۔ جب الیکٹرانوں کو 4d مدار یوں میں شامل کیا جاتا ہے تو 4d کے الیکٹرانوں کا نصف قطر، 3d سلسلہ کے عناصر کے نصف قطر سے زیادہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں 5d کے عناصر کے جوہری نصف قطر،

4d عناصر کے نصف قطر کے تقریباً مساوی ہیں۔ اس کی وجہ Lanthanide contraction لینتھانائیڈ کا سکیڑ ہے، جس کے بارے میں ہم اس سبق میں اندرونی مروری عناصر میں مطالعہ کریں گے۔

4.3.3 روائی توانائی (Ionisation energy)

مروری (عبوری) عناصر کی روائی توانائی کی قیمت s اور p بلاک عناصر کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم مروری دھاتی سلسلہ میں بائیں سے دائیں کی طرف آتے ہیں تو روائی انتھالپی بڑھتی ہے، جیسا کہ توقع کیا گیا۔ اس کی وجہ الیکٹرانوں کے بھرتی ہونے سے مرکزائی بار میں تبدیلی ہے۔ درج ذیل خاکہ مروری عناصر میں روائی انتھالپی کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔



ایک مخصوص سلسلہ میں جوہری عدد کے اضافہ کے ساتھ پہلی روائی توانائی بتدریج نہیں بڑھتی۔ (n-1)d مداروں کے اضافی الیکٹران اور اندرونی الیکٹران، ڈھال (Shield) کی طرح عمل کرتے ہیں اور ns کے گرنٹی الیکٹرانوں کے مرکزائی بار کے اثر کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے روائی توانائی کی قیمتوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

روائی توانائی کی قیمتیں، ان کے حرکی استحکام (Thermodynamic stability) کی پیشین گوئی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آئیے Ni^{2+} اور Pt^{2+} یونوں کے بننے کے لئے درکار روائی توانائیوں کا موازنہ کرتے ہیں۔

$$IE_1 + IE_2 = (737 + 1753) \text{ kJ mol}^{-1} = 2490 \text{ kJ mol}^{-1}$$

نکل کے لئے

$$IE_1 + IE_2 = (864 + 1791) \text{ kJ mol}^{-1} = 2655 \text{ kJ mol}^{-1}$$

پلاٹینم کے لئے

چونکہ Pt^{2+} کی بہ نسبت Ni^{2+} کے رواں بننے کے لئے توانائی کم درکار ہے، اس لئے $Ni(II)$ کے مرکبات، $Pt(II)$ کے مرکبات کے بدلے میں زیادہ حرکی مستحکم (Thermodynamic stable) ہوتے ہیں۔

Pt^{4+} اور Ni^{4+} کے روانائی انتھالپی کی قیمتوں سے ان کے استحکام کا موازنہ کیجئے۔

IE	Ni	Pt
I	737	864
II	1753	1791
III	3395	2800
IV	5297	4150

4.3.4 تکسیدی حالت (Oxidation state)

پہلا موری عنصر Scandium صرف +3 تکسیدی حالت ظاہر کرتا ہے، مگر دیگر $(n-1)d$ مدار یہ کے تمام موری عناصر متغیر تکسیدی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ $(n-1)d$ اور ns مداروں میں الیکٹرانوں کے ڈھیلے (loose) ہونے کی وجہ سے ہے اور ان کے درمیان توانائی کا فرق بہت کم ہے۔ $3d$ سلسلہ کو فرض کیجئے۔ درج ذیل جدول $3d$ سلسلہ کے عناصر کی تکسیدی حالت کا خلاصہ ہے۔

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
				+7				
			+6	+6	+6			
		+5	+5	+5				
	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	
	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2
								+1

سلسلہ کے شروع میں، +3 تکسیدی حالت مستحکم ہے، مگر آخر میں +2 تکسیدی حالت مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ الیکٹرانوں کے حاصل ہونے کی تعداد کے مطابق، تکسیدی حالت کا عدد بھی بڑھتا ہے اور جوڑی دار الیکٹرانوں کے حاصل ہونے کے مطابق تکسیدی حالت کا عدد کم ہوتا ہے۔ لہذا پہلے اور آخری عناصر کم تکسیدی حالت کو ظاہر کرتے ہیں اور درمیان کے عناصر زیادہ تعداد میں تکسیدی حالتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر پہلے عنصر Sc میں صرف ایک تکسیدی حالت ہے یعنی +3، درمیانی عنصر Mn میں +2 سے +7 تک 6 مختلف تکسیدی حالتیں ہیں، آخری عنصر Cu میں صرف دو تکسیدی حالتیں +2 اور +1 ہیں۔

$3d$ دھاتوں کی مختلف تکسیدی حالتوں میں اضافی استحکام (relative stability) کو، نیم بھرتی اور مکمل طور پر بھرتی شدہ الیکٹرانوں کی تشکیل کی وجہ سے مزید استحکام کے ساتھ، موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ مثال: $Mn^{4+}(3d^5)$ کی بہ نسبت $Mn^{2+}(3d^5)$ زیادہ مستحکم (قیام پذیر) (Stable) ہے۔

$4d$ اور $5d$ دھاتوں کی تکسیدی حالتیں Y اور La کے لئے +3 اور Ru اور Os کے لئے +8 تک بدلتی ہیں۔ $4d$ اور $5d$ عناصر کی سب سے زیادہ تکسیدی حالت، ان کے زیادہ برق منفیت رکھنے والے عناصر کے ساتھ بننے والے مرکبات میں دیکھی گئی ہے۔ جیسے F، O اور Cl میں۔ مثال کے طور پر RuO_4 ، OsO_4 اور WCl_6 ۔ عام طور پر ایک گروپ میں اوپر سے نیچے اترتے وقت زیادہ تکسیدی حالت رکھنے والوں کا استحکام بڑھتا ہے، جب کہ کم تکسیدی حالت والے عناصر کم ہوتا ہے۔ فراسٹ کے نقشہ (Frost diagram) کے مطالعہ سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ (DG° vs Oxidation number) جیسا کہ خاکہ 4.6 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ Vanadium، Titanium اور

Chromium کے لئے سب سے زیادہ حرکی مستحکم تکسیدی حالت +3 ہے۔ Iron کے لئے +3 اور +2 حالتیں دونوں برابر مستحکم ہیں۔ 3d سلسلہ میں Copper کے لئے +1 تکسیدی حالت مستحکم ہے۔ +2 اور 0 تکسیدی حالتوں کے لئے یہ نامناسب ہے۔




Figure 4.6 Frost diagram

خود کا محاسبہ
Iron میں تکسیدی حالت +2 کی بہ نسبت
+3 زیادہ مستحکم ہے، اور Manganese میں
اس کا التا صحیح ہے؟

4.3.5 مروری دھاتوں میں معیاری برقیہ کی تفاوت

(Standard Electrode Potential) (E°)

(SEP) ایک متعامل سے دوسرے متعامل میں الکتروانوں کا

تبادلہ تکسیدی تعاملات (Redox reactions) کہلاتا

ہے۔ ایسے تعاملات ہمیشہ جوڑی دار ہوتے ہیں (Coupled)


، یعنی جب ایک شے تکسید پاتی ہے تو دوسری شے تختیل پاتی ہے۔ جو شے تکسید پاتی ہے، وہ تختیلی عامل کہلاتی ہے اور تختیل ہوتی ہے، وہ تکسیدی عامل کہلاتی ہے۔ ایک عنصر کی تکسیدی اور تختیلی طاقت کو Standard electrode potential میں پیمائش کی جاتی ہے۔

یہ ایک خانہ (cell) کی برق محرکہ قوت (emf) کی قیمت ہے، جس میں معیاری دباؤ (1 atm) اور تپش (273 K) پر تکسید یا کر برقیہ پر پروٹان محلول سازی (Solvation) کرتے ہیں۔

اگر ایک دھات کا Standard Electrode Potential (E°) زیادہ اور منفی ہو تو، وہ دھات ایک طاقتور تختیلی عامل ہوگی، کیوں کہ یہ آسانی کے ساتھ الکتروانوں کو کھوتی ہے۔ ذیل کی جدول میں بعض پہلے مروری دھاتوں کی Standard Electrode Potential، تختیلی تفاوت

(Reduction potential) دی گئی ہے۔

Reaction	Standard reduction potential (V)
$\text{Ti}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Ti}$	1.63
$\text{V}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{V}$	-1.19
$\text{Cr}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cr}$	-0.91
$\text{Mn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Mn}$	-1.18
$\text{Fe}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Fe}$	-0.44
$\text{Co}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Co}$	-0.28
$\text{Ni}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Ni}$	-0.23
$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$	+0.34
$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Zn}$	-0.76





خاکہ (a) 4.7 $\left(E^\circ_{M^{2+}/M}\right)$ -3d series

3d سلسلہ میں جب ہم Ti سے Zn کی طرف چلتے ہیں تو Standard Electrode Potential $\left(E^\circ_{M^{2+}/M}\right)$ کی قیمت کم

منفی ہوتی جاتی ہے اور تانبہ میں مثبت reduction potential پایا جاتا ہے۔ یعنی Cu^{2+} کی بہ نسبت عنصری تانبہ زیادہ مستحکم ہے۔ یہاں پر دو


انحرافات (Deviations) ہیں۔ عام رجحان میں خاکہ 4.7(a) سے پتہ چلتا ہے کہ Mn اور Zn کی $E^0_{M^{2+}/M}$ قیمتیں عام دھاتوں کی بہ نسبت زیادہ منفی ہیں۔ اس کی وجہ Mn^{2+} میں d^5 مدار یوں کا نصف بھرا ہوا ہونا اور Zn^{2+} میں d^{10} مدار یوں کا مکمل بھرا ہوا ہونا ہے۔

اعلیٰ تکسیدی حالت میں مروری دھاتوں کا رجحان تکسیدی ہے۔ مثال کے طور پر Fe^{3+} ایک طاقتور تکسیدی عامل ہے اور یہ Cu کو Cu^{2+} میں تکسید کرتا ہے۔ تعامل کا ممکن ہونا درج ذیل Standard Electrode Potential کی قیمتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔



M^{3+}/M^{2+} نصف خانوں (Half cells) کی Standard Electrode Potential کے درمیان اضافی استحکام (relative stability) کو ظاہر کرتی ہے۔ جدول میں reduction potential کی قیمتیں نیچے دی گئی ہیں۔

Reaction	Standard reduction potential (V)
$Ti^{3+} + e^- \longrightarrow Ti^{2+}$	-0.37
$V^{3+} + e^- \longrightarrow V^{2+}$	-0.26
$Cr^{3+} + e^- \longrightarrow Cr^{2+}$	-0.41
$Mn^{3+} + e^- \longrightarrow Mn^{2+}$	+1.51
$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.77
$Co^{3+} + e^- \longrightarrow Co^{2+}$	+1.81



Vanadium, Titanium اور Chromium کی منفی قیمتیں اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ اعلیٰ تکسیدی حالت زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم ایک مستحکم Cr^{3+} کی تکسید کرنا چاہیں تو ایک طاقتور تھویلی عامل کی ضرورت ہے، جس کی منفی قیمت اتنی کم ہو کہ جیسا کہ دھاتی جست (Zinc)، $-(E^0 = -0.76 V)$

Mn^{3+}/Mn^{2+} کی اعلیٰ تھویلی تفاوت (high reduction potential) اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ Mn^{3+} کی بہ نسبت Mn^{2+} زیادہ مستحکم ہے۔ کے لئے تھویلی تفاوت $0.77 V$ ہے اور یہ ادنیٰ (کم) قیمت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ عام حالات میں Fe^{3+}/Fe^{2+} دونوں مستحکم ہیں۔ Mn سے Fe میں قیمت کے کمی کی وجہ روانوں کی الیکٹرونی ساخت ہے۔ Mn^{3+} کی تشکیل $3d^4$ ہے، جب کہ Mn^{2+} کی تشکیل $3d^5$ ہے۔ نصف بھرتی کردہ d مدار کی وجہ سے Mn^{3+} کی تھویلی ممکن ہو سکتی ہے۔ $(E^0 = +1.51V)$

4.3.6 مقناطیسی خواص (Magnetic Properties)

مروری (عبوری) عناصر کے اکثر مرکبات اکہری مقناطیسیت (paramagnetic) والے ہوتے ہیں۔ مقناطیسی خواص کا تعلق جوہروں کی الیکٹرونی تشکیل سے ہے۔ ہم نے گیارھویں جماعت میں سیکھا ہے کہ الیکٹران، مرکز کے اطراف مداری گردش کے علاوہ اپنے محور پر بھی گردش کر رہے

ہیں۔ ان حرکتوں کی وجہ سے ایک ہلکا سا مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے، اور اس کی پیمائش مقناطیسی معیار اثر (magnetic moment) سے کی جاتی ہے۔ مقناطیسی خواص کی بنیاد پر، اشیاء کو وسیع طور پر (i) اکہرے (یک قطبی) مقناطیس والے (paramagnetic) اور (ii) دوہرے مقناطیسی (دو قطبی) (diamagnetic)، اس کے علاوہ فیرو مقناطیسی (ferromagnetic) اور ضد فیرو مقناطیسی (antimagnetic) اشیاء میں درجہ بندی کی گئی ہے۔

اشیاء جس میں بنیادی مقناطیسی قطبین نہیں ہوتے، وہ diamagnetic کہلاتے ہیں، بہ الفاظ دیگر، اشیاء کی ایسی نوع جس میں تمام جوڑی دار الیکٹران پائے جاتے ہیں، وہ diamagnetic خواص ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اشیاء مقناطیس سے دفع کرتے ہیں، کیوں کہ بیرونی مقناطیسی میدان کی موجودگی میں اس شے میں مقناطیسی امالیت پیدا ہوتی ہے، جو ایک کمزور مقناطیسی میدان پیدا کرتی ہے۔ یہ مقناطیسی میدان، بیرونی مقناطیسی میدان کے خلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دفع کرتے ہیں۔

اکہرے مقناطیسی ٹھوس جس میں غیر جوڑی دار الیکٹران پائے جاتے ہیں، ان میں مقناطیسی قطبین (دوہرا) پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ بیرونی مقناطیسی میدان کی غیر موجودگی میں، وہ قطبین بے ترتیب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹھوس میں مقناطیسیت ظاہر نہیں ہوتی۔ مگر مقناطیسی میدان کی موجودگی میں قطبین، مقناطیسی میدان کی سمت میں متوازی طور پر ترتیب پاتے ہیں، چنانچہ، وہ بیرونی مقناطیسی میدان سے جذب ہو جاتے ہیں۔

فیرو مقناطیسی اشیاء میں غیر مخلوط مقناطیسی علاقہ (Domain structure) پایا جاتا ہے۔ ہر علاقہ میں مقناطیسی قطبین ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر قریبی علاقوں کی گردشی قطبین (Spin dipoles) غیر ترتیب پائے ہوتے ہیں۔ بعض مروری عناصر یا رواں جس میں غیر جوڑی دار d الیکٹران فیرو مقناطیسیت ظاہر کرتے ہیں۔

اکہری مقناطیسی ٹھوس کے 3d مروری دھاتی روانوں میں اکثر مقناطیسی قطبین کا معیار اثر (magnetic dipole moment) پایا جاتا ہے، یہ الیکٹران کی محوری گردش پر منحصر ہے۔ مدار یہ کی معیار حرکت L اس سے کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رواں کا مقناطیسی معیار اثر اس طرح دیا گیا ہے۔

$$\mu = g \sqrt{S(S+1)} \mu_B$$

جس میں S، غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کا جملہ قدریہ عدد (quantum number) ہے اور μ_B Bohr Magneton ہے
n غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کے ایک رواں کے لئے $S = n/2$ ہے اور ایک الیکٹران کے لئے $g = 2$ ہے۔
چنانچہ صرف محوری گردش مقناطیسی معیار اثر، اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\mu = 2 \sqrt{\left(\frac{n}{2}\right)\left(\frac{n}{2} + 1\right)} \mu_B$$

$$\mu = 2 \sqrt{\left(\frac{n(n+2)}{4}\right)} \mu_B$$

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$$

اوپر دی گئی مساوات کے ذریعہ مقناطیسی معیار اثر کو محسوب کیا جاسکتا ہے، اس کو تجرباتی قیمتوں کے ساتھ موازنہ کیا جاسکتا ہے، جو جدول میں دئے گئے ہیں۔ اکثر صورتوں میں، موازنہ ٹھیک ثابت ہوا ہے۔


Ion رواں	Configuration تشکیل	n	$\mu = \sqrt{n(n+2)} \mu_B$	μ (observed)
Sc ³⁺ , Ti ⁴⁺ , V ⁵⁺	d ⁰	0	$\mu = \sqrt{0(0+2)} = 0 \mu_B$	diamagnetic
Ti ³⁺ , V ⁴⁺	d ¹	1	$\mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.73 \mu_B$	1.75
Ti ²⁺ , V ³⁺	d ²	2	$\mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83 \mu_B$	2.76
Cr ³⁺ , Mn ⁴⁺ , V ²⁺	d ³	3	$\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87 \mu_B$	3.86
Cr ²⁺ , Mn ³⁺	d ⁴	4	$\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.89 \mu_B$	4.80
Mn ²⁺ , Fe ³⁺	d ⁵	5	$\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.91 \mu_B$	5.96
Co ³⁺ , Fe ²⁺	d ⁶	4	$\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.89 \mu_B$	5.3-5.5
Co ²⁺	d ⁷	3	$\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87 \mu_B$	4.4-5.2
Ni ²⁺	d ⁸	2	$\mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83 \mu_B$	2.9-3.4
Cu ²⁺	d ⁹	1	$\mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.732 \mu_B$	1.8-2.2
Cu ⁺ , Zn ²⁺	d ¹⁰	0	$\mu = \sqrt{0(0+2)} = 0 \mu_B$	diamagnetic

4.3.7 تھامسی خواص (Catalytic properties)

کیمیائی صنعتیں کئی قسم کے حاصلات تیار کرتے ہیں، جیسے کثیر ترکیبے (polymers)، خوشبودار اشیاء، ادویات وغیرہ۔ تیاری کے دوران اکثر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جس کا الٹا اثر ماحول پر پڑتا ہے۔ اس لئے تیاری کے دوران ایسے طریقوں کو اپنانا چاہئے جو ماحول دوست ہوں۔ اس پس منظر میں تھامسی عامل (Catalyst) کی بنیاد پر تیاری کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، جو کم توانائی حاصل کرتے ہیں، کم فضول اشیاء خارج کرتے ہیں اور متعلقات سے حاصلات کو فوری تبدیل کرتے ہیں۔

اکثر کیمیائی طریقے مروری (عبوری) عناصر یا ان کے مرکبات کو تھامسی عامل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مروری عناصر میں توانائی والے d مدار پر پائے جاتے ہیں، جو متعلقات کے سالموں سے الیکٹران حاصل کرتے ہیں یا، دھات کے ساتھ بندش بناتے ہیں۔ یہ d مدار پر الیکٹران ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک الکیلین کی تھامسی ہائیڈروجننا (Catalytic hydrogenation) کے دوران تھامسی عامل کے خالی d مداروں کے ساتھ الکیلین اپنے π الیکٹرانوں کے ساتھ فعال مقام پر بندش بناتا ہے۔


ہائیڈروجن کے سالمے کی σ بندش ٹوٹی ہے، اور ہر ایک ہائیڈروجن، تھامسی عامل کے ایک جوہر کے d الیکٹران کے ساتھ ایک بندش بناتا ہے۔ ہائیڈروجن کے دو جوہر اس کے بعد جزوی طور پر الکیلین (alkene) کے ٹوٹے ہوئے π بندش کے ساتھ مل کر الکیلین (alkane) بناتے ہیں۔




بعض تھامسی کارروائیوں میں، مروری دھاتوں کی متغیر تکسیدی حالتیں، استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر SO₃ سے سلفیورک ترشہ کی تیاری کے دوران، Vanadium Pentoxide (V₂O₅) کو SO₂ کی تکسید کے لئے بطور تھامسی عامل استعمال ہوتا ہے۔ اس تعامل کے دوران

V_2O_5 تھویل پا کر Vanadium (IV) Oxide (VO_2) بن جاتا ہے۔
بعض مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

(i) olefins کا hydroformulation ہوتا




(ii) Acetaldehyde سے Acetic acid کی تیاری



(iii) Ziegler-Natta تھاسی عامل

یہ $TiCl_4$ اور Trialkyl aluminium کا آمیزہ ہے اور اسے کثیر ترکیبی عمل (polymerisation) میں استعمال کیا جاتا ہے۔



4.3.8 بھرت کا بننا (Alloy formation)

ایک یا اس سے زیادہ عناصر کو پگھلانے سے بھرت بنتے ہیں۔ یہ عناصر دھات یا دھاتوں ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مقدار کی دھات محلل (Solvent) کہلاتی ہے اور کم مقدار میں استعمال ہونے والی منحل (Solute) کہلاتی ہے۔ Hume-Rothery rule کے مطابق ایک بھرت کے لئے محلل اور منحل کے جوہری نصف قطروں کا فرق 15% سے کم ہو۔ محلل اور منحل کے قلموں کی جسامت یکساں ہو اور برق منفیت کا فرق صفر کے قریب ہو۔ مروجہ دھاتیں جو ان شرائط کو پوری کرتے ہوں، اپنے اندر کئی بھرتیں بناتے ہیں۔ چونکہ ان کے جوہری جسامت مشابہ ہیں اور ایک دھاتی جوہر آسانی کے ساتھ دوسری دھات کے جوہر کی قلمی جالی میں تبادلہ کر کے بھرت بناتے ہیں۔ ایسے بننے والی بھرتیں سخت ہوتی ہیں اور ان کا نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثالیں: فیرس کی بھرتیں، سونے-تانبے، کروم کی دھاتیں وغیرہ۔

4.3.9 بین خلوی مرکبات کا بننا (Formation of interstitial compounds)

جب ہائیڈروجن، بوران، کاربن یا نائٹروجن جیسے چھوٹے جوہر، دھاتی جالی کے بین خلوی سوراخوں (interstitial holes) میں قائم ہوتے ہیں تو ایک بین خلوی مرکب یا دھات بنتی ہے۔ عام طور پر یہ غیر تناسب پیمائی (non-stoichiometric) کے مرکبات ہوتے ہیں۔ مروجہ دھاتیں بے حساب بین خلوی مرکبات بناتے ہیں۔ جیسے Mn_4N ، $ZrH_{1.92}$ ، TiC وغیرہ۔ وہ عناصر جو دھاتی جالی پر قائم ہوتے ہیں، نئے خواص دیتے ہیں۔

- (i) وہ سخت ہوتے ہیں اور ان میں برقی اور حرارتی ایصال پایا جاتا ہے۔
- (ii) ان کا نقطہ پگھلاؤ، ان کے خالص دھاتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

(iii) مروری دھاتوں کے ہائڈرائڈ طاقتور تجویلی عامل کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔

(iv) دھاتی کاربائیڈ کیمیائی طور پر جامد (inert) ہوتے ہیں۔

4.3.10 کمپلکسوں کا بننا (Formation of complexes)

مروری عناصر میں کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات بننے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس میں ایسی نوع پائی جاتی ہے جو الیکٹرانوں کی ایک جوڑی عطا کر کے ہم ربط بندش (coordinate covalent compound) بنا سکتا ہے۔ مروری دھاتی رواں چھوٹے اور اعلیٰ بار بردار ہوتے ہیں اور ان کے نچلے توانائی کے مدار یہ خالی ہوتے ہیں تاکہ دیگر گروپ کے عطا کردہ الیکٹرانوں کی جوڑی حاصل کر سکے۔ ان خواص کی وجہ سے مروری دھاتیں، کئی کمپلکس بناتے ہیں۔ مثالیں: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ، $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ وغیرہ۔

4.4 مروری عناصر کے اہم مرکبات (Important compounds of transition elements)


دھاتوں کے Oxianions اور Oxides

عام طور پر مروری دھاتیں، سالماتی آکسیجن کے ساتھ اعلیٰ تپش پر تعامل کر کے دھاتی آکسائیڈ بناتے ہیں۔ سوائے 3d سلسلہ کے پہلے ممبر Scandium کے تمام دیگر مروری عناصر روانی دھاتی آکسائیڈ بناتے ہیں۔ دھاتی آکسائیڈ میں دھاتوں کا تکسیدی عدد +2 سے +7 تک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کسی دھات کا تکسیدی عدد بڑھتا ہے، اس کی روانی خاصیت کم ہوتے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر Mn_2O_7 ہم گرفتہ (Covalent) ہے۔ اکثر اعلیٰ آکسائیڈ اپنی نوعیت میں ترشوی ہیں۔ Mn_2O_7 پانی میں حل ہو کر permanganic acid (HMnO_4) دیتا ہے۔ اسی طرح CrO_3 ، کرومک ترشہ (H_2CrO_4) اور ڈی کرومک ترشہ ($\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) دیتا ہے۔ عام طور پر ادنیٰ آکسائیڈ، دوہری نوعیت والے (amphoteric) یا اساسی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرومیم (III) آکسائیڈ Cr_2O_3 کی نوعیت دوہری ہے اور کرومیم (II) کی نوعیت اساسی ہے۔


پوٹاشیم ڈی کرومیٹ Potassium dichromate $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

تیاری Preparation

کرومیٹ کی کچھ دھات سے پوٹاشیم ڈی کرومیٹ تیار کیا جاتا ہے۔ تجاذبی علیحدگی (gravity separation) سے کچھ دھات کا ارتکاز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے افزود (excess) سوڈیم کاربونیٹ اور چونے کے ساتھ شامل کر کے reverboratory furnace میں بھونا جاتا ہے۔




بھونی ہوئی کچھ دھات کو پانی میں حل کرنے سے نائل پذیر iron oxide الگ ہو جاتا ہے اور حل پذیر sodium chromate الگ ہو جاتا ہے۔ سوڈیم کرومیٹ کے زرد محلول کو مرکنز سلفیورک ترشہ کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے جو سوڈیم کرومیٹ کو سوڈیم ڈی کرومیٹ میں تبدیل کر دیتا ہے۔






حاصل کردہ محلول کو مرکنز کر کے کم حل پذیر سوڈیم سلفیٹ کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ حاصل ہونے والے محلول کی تقطیر کی جاتی ہے اور مزید مرکنز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا کرنے سے $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ کی قلمیں جدا ہوتی ہیں۔

سوڈیم ڈی کرومیٹ کے سیر شدہ (saturated) آبیدہ محلول میں KCl شامل کیا جاتا ہے اور مزید مرکنز کر کے NaCl کی قلمیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اسے تقطیر کیا جاتا ہے اور گرم محلول (مقطر) کو ٹھنڈا کرنے سے $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ کی قلمیں حاصل ہوتی ہیں۔



طبیعی خواص (Physical properties)

Potassium dichromate ایک نارنجی سرخ قلمی ٹھوس ہے، جو 671 K پر پگھلتا ہے اور یہ ٹھنڈے پانی میں کم حل پذیر ہے۔ مگر یہ گرم پانی میں اعلیٰ حل پذیر ہے۔ گرم کرنے سے یہ تحلیل پا کر Cr_2O_3 اور سالماتی آکسیجن بن جاتا ہے۔ چونکہ گرم کرنے پر یہ کرومیم کے زہریلے بخارات خارج کرتا ہے، اس کے بجائے سوڈیم ڈی کرومیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔




کرومیٹ اور ڈی کرومیٹ دونوں رواں کرومیم کے oxo ions (آکسورواں) ہیں اور وہ طاقتور تھکیدی عامل ہیں۔ ان رواںوں میں کرومیم کی تھکیدی حالت +6 ہے۔ آبی محلول میں کرومیٹ اور ڈی کرومیٹ رواں رد و بدل ہو سکتے ہیں اور قلعوی محلول میں کرومیٹ کے رواں پہلے تھکید پاتے ہیں، جب کہ ترشوی محلول میں ڈی کرومیٹ کے رواں پہلے تھکید پاتے ہیں۔ ان رواںوں کی ساختیں درج ذیل خاکہ میں بتائی گئی ہیں۔

کیمیائی خواص (Chemical properties)


1- تھکید (Oxidation)

ترشوی حالت میں potassium dichromate ایک طاقتور تھکیدی عامل ہے۔ H^+ رواںوں کی موجودگی میں اس کا تھکیدی عمل نیچے دیا گیا ہے۔ تم یہ غور کرو گے کہ کرومیم کی تھکیدی حالت Cr^{6+} سے Cr^{3+} ہو جاتی ہے۔ اس کا تھکیدی عمل درج ذیل ہے۔




درج ذیل مثالوں میں پوٹاشیم ڈی کرومیٹ (ڈی کرومیٹ کے رواں) کی تھکیدی نوعیت کی وضاحت کی گئی ہے۔


(i) یہ فیرس کے نمکوں کو تھسید کر کے فیرک کے نمکوں میں تبدیل کرتا ہے۔




(ii) یہ ایوڈائنڈ کے روائوں کو تھسید کر کے ایوڈین میں تبدیل کرتا ہے۔




(iii) یہ سلفائڈ کے روائوں کو تھسید کر کے سلفر میں تبدیل کرتا ہے۔




(iv) یہ سلفر ڈی آکسائیڈ کے روائوں کو تھسید کر کے سلفیٹ کے روائوں میں تبدیل کرتا ہے۔



(v) یہ اسٹانس کے نمکوں کو تھسید کر کے اسٹانک کے نمکوں میں تبدیل کرتا ہے۔



(vi) یہ الکل کو ترشوں میں تھسید کرتے ہیں۔




2- کرومیل کلورائیڈ کی جانچ (Chromyl chloride test)

جب potassium dichromate کو مرکب H_2SO_4 کی موجودگی میں کسی بھی کلورائیڈ کے نمک کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو کرومیل کلورائیڈ (CrO_2Cl_2) کے نارنجی بخارات خارج ہوتے ہیں۔ اس تعامل کو کلورائیڈ روائ کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لئے inorganic qualitative analysis میں استعمال کیا جاتا ہے۔



کرومیل کلورائیڈ کے بخارات کو سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول میں حل کیا جاتا ہے اور اسپیٹک ترشہ کے ساتھ ترشایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں لیڈ آکسائیڈ شامل کیا جاتا ہے تو Lead chromate کا ایک زرد رسوب (precipitate) حاصل ہوگا۔



پوٹاشیم ڈی کرومیٹ کے استعمالات: پوٹاشیم ڈی کرومیٹ کے بعض اہم استعمالات درج ذیل ہیں۔

- 1- اسے طاقتور تھسیدی عامل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- اس کو رنگ کاری (dyeing) اور پرنٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- اس کو چمڑے کی دباغت میں (Chrome tanning) میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 4- اس کو quantitative analysis میں لوہے کے مرکبات اور ایوڈائنڈ کی جانچ میں استعمال کیا جاتا ہے۔


پوٹاشیم پرمانگنیٹ (Potassium permanganate) KMnO_4

تیاری (Preparation)

پیرولوسائٹ (MnO_2) کچھ دھات سے پوٹاشیم پرمانگنیٹ تیار کیا جاتا ہے۔ درج ذیل مرحلوں میں اس کی تیاری کی جاتی ہے۔


(i) MnO_2 سے پوٹاشیم مانگنیٹ میں تبدیلی

کچھ دھات کے سفوف کو ہوا یا KNO_3 یا KClO_3 جیسے تفسیدی عوامل کی موجودگی میں KOH کے ساتھ پگھلایا جاتا ہے۔ سبز رنگ کا پوٹاشیم مینگنیٹ حاصل ہوتا ہے۔





(ii) پوٹاشیم مینگنیٹ کی تفسید سے پوٹاشیم پرمینگنیٹ حاصل کرنا

اوپر کے تعامل سے حاصل ہونے والے پوٹاشیم مینگنیٹ کو دو طریقوں سے تفسید کی جاسکتی ہے۔ کیمیائی تفسید یا برق پاشیدہ تفسید۔




برق پاشیدہ تفسید (electrolytic oxidation)


اس طریقہ میں تھوڑے مقدار کے قلی (alkali) کی موجودگی میں پوٹاشیم مینگنیٹ کے آبی محلول کی برق پاشیدگی کی جاتی ہے۔



مثیرہ (اینوڈ) (Anode) پر مینگنیٹ کے رواں، پرمینگنیٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔



منفیرہ (کیٹھوڈ) (cathode) پر ہائڈروجن خارج ہوتی ہے۔



قرمزی (purple) رنگ کے محلول کی تبخیر سے مرکنز کر کے ٹھنڈا کرنے پر پوٹاشیم پرمانگنیٹ کی قلمیں حاصل ہوتی ہیں۔


طبیعی خواص (Physical properties)

Potassium permanganate، گہرے قرمزی رنگ (dark Purple) کی قلمیں ہیں، جو 513 K پر پگھلتی ہیں۔ یہ ٹھنڈے پانی

میں کم حل پذیر ہے، اور گرم پانی میں ایک حد تک حل پذیر ہے۔

permangante ion کی ساخت


پرمنگنیٹ کے رواں کی ساخت چار سطحی (tetrahedral) ہے، جس میں مرکزی Mn^{7+} ، sp^3 قسم میں مخلوط ہے۔



کیمیائی خواص : (Chemical properties)



1- گرم کرنا (action of heat)

جب پوٹاشیم پرمنگنیٹ کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ تحلیل پا کر پوٹاشیم مینگنیٹ اور Manganese dioxide میں تبدیل ہو جاتا ہے۔



2- مرتکز H_2SO_4 کے ساتھ تعامل

ٹھنڈے مرتکز H_2SO_4 کے ساتھ یہ تحلیل پا کر manganese heptoxide بن جاتا ہے۔ یہ تحلیل دھماکہ خیز ہوتی ہے۔



مگر گرم مرتکز H_2SO_4 کے ساتھ پوٹاشیم پرمنگنیٹ، $MnSO_4$ دیتا ہے۔




3- تفسیدی خاصیت (Oxidising property)

potassium permanganate ایک طاقتور تفسیدی عامل ہے۔ اس کا تفسیدی عمل، مختلف نوعیت میں مختلف ہوتا ہے۔

(a) تعدیلی نوعیت (واسطہ) میں (In neutral medium)


تعدیلی نوعیت (واسطہ) میں یہ تحلیل پا کر MnO_2 بن جاتا ہے۔



(i) یہ H_2S کو Sulphur میں تفسید کرتا ہے۔




(ii) یہ thiosulphate کو sulphate میں تفسید کرتا ہے۔




(b) قلعوی نوعیت (واسطہ) میں


قلعوی دھاتی ہائڈراکسائیڈ کی موجودگی میں، permanganate ion کو manganate میں تبدیل کرتا ہے۔



اس manganate کو بعض تجویلی عاملوں کے استعمال سے MnO_2 میں مزید تجویل کیا جاتا ہے۔



چنانچہ جملہ تعامل کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے




یہ تعامل تعدیلی واسطہ کے مشابہ ہے۔

Baeyer کا تعامل گر (Baeyer's reagent):


ٹھنڈا ہلکا یا ہوا قلعوی KMnO_4 (Cold dilute alkaline) بیڑ کا تعامل گر کہلاتا ہے۔ Alkenes کی تکسیدی سے diols بنانے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر Ethylene کو ethylene glycol میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور اس تعامل کو غیر سیر شدہ (unsaturation) کی جانچ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(c) ترشوی واسطہ میں (in acidic medium)


ہلکائے ہوئے سلفیورک ترشہ کی موجودگی میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ، ایک طاقتور تکسیدی عامل کے طور پر عمل کرتا ہے۔ پرمینگنیٹ کا رواں، Mn^{2+} میں تبدیل ہو جاتا ہے۔




ترشوی واسطہ میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ کی تکسیدی نوعیت کی وضاحت درج ذیل مثالوں کے ساتھ دی جاتی ہے۔
(i) یہ فیرس کے نمکوں کو تکسید کر کے فیرک کے نمکوں میں تبدیل کرتا ہے۔




(ii) یہ ایوڈائیڈ کے روانوں کو تکسید کر کے ایوڈین میں تبدیل کرتا ہے۔




(iii) یہ آکسائلک ترشہ کو CO_2 میں تبدیل کرتا ہے۔




(iv) یہ سلفائیڈ کے روانوں کو تکسید کر کے سلفر میں تبدیل کرتا ہے۔




(v) یہ Nitrites کو Nitrates میں تکسید کرتا ہے۔



(vi) یہ الکحل کو الڈی ہائڈ میں تکسید کرتا ہے۔




(vii) یہ Sulphite کو sulphate میں تکسید کرتا ہے۔



پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے استعمالات :

- 1- اس کو ایک طاقتور تھویلی عامل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- 2- جلد کے مختلف تعفن (infection) میں اور پیروں کے فنجی کے تعفن (fungal infection) کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 3- کنویں کے پانی میں موجود لوہا اور ہائڈروجن سلفائیڈ کو خارج کرنے کے لئے اسے پانی صاف کرنے کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- 4- نامیاتی مرکبات میں غیر سیر شدہ (unsaturation) کی جانچ کے لئے اسے بطور Bayer's reagent استعمال کیا جاتا ہے۔
- 5- Quantitative analysis کے دوران Ferrous salts, oxalates, hydrogen peroxide اور iodides کے estimation میں استعمال کیا جاتا ہے۔

غور کیجئے: ترشوی واسطہ تیار کرنے کے لئے HCl کو استعمال نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ KMnO_4 کے ساتھ HCl اس طرح تعامل کرتا ہے۔



اسی طرح HNO_3 بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے، یہ ایک بہترین تکسیدی عامل ہے اور تعامل کے دوران تھویلی عامل کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس لئے H_2SO_4 کو بہتر طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے، چونکہ یہ پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے ساتھ تعامل نہیں کرتا۔

غور کیجئے:

$$\begin{aligned} \text{ترشوی واسطہ میں } \text{KMnO}_4 \text{ کا معادل وزن} &= \frac{\text{KMnO}_4 \text{ کا سالمی وزن}}{\text{الکٹران کے تبادلہ کے مول کی تعداد}} = \frac{158}{5} = 31.6 \\ \text{اساسی واسطہ میں } \text{KMnO}_4 \text{ کا معادل وزن} &= \frac{\text{KMnO}_4 \text{ کا سالمی وزن}}{\text{الکٹران کے تبادلہ کے مول کی تعداد}} = \frac{158}{1} = 158 \\ \text{تعدیلی واسطہ میں } \text{KMnO}_4 \text{ کا معادل وزن} &= \frac{\text{KMnO}_4 \text{ کا سالمی وزن}}{\text{الکٹران کے تبادلہ کے مول کی تعداد}} = \frac{158}{3} = 52.67 \end{aligned}$$

f- بلاک عناصر - اندرونی مروری (عبوری) عناصر

اندرونی مروری عناصر میں، عناصر کے دو سلسلے پائے جاتے ہیں۔

(1) Lanthanoids (پہلے Lanthanides کہلاتے تھے)

(2) Actinoids (پہلے Actinides کہلاتے تھے)

Lanthanoid کے سلسلہ میں Lanthanum (57La) کے بعد Cerium (58Ce) سے Letutium (71Lu) تک 14

عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کے 4f مدار یہ ترتیبی طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح Actinoid کے سلسلہ میں Actinium

(89Ac) کے بعد Thorium (90Th) سے Lawrencium (103Lr) تک 14 عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان عناصر کے 5f مدار یہ

ترتیبی طور پر بھرے ہوئے ہیں۔

دوری جدول میں Lanthanoids کا مقام

دوری جدول میں Lanthanoids کا اصلی مقام گروپ نمبر 3 اور دَور نمبر 6 ہے۔ جب کہ 6 ویں دَور میں Lanthanum کے بعد

بھرتی ہونا Cerium (Ce) سے شروع ہوتا ہے اور اس کی برقیاتی تشکیل $[Xe] 4f^1 5d^1 6s^2$ ہے۔ جب ہم Cerium سے بعد کے عناصر کی طرف چلتے ہیں تو اس کے بعد کے الیکٹران $4f$ میں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ جدول میں دکھایا گیا ہے۔

جدول : Lanthanum اور Lanthanoids کی الیکٹران تشکیل



غیر کا نام	جوہری عدد	علامت	الیکٹران تشکیل
Lanthanum	57	La	$[Xe] 4f^0 5d^1 6s^2$
Cerium	58	Ce	$[Xe] 4f^1 5d^1 6s^2$
Praseodymium	59	Pr	$[Xe] 4f^3 5d^0 6s^2$
Neodymium	60	Nd	$[Xe] 4f^4 5d^0 6s^2$
Promethium	61	Pm	$[Xe] 4f^5 5d^0 6s^2$
Samarium	62	Sm	$[Xe] 4f^6 5d^0 6s^2$
Europium	63	Eu	$[Xe] 4f^7 5d^0 6s^2$
Gadolinium	64	Gd	$[Xe] 4f^7 5d^1 6s^2$
Terbium	65	Tb	$[Xe] 4f^9 5d^0 6s^2$
Dysprosium	66	Dy	$[Xe] 4f^{10} 5d^0 6s^2$
Holmium	67	Ho	$[Xe] 4f^{11} 5d^0 6s^2$
Erbium	68	Er	$[Xe] 4f^{12} 5d^0 6s^2$
Thulium	69	Tm	$[Xe] 4f^{13} 5d^0 6s^2$
Ytterbium	70	Yb	$[Xe] 4f^{14} 5d^0 6s^2$
Lutetium	71	Lu	$[Xe] 4f^{14} 5d^1 6s^2$

Gadolinium (Gd) میں $4f$ مدار پر نصف بھرتی شدہ اور Lutetium (Lu) میں مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا $4f$ سلسلہ

کی عام الیکٹران تشکیل کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔ $[Xe] 4f^{1-14} 5d^{0-1} 6s^2$

Lanthanoids کی تکسیدی حالت

Lanthanoids کی عام تکسیدی حالت +3 ہے۔ اس کے ساتھ بعض Lanthanoids میں +2 یا +3 تکسیدی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ Gd^{3+} اور Lu^{3+} کے روانوں میں زیادہ استحکام (stability) پایا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے مدار پر بالترتیب ٹھیک نصف بھرے ہوئے اور مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی الیکٹران تشکیل اس طرح سے ہے۔




اسی طرح +4 تکسیدی حالت میں Cerium (Ce) اور Terbium ، $4f^0$ اور $4f^7$ کی تشکیل پاتے ہیں۔

Eu^{3+} اور Yb^{3+} کے رواں بھی بالترتیب ٹھیک نصف بھرے ہوئے اور مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں۔

مختلف تکسیدی حالتوں میں استحکام (Stability) کا اثر ان عناصر کے کیمیائی خواص پر پڑتا ہے۔ درج ذیل جدول Lanthanoids کی مختلف تکسیدی حالتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		+2		+2	+2						+2	+2	
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
+4	+4	+4					+4	+4					



جوہری اور روانی نصف قطر میں :

جب ہم 4f سلسلے سے گزرتے ہیں تو جوہری عدد کے اضافہ کے ساتھ Lanthanoids کے جوہری اور روانی نصف قطر میں، آہستہ سے گھٹتے جاتے ہیں۔ روانی جسامت کے اس گھٹنے کو Lanthanoid contraction کہتے ہیں۔

Lanthanoid contraction کا سبب

جب ہم 4f سلسلے میں ایک عنصر سے دوسرے عنصر کی طرف (Ce سے Lu) چلتے ہیں تو اسی اندرونی 4f مدار میں ایک الیکٹران کے اضافہ کے ساتھ ساتھ، اس کے مرکزی بار (nuclear charge) میں ایک اکائی کا اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 4f مدار میں ایک الیکٹران کی ساخت رکھتا ہے۔ اس لئے 4f الیکٹرانوں میں ڈھال نما اثر Shielding effect کمزور ہوتا ہے۔ لہذا مرکزی بار کے بڑھنے سے گرتی مدار میں مرکزہ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4f الیکٹرانوں کا جملہ مرکزی بار بڑھتا ہے اور Ln^{3+} رواں کی جسامت کم ہونے لگتی ہے۔ مختلف Lanthanoids کے سکیر کو درج ذیل ترتیب میں بتایا گیا ہے۔

Lanthanoid contraction کا نتیجہ

1۔ اساسیت میں فرق: (Basicity differences)

جب ہم Ce سے Lu کی طرف چلتے ہیں تو Ln^{3+} رواں کی اساسی خاصیت کم ہوتی جاتی ہے۔ Ln^{3+} رواں کی جسامت کی کمی کی وجہ سے Ln-OH بندش کی روانی خصوصیت کم ہو جاتی ہے۔ (ہم گرفتہ خاصیت بڑھ جاتی ہے)۔ اس کی وجہ سے اساسیت میں کمی آتی ہے۔

2۔ Lanthanoids میں مشابہت

پورے f سلسلے میں جوہری نصف قطر میں صرف 10 pm کی کمی اور روانی نصف قطر میں 20 pm کم کی مشاہدہ کیا گیا۔ Lanthanoids کے نصف قطروں کی اس چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے، ان کے کیمیائی خواص تقریباً مشابہ ہیں۔

تیسرے اور چوتھے مروری سلسلہ کے کیمیائی خواص، پہلے اور دوسرے مروری سلسلے کے مقابلے میں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر

سلسلہ	عنصر	جوہری نصف قطر
3d Series	Ti	132 pm
4d Series	Zr	145 pm
5d Series	Hf	144 pm

Actinoids

Actinium کے بعد کے 14 عناصر، یعنی thorium (Th) سے Lawrencium (Lr) تک Actinoids کہلاتے ہیں۔ Lanthanoids کے مقابلے میں تمام Actinoids تابکار (radioactive) ہیں اور ان میں سے اکثر کی نصف مدت حیات بہت کم ہے۔ صرف Thorium (Th) اور Uranium (U) قدرت میں کچھ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یورینیم کی کچھ دھات میں بالکل ہی کم مقدار میں Plutonium (Pu) پائی جاتی ہے۔ Neptunium (Np) اور اس کے بعد کے عناصر مرکزائی تعاملات کے دوران قدرتی طور پر حاصل ہونے والے عناصر کے مصنوعی تغلب (artificial transformation) کے ذریعہ مصنوعی طور پر تیار کئے جاتے ہیں۔ Lanthanoids ہی کی طرح Actinoids بھی دوری جدول میں نیچے کی جانب رکھے گئے ہیں۔

الکٹرائی تشکیل (Electronic configuration)

Actinoids کی الکٹرائی تشکیل واضح نہیں ہے۔ 5f کے عناصر کی عام گزشتہ خول کی الکٹرائی تشکیل $[Rn] 5f^{0-14} 6d^{0-1} 7s^2$ ہے۔ درج ذیل جدول Actinoids کی الکٹرائی تشکیل کو ظاہر کرتی ہے۔

جدول: Actinoids کی الکٹرائی تشکیل

عنصر کا نام	جوہری عدد	علامت	الکٹرائی تشکیل
Actinium	89	Ac	$[Rn] 5f^0 6d^1 7s^2$
Thorium	90	Th	$[Rn] 5f^0 6d^2 7s^2$
Protactinium	91	Pa	$[Rn] 5f^2 6d^1 7s^2$
Uranium	92	U	$[Rn] 5f^3 6d^1 7s^2$
Neptunium	93	Np	$[Rn] 5f^4 6d^1 7s^2$
Plutonium	94	Pu	$[Rn] 5f^6 6d^0 7s^2$
Americium	95	Am	$[Rn] 5f^7 6d^0 7s^2$
Curium	96	Cm	$[Rn] 5f^7 6d^1 7s^2$
Berkelium	97	Bk	$[Rn] 5f^9 6d^0 7s^2$
Californium	98	Cf	$[Rn] 5f^{10} 6d^0 7s^2$

غضر کا نام Name of the element	جوہری عدد Atomic number	علامت Symbol	الکٹران تشکیل Electronic configuration
Einsteinium	99	Es	[Rn] 5f ¹¹ 6d ⁰ 7s ²
Fermium	100	Fm	[Rn] 5f ¹² 6d ⁰ 7s ²
Mendelevium	101	Md	[Rn] 5f ¹³ 6d ⁰ 7s ²
Nobelium	102	No	[Rn] 5f ¹⁴ 6d ⁰ 7s ²
Lawrentium	103	Lr	[Rn] 5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²

Actinoids کی تسکیدی حالت

Lanthanoids ہی کی طرح اکثر Actinoids کی عام تسکیدی +3 ہے۔ ان کے علاوہ، Actinoids متغیر تسکیدی حالتیں رکھتے ہیں۔ +2، +3، +4، +5، +6 اور +7۔

Americium (Am) اور Thorium (Th) ان کے بعض مرکبات میں +2 تسکیدی حالت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر Thorium Iodide (ThI₂) - Pu، Np، U، Pa، Th عناصر +5 تسکیدی حالت رکھتے ہیں، Np اور Pu +7 تسکیدی حالت رکھتے ہیں۔

Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
+2					+2								
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4						
+5	+5	+5	+5	+5	+5								
		+6	+6	+6	+6								
			+7	+7	+7								

Lanthanoids اور Actinoids کے درمیان فرق

شمار عدد	لینتھانائیڈس	آکٹی نائیڈس
1	الکٹران 4f مدارے میں داخل ہوتے ہیں۔	الکٹران 5f مدارے میں داخل ہوتے ہیں۔
2	4f مداروں کی بندشی توانائی زیادہ ہوتی ہے۔	5f مداروں میں بندشی توانائی کم ہوتی ہے۔
3	ان میں کمپلکس بننے کا رجحان کم پایا جاتا ہے۔	ان میں کمپلکس بننے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔
4	اکثر Lanthanoids بے رنگ ہوتے ہیں۔	اکثر Actinoids رنگین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر U ³⁺ (سرخ)، U ⁴⁺ (سبز)، UO ₂ ²⁺ (زرد)

یہ oxo cations نہیں بناتے۔	یہ NpO_2^{2+} ، UO_2^{2+} جیسے Oxo cations بناتے ہیں۔	5
+3 تکسیدی حالت کے علاوہ Lanthanoids ، +2 اور +4 تکسیدی حالتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔	بعض جگہ +3 تکسیدی حالت کے علاوہ Actinoids ، بعض جگہ +4 +5 ، +6 اور +7 جیسی اعلیٰ تکسیدی حالتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔	6

خلاصہ

❖ IUPAC کے مطابق عبوری (مروری) عناصر وہ ہیں جن کے d اور f مداروں میں نامکمل الیکٹران پائے جاتے ہوں یا وہ اپنے الیکٹرانوں کو کھو کر مشرواں (Cation) دیتے ہیں۔ دوری جدول کی مرکزی مقام پر قائم ہیں۔

❖ d بلاک عناصر میں 3d سلسلہ (چوتھے دور) Scandium سے Zinc تک (10 عناصر)، 4d سلسلہ (پانچویں دور) Yttrium سے Cadmium تک (10 عناصر)، 5d سلسلہ (چھٹویں دور) Lanthanum ، Haffnium سے Mercury تک۔

❖ d بلاک عناصر کی عام الیکٹران کی تشکیل اس طرح لکھی جاسکتی ہے۔ $[\text{Noble gas}](n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$ ۔ یہاں پر n کی قیمت 4 سے 7 تک ہے۔

چھٹویں اور ساتویں دور میں (سوائے La اور Ac کے) الیکٹران کی تشکیل اس طرح لکھی جاسکتی ہے۔

$$(n-2)f \text{ orbital} ; [\text{Noble gas}](n-2)f^{1-14}(n-1)d^{1-10}ns^{1-2}$$

❖ تمام مروری عناصر دھاتیں ہیں۔ تمام دھاتوں کی طرح مروری دھاتیں بھی حرارت اور بجلی کے اچھے موصل ہیں۔

❖ گروپ 1 اور گروپ 2 کے سوا اور گروپ نمبر 11 کے سوا تمام دھاتیں سخت ہیں۔

❖ جب ہم مروری سلسلہ میں بائیں سے دائیں کی طرف گزرتے ہیں تو چونکہ دھاتی بندش کے لئے غیر جوڑی دار d الیکٹرانوں کی تعداد بڑھتی ہے، اس لئے نقطہ پگھلاؤ پہلے بڑھتا ہے، اپنی انتہائی قیمت تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر d الیکٹران جوڑی دار ہوتے ہیں اور بندش کے لئے کم دستیاب ہوتے ہیں۔

❖ مروری (عبوری) عناصر کی روانی توانائی کی قیمت s اور p بلاک عناصر کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم مروری دھاتی سلسلہ میں بائیں سے دائیں کی طرف آتے ہیں تو روانی انتھالپی بڑھتی ہے، جیسا کہ توقع کیا گیا۔

❖ 3d سلسلہ میں جب ہم Ti سے Zn کی طرف چلتے ہیں تو Standard Electrode Potential

$$\left(E^0_{M^{2+}/M} \right) \text{ کی قیمت کم منفی ہوتی جاتی ہے اور تانبہ میں مثبت reduction potential پایا جاتا ہے۔}$$

یعنی Cu^{2+} کی بہ نسبت عنصری تانبہ زیادہ مستحکم ہے۔

- ❖ مروری (عبوری) عناصر کے اکثر مرکبات اکہری مقناطیسیت (paramagnetic) والے ہوتے ہیں۔
مقناطیسی خواص کا تعلق جوہروں کی الکٹرائی تشکیل سے ہے۔
- ❖ اکثر کیمیائی طریقے مروری (عبوری) عناصر یا ان کے مرکبات کو تہاسی عامل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
مروری عناصر میں توانائی والے d مدار یہ پائے جاتے ہیں، جو معاملات کے سالموں سے الکٹران حاصل کرتے ہیں یا،
دھات کے ساتھ بندش بناتے ہیں۔ یہ d مدار یہ کے الکٹران ہوتے ہیں۔
- ❖ مروری عناصر میں کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات بننے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس میں ایسی نوع پائی جاتی ہے جو الکٹرانوں کی
ایک جوڑی عطا کر کے ہم ربط بندش (coordinate covalent compound) بنا سکتا ہے۔
- ❖ اندرونی مروری عناصر میں، عناصر کے دو سلسلے پائے جاتے ہیں۔ 1) Lanthanoids (پہلے
Lanthanides کہلاتے تھے) 2) Actinoids (پہلے Actinides کہلاتے تھے)
- ❖ Lanthanoids کی عام الکٹرائی تشکیل $[Xe] 4f^{1-14} 5d^{0-1} 6s^2$ ہے۔
- ❖ Lanthanoids کی عام تفسیدی حالت +3 ہے۔
- ❖ جب ہم 4f سلسلے سے گزرتے ہیں تو جوہری عدد کے اضافہ کے ساتھ Lanthanoids کے جوہری اور روانی
نصف قطر، آہستہ سے گھٹتے جاتے ہیں۔ روانی جسامت کے اس گھٹنے کو Lanthanoid contraction
لینتھانائڈ کاسیکٹر کہتے ہیں۔
- ❖ Actinoids کی الکٹرائی تشکیل واضح نہیں ہے۔ 5f کے عناصر کی عام گرفت خول کی الکٹرائی تشکیل
 $[Rn] 5f^{0-14} 6d^{0-2} 7s^2$ ہے۔ Lanthanoids ہی کی طرح اکثر Actinoids کی عام تفسیدی +3 ہے۔
ان کے علاوہ، Actinoids متغیر تفسیدی حالتیں رکھتے ہیں۔ +2، +3، +4، +5، +6 اور +7۔



GPOWD

محاسبہ



صحیح جواب منتخب کیجئے :

- 1- Sc (z=21) ایک مروری عنصر ہے، مگر Zinc (z=30) نہیں، کیوں کہ
(a) Sc^{3+} اور Zn^{2+} دونوں رواں بے رنگ ہیں اور سفید مرکبات بناتے ہیں
(b) Sc میں 3d مدار یہ جزوی طور پر بھرا ہوا ہے، مگر Zn میں یہ مکمل بھرا ہوا ہے
(c) Zn میں یہ مانا گیا ہے کہ آخری الکٹران 4s کی سطح میں شامل کیا گیا ہے۔
(d) Sc اور Zn دونوں متغیر تفسیدی حالت نہیں رکھتے۔

2- درج ذیل d بلاک عناصر میں سے کس میں نصف بھرا ہوا آخری d مدار یا نصف بھرا ہوا گرتی مدار یہ ہے۔
 Cr (a) Pd (b) Pt (c) d ان میں سے کوئی بھی نہیں۔

3- 3d سلسلہ کے مروری دھاتوں میں سب سے زیادہ منفی Standard electrode potential (M^{2+}/M) کی قیمت رکھتا ہے۔
 Ti (a) Cu (b) Mn (c) Zn (d)

4- V^{3+} کی طرح درج ذیل میں سے کس کے روانوں میں اسی تعداد کے غیر جوڑی دار الیکٹران پائے جاتے ہیں۔
 Ti^{3+} (a) Fe^{3+} (b) Ni^{2+} (c) Cr^{3+} (d)

5- Mn^{2+} رواں کا مقناطیسی معیار اثر یہ ہے۔
 3.90 BM (d) 8.95 BM (c) 2.80 BM (b) 5.92 BM (a)

6- مروری دھاتوں اور اس کے مرکبات کی تناسلی عاملیت کا رجحان اس کی وجہ سے ہے۔
 (a) ان کی مقناطیسی رجحان سے
 (b) ان کے غیر بھرتی کردہ d مدار یوں سے
 (c) متغیر تکسیدی حالتوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت سے
 (d) ان کے کیمیائی تعامل کی وجہ سے

7- اس سلسلہ میں تکسیدی طاقت کے بڑھنے کا درجہ اس طرح سے ہے
 $Cr_2O_7 < VO_2^+ < MnO_4^-$ (b) $VO_2^+ < Cr_2O_7 < MnO_4^-$ (a)
 $MnO_4^- < Cr_2O_7 < VO_2^+$ (d) $Cr_2O_7 < MnO_4^- < VO_2^+$ (c)

8- ترشوی واسطے میں، پوٹاشیم پرمنگنیٹ آکسائلک ترشہ کو اس میں تبدیل کرتا ہے۔
 Carbon di Oxide (b) Oxalate (a)
 Acetic Acid (d) Acetate (c)

9- ذیل میں سے کونسا بیان صحیح نہیں ہے۔
 (a) ترشوی $K_2Cr_2O_7$ محلول میں H_2S گزارنے سے ایک دودھیا سفید رنگ کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔
 (b) Volumetric analysis تجزیہ کے دوران $K_2Cr_2O_7$ کی جگہ $Na_2Cr_2O_7$ کو ترجیح دی جاتی ہے۔
 (c) ترشوی واسطے میں $K_2Cr_2O_7$ کا رنگ نارنجی ہے۔
 (d) pH کی قیمت 7 سے بڑھنے پر $K_2Cr_2O_7$ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔

10- ترشوی واسطے میں پرمنگنیٹ کا رواں اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
 Mn^{2+} (b) MnO_4^{2-} (a)
 MnO_2 (d) Mn^{3+} (c)

11- جب 1 مول پوٹاشیم ڈی کرومیٹ، پوٹاشیم ایوڈائیڈ کے ساتھ تعامل پاتا ہے تو I_2 کے کتنے مول خارج ہوں گے؟

- 1 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d)

12- ایک مول فیرس آکسالیٹ (FeC_2O_4) کی تکسید کے لئے درکار ترشوی $KMnO_4$ کے مول کی تعداد یہ ہے۔

- 1.5 (d) 0.6 (c) 3 (b) 5 (a)

13- Lanthanoids سے متعلق کونسا بیان صحیح نہیں ہے۔

- (a) Europium کی تکسیدی حالت +2 ہے۔
(b) Lu سے Pr کی طرف گزرتے وقت، اساسیت کم ہوتی ہے، کیوں کہ روانی نصف قطر کم ہوتا جاتا ہے۔
(c) Aluminium کی بہ نسبت تمام Lanthanoids بہت زیادہ تعامل پذیر ہیں۔
(d) Ce^{4+} کے محلول حجمی تجزیہ (Volumetric analysis) میں بطور تکسیدی عامل استعمال کئے جاتے ہیں۔

14- درج ذیل میں سے کونسے Lanthanoid کے رواں دوہرے مقناطیسی (diamagnetic) ہے۔

- (a) Eu^{2+} (b) Yb^{2+}
(c) Ce^{2+} (d) Sm^{2+}

15- درج ذیل lanthanoids میں سے کونسی تکسیدی حالت سب سے عام ہے؟

- 4 (a) 2 (b) 5 (c) 3 (d)

16- توثیق (A) : حجمی تجزیہ (volumetric analysis) میں Ce^{4+} ایک تکسیدی عامل کی طرح استعمال ہوتا ہے۔

- سبب (R) : Ce^{3+} میں +3 تکسیدی حالت بننے کا رجحان پایا جاتا ہے۔
(a) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توثیق کی صحیح وضاحت سبب کرتا ہے۔
(b) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توثیق کی صحیح وضاحت سبب نہیں کرتا ہے۔
(c) توثیق (A) صحیح ہے مگر سبب غلط ہے۔
(d) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں غلط ہیں۔

17- actinoids کی سب سے عام تکسیدی حالت یہ ہے۔

- +2 (a) +3 (b) +4 (c) +6 (d)

18- actinoids جو +7 کی اعلیٰ تکسیدی حالت ظاہر کرتے ہیں، وہ یہ ہیں۔







- (a) Np, Pu, Am (b) U, Fm, Th
(c) U, Th, Md (d) Es, No, Lr

19- ان میں سے کونسا بیان درست نہیں ہے۔

- (a) $\text{Lu}(\text{OH})_3$ کی بہ نسبت $\text{La}(\text{OH})_3$ کم اساسیت رکھتا ہے۔
(b) Lanthanoids کے سلسلہ میں Ln^{3+} کے روانوں کا نصف قطر کم ہوتا ہے۔
(c) La حقیقت میں مروری دھاتی سلسلہ کا ایک عنصر ہے، نہ کہ Lanthanoid سلسلہ کا۔
(d) Lanthanoid کے سکیڑ کی وجہ سے Zr اور Hf کے جوہری نصف قطریں یکساں ہیں۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

- 1- مروری دھاتیں کیا ہیں؟ چار مثالیں دیجئے۔
2- $4d$ سلسلے کے عناصر کی تکسیدی حالتوں کی وضاحت کیجئے۔
3- اندرونی مروری عناصر کیا ہیں؟
4- دوری جدول میں Lanthanoids اور Actinoids کے مقام کے لئے جواز پیش کیجئے۔
5- Actinoids کیا ہیں؟ تین مثالیں پیش کیجئے۔
6- Potassium dichromate کی تیاری کی وضاحت کیجئے۔
7- Lanthanoid contraction کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟
8- درج ذیل کو مکمل کیجئے۔



9- بین خلوی مرکبات کیا ہیں؟

10- Ti^{3+} اور Mn^{2+} میں موجود غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد محسوب کیجئے اور موری گردش کا مقناطیسی معیار اثر

(spin only magnetic moment) محسوب کیجئے۔

11- Ce^{4+} اور Co^{2+} کی الیکٹرانی تشکیل لکھئے۔

12- جوہری عدد کے بڑھنے سے کس طرح مروری عناصر کی پہلی صف کے پہلے نصف عناصر کی $+2$ تکسیدی حالت زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی مختصر وضاحت کیجئے۔

13- ان میں سے کونسا زیادہ مستحکم ہے؟ Fe^{3+} or Fe^{2+} واضح کیجئے۔

14- $E^\circ_{\text{M}^{3+}/\text{M}^{2+}}$ 3d series میں تغیر (تبدیلی) کی وضاحت کیجئے۔

- 15- Lanthanoids اور actinoids کا موازنہ کیجئے۔
- 16- واضح کیجئے کہ کیوں Cr^{2+} ایک طاقتور تھویلی عامل ہے، جب کہ Mn^{3+} ایک طاقتور تکسیدی عامل؟
- 17- مروری عناصر کے پہلے سلسلہ کے روانی انتھالپی کا موازنہ کیجئے۔
- 18- Lanthanoid contraction کی بہ نسبت، actinoid contraction ایک عنصر سے دوسرے عنصر میں زیادہ ہے۔
ایسا کیوں ہے؟
- 19- $La(OH)_3$ اور $Lu(OH)_3$ میں کونسا زیادہ اساسی نوعیت رکھتا ہے اور کیوں؟
- 20- Cerium(II) کی بہ نسبت europium (II) کیوں زیادہ مستحکم (Stable) ہے؟
- 21- Zirconium اور Hafnium کیوں مشابہ خواص ظاہر کرتے ہیں؟
- 22- ان میں سے زیادہ طاقتور تھویلی عامل کونسا ہے Cr^{2+} یا Fe^{2+} ؟
- 23- Cu میں $E^\circ_{M^{2+}/M}$ کی قیمت مثبت ہے۔ اس کی ممکن وجہ بتائیے۔
- 24- 3d سلسلے کے عناصر کی متغیر تکسیدی حالت کے بارے میں وضاحت کیجئے۔
- 25- 3d سلسلہ کی کونسی دھات اکثر اور زیادہ تر +1 تکسیدی حالت کو ظاہر کرتی ہے اور کیوں؟
- 26- zinc کی بہ نسبت chromium میں پہلی روانی انتھالپی کیوں کم ہے؟
- 27- مروری عناصر اعلیٰ نقطہ پگھلاؤ ظاہر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

کوآرڈینیٹن کیمیا (ہم ربطی کیمیا) (COORDINATION CHEMISTRY)

اکائی
5



آلفرڈ ورنر (1866-1919)



سیکھنے کے مقاصد



- اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ورنر کے کوآرڈینیٹن کیمیا کے نظریہ کو سمجھ سکیں گے۔
- ❖ کوآرڈینیٹن کیمیا کے اہم اصطلاحات کی وضاحت کر سکیں گے
- ❖ IUPAC کے رہنمائی خطوط کے مطابق کوآرڈینیٹن کے مرکبات کو نام دیں گے۔
- ❖ کوآرڈینیٹن مرکبات میں مختلف قسم کے ہم ترکیبوں کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ❖ ورنر کے کوآرڈینیٹن مرکبات کے نظریے کے مفروضات سے متعلق تبادلہ خیال کر سکیں گے۔
- ❖ ویلنس بانڈ تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے کوآرڈینیٹن مرکبات کے ساخت کی پیش گوئی کر سکیں گے۔
- ❖ کرسٹل فیلڈ تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوآرڈینیٹن مرکبات کے رنگ اور مقناطیسی خواص کو بیان کر سکیں گے۔
- ❖ اعلیٰ گردش اور ادنیٰ گردش والے کوآرڈینیٹن مرکبات میں فرق کر سکیں گے۔
- ❖ قیام پذیری (استحکام) کے مستقلہ کے لحاظ سے کوآرڈینیٹن مرکبات میں قیام پذیری (استحکام) کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ❖ روزمرہ کی زندگی میں کوآرڈینیٹن مرکبات کے اطلاقات کی وضاحت کر سکیں گے۔

آلفرڈ ورنر، سوئٹزرلینڈ کے کیمیا دان تھے، جنہوں نے کوآرڈینیٹن کیمیا کے مپلسوں میں بندشوں کی وضاحت کی۔ 1893ء میں انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹن کیمیا کے نظریہ کو پیش کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس خیالی نظریہ کو انہوں نے الیکٹران کی دریافت سے پہلے پیش کیا تھا۔ الیکٹران کی دریافت 1896ء میں جے. جے. تھامسن نے کی تھی۔ ورنر کے پاس کوئی جدید آلاتی تکنیک موجود نہیں تھی۔ ان کے تمام مطالعے چھوٹے چھوٹے کیمیائی تجربوں کی بنیاد پر تھیں۔ بندشوں یا ساختوں کے علم کے بغیر کیمپلسوں کا مطالعہ ایک الجھن ہی کی طرح تھا۔ اپنے اس نظریہ کی بنا پر 20 سال کے بعد 1913ء میں انہیں کیمیا کے میدان میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ یہی وہ پہلے غیر نامیاتی کیمیا دان تھے، جن کو نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔

گذشتہ اکائی میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مروری/عبوری دھاتیں بڑی تعداد میں کمپلکس مرکبات کی تشکیل کرتے ہیں۔ لاطینی زبان میں اصطلاح 'complexus' کا مطلب پکڑنا اور 'coordinate' کا مطلب ترتیب دینا ہے۔ مروری/عبوری دھاتوں کے کمپلکسوں میں دلچسپ خواص پائے جاتے ہیں اور سادہ روانی اور ہم گرفتی مرکبات سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر، Chromium(III)chloride hexahydrate، $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ بیگنی رنگ، ہلکا سبز اور گہرا سبز رنگ کے مرکب کی طرح موجود ہے۔ دھاتوں کے علاوہ بعض ادھاتیں بھی کوآرڈینیٹیشن مرکبات بناتے ہیں، مگر d بلاک عناصر کی بہ نسبت بہت ہی کم ہیں۔ حیاتیاتی افعال میں کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کیمیائی صنعتوں میں کوآرڈینیٹیشن مرکبات کے بطور تماسی عامل کئی اطلاقات ہیں۔ مثال کے طور پر ہیموگلوبن جو خون میں آکسیجن لے جاتا ہے، یہ بھی لوہے کا ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب ہی ہے۔ Cobalamine، ایک ضروری وٹامن ہے، یہ بھی کوآرڈینیٹیشن مرکب ہی ہے۔ پودوں میں موجود ہرالون کلوروفل، جو شعاعی ترکیب کا ذمہ دار ہے، یہ بھی میگنیشیم کا ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب ہے۔ Wilkinson's compound، Ziegler Natta compound وغیرہ صنعتوں میں بطور تماسی عامل استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی کوآرڈینیٹیشن مرکبات ہی ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کی کیمیا کا مطالعہ کریں۔ اس اکائی میں ہم ان کوآرڈینیٹیشن مرکبات کی نوعیت، بندش، نام، ہم ترکیبیت اور اطلاقات سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔

5.1 کوآرڈینیٹیشن مرکبات اور دوہرے نمک (Co-ordination compounds and double salts)

جب دو یا دو سے زیادہ قیام پذیر مرکبات کا محلول بنایا جاتا ہے اور تخیر کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دوہرے نمک یا کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات بننے کے مواقع بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب فیرس سلفیٹ اور امونیم سلفیٹ کے مساوی مولار (equimolar) محلول کو قلمایا جاتا ہے تو Mohr's salt نامی ایک دوہرے نمک $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (Ferrous Ammonium Sulphate (FAS)) حاصل ہوتا ہے۔ غیر نامیاتی معیاری تجزیہ میں فیرک کے رواں کی شناخت کے دوران حاصل ہونے والا خون کا رنگ، فیرک کلورائیڈ اور پوٹاشیم تھیوسیانائیڈ کے کوآرڈینیٹیشن کے مرکب $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{SCN})_6]$ پوٹاشیم فیری تھیوسیانائیڈ کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم Mohr's salt (FAS) کی جانچ کریں گے تو وہ Fe^{3+} ، NH_4^+ اور SO_4^{2-} کے روانوں کی موجودگی دکھلائے گا، جب کہ potassium ferrithiocyanate، Fe^{3+} اور SCN^- کی موجودگی نہیں دکھلائے گا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دوہرے نمک اپنی شناخت کھودیتے ہیں اور محلول میں اپنے سادہ روانوں کی طرح حل پذیر ہو جاتے ہیں، جب کہ کوآرڈینیٹیشن مرکب کے کمپلکس مرکب، اپنی شناخت کو نہیں کھوتے اور کبھی بھی سادہ روانوں کی طرح حل پذیر نہیں ہوتے۔

5.2 ورنر کا کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کا نظریہ (Werner's theory of coordination compounds)

ورنر، جو سوئٹزرلینڈ کے ایک کیمیا دان ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کے مطالعہ سے ایک نظریہ پیش کیا۔ کوآرڈینیٹیشن (III) کلورائیڈ اور امونیا کے تعامل سے بننے والے مختلف رنگین کمپلکسوں کو فرض کریں، جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے۔

کامپلکس	رنگ	ایک مول کامپلکس کے ساتھ افزودہ Ag^+ کے تعامل سے رسوب شدہ $AgCl$ کے مول کی تعداد
$CoCl_3 \cdot 6NH_3$	Yellow	3
$CoCl_3 \cdot 5NH_3$	Purple	2
$trans - CoCl_3 \cdot 4NH_3$	Green	1
$cis - CoCl_3 \cdot 4NH_3$	Violet	1

اس صورت میں متعامل ہونے والے سالمے کو بالٹ (III) کلورائیڈ اور امونیا میں موجود جوہروں کی گرفتیں مکمل طور پر مطمئن کرتی ہیں، اس کے باوجود یہ تعامل پا کر اوپر بتائے گئے مطابق کامپلکس مرکبات بناتے ہیں۔

ان طرز عمل کی وضاحت کے لئے ورز نے بعض مفروضات پیش کئے، جو اس طرح سے ہیں۔


1- اکثر عناصر دو قسم کی گرفتوں کو ظاہر کرتے ہیں، ابتدائی گرفت اور ثانوی گرفت، اور یہ دونوں گرفتوں کو مطمئن کرتی ہیں۔ جدید اصطلاح میں ابتدائی گرفت (Primary valency) کو دھاتی جوہر کی تکسیدی حالت (Oxidation state) اور ثانوی گرفت (Secondary valency) کو آئرڈی نیشن عدد (Coordination number) کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ورز کے مطابق کو بالٹ کی ابتدائی اور ثانوی گرفت بالترتیب 3 اور 6 ہے۔

2- دھاتی رواں کی ابتدائی گرفت اکثر صورتوں میں مثبت اور بعض صورتوں میں صفر ہوتی ہے۔ وہ اکثر منفی روانوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں (گرفت پوری کر لیتے ہیں)۔ مثال کے طور پر $CoCl_3 \cdot 6NH_3$ میں Co کی ابتدائی گرفت +3 ہے، جو $3 Cl^-$ روانوں سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ 3- ثانوی گرفت منفی، تعدیلی، مثبت اور بعض صورتوں میں ان سب کے مجموعہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر $CoCl_3 \cdot 6NH_3$ میں Co کی ثانوی گرفت کو امونیا کے 6 سالمے پورا کرتے ہیں، جب کہ $CoCl_3 \cdot 5NH_3$ میں Co کی ثانوی گرفت کو امونیا کے 5 سالمے اور Cl^- کا ایک سالمہ پورا کرتے ہیں۔

4- ورز کے مطابق، ایک کامپلکس میں مرکزی دھاتی جوہر یا رواں کے اطراف کشش کے دو کرے ہوتے ہیں۔ اندرونی کرہ کو آئرڈی نیشن کا کرہ کہتے ہیں اور یہاں موجود گروپ، مرکزی دھاتی جوہر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ بیرونی کرہ کو روانی کرہ

(ionisation sphere) کہا جاتا ہے۔

یہاں موجود گروپ، مرکزی دھاتی جوہر کے ساتھ ہلکے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کسی مناسب محل میں حل کرنے سے یہ روانوں کی طرح جدا ہو جاتے ہیں۔



خاکہ 5.1 کو آئرڈی نیشن مرکبات میں اندرونی اور بیرونی کشش والے کرے

1. ابتدائی گرفت سمتی نہیں ہیں، جب کہ ثنائی گرفتیں سمتی ہیں۔ کمپلکس کی شکل، اس خالی جگہ میں موجود گروپ کی ترتیب پر منحصر ہے، جو ثنائی گرفت کو مطمئن کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دھاتی رواں کی ثنائی گرفت 6 ہے تو اس کی شکل آٹھ سطحی ہوگی۔ اگر ثنائی گرفت 4 ہو تو یہ یا تو سہ پہلو اہرامی (Tetrahedral) یا چہار سطحی (Square planar) ہوگا۔
- درج ذیل جدول، ورز کے مفروضات کی عکاسی کرتی ہے۔

بننے والے AgCl کے مول کی تعداد - رواں ہونے والے Cl ⁻ مول کی تعداد	کمپلکس میں موجود روانی Cl ⁻ (بیرونی کوآرڈینیٹیشن کا کرہ)	گروپ جو ثنائی گرفت کو مطمئن کرتے ہیں (غیر روانی، اندرونی کوآرڈینیٹیشن کا کرہ)	کمپلکس
3 AgCl	3 Cl ⁻	6 NH ₃	CoCl ₃ .6NH ₃
2 AgCl	2 Cl ⁻	5 NH ₃ & 1 Cl ⁻	CoCl ₃ .5NH ₃
1 AgCl	1 Cl ⁻	4 NH ₃ & 2 Cl ⁻	CoCl ₃ .4NH ₃
1 AgCl	1 Cl ⁻	4 NH ₃ & 2 Cl ⁻	CoCl ₃ .4NH ₃

5.2.1 ورز کے نظریہ کی حد بندیاں (Limitations of Werner's theory)

حالانکہ ورز کا نظریہ کئی کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کی وضاحت کرتا ہے، مگر وہ ان کے رنگوں اور مقناطیسی خواص کے بارے میں وضاحت نہیں کرتا۔

خود کا محاسبہ - 1

جب ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب CrCl₃.4H₂O کو Silver Nitrate کے محلول کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو فی مول کے مرکب میں سے ایک مول Silver chloride، رسوب بنتا ہے۔ اس مرکب میں کوئی بھی آزاد محلول کے سائلے موجود نہیں ہیں۔ دھات کو ثنائی گرفت دیں اور اس مرکب کا ساختی ضابطہ لکھئے۔

5.3 کوآرڈینیٹیشن مرکبات سے متعلق اہم اصطلاحات کی وضاحت

5.3.1 کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ (Co-ordination entity)

کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ ایک رواں یا ایک تعدیلی سالمہ ہے جس میں ایک مرکزی جوہر عام طور پر ایک دھات ہوتی ہے اور بعض جوہروں یا جوہروں کے گروپ (لگینڈ) ہوتے ہیں جو مرکزی جوہر سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ضابطہ میں انفرادی حصہ کو مربع قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پوٹاشیم فیروسیانائیڈ K₄[Fe(CN)₆] میں کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ [Fe(CN)₆]⁴⁻ ہے۔ Nickel Tetracarbonyl میں کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ [Ni(CO)₄] ہے۔

5.3.2 مرکزی جوہر / رواں

مرکزی جوہر یا رواں وہ ہے جو ایک کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ میں مرکزی مقام پر قائم ہوتا ہے۔ یہ دیگر جوہروں یا جوہروں کے گروپوں (لگینڈ) کو اپنے ساتھ ہم گرفتہ ہم ربط بندش (Coordinate covalent bond) کے ذریعہ جوڑ کر رکھتا ہے۔

مثال کے طور پر $K_4[Fe(CN)_6]$ میں مرکزی دھاتی رواں Fe^{2+} ہے۔ کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ میں Fe^{2+} ، ہر لگینڈ سے ایک الیکٹران کی جوڑی حاصل کرتا ہے، CN^- اور چھ $Coordinate\ covalent\ bonds$ بناتا ہے۔ چونکہ مرکزی دھاتی روانوں میں الیکٹرانوں کی جوڑی کو حاصل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو Lewis acid کہا جاتا ہے۔

5.3.3 لگینڈ (Ligand)

لگینڈ جوہروں یا جوہروں کے گروپ ہیں جو مرکزی جوہر یا روانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لگینڈ میں موجود جوہر جو مرکزی دھاتی جوہر کے ساتھ براہ راست بندھا رہتا ہے، یہ donor کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر $K_4[Fe(CN)_6]$ میں لگینڈ CN^- رواں ہے، مگر اس میں donor جوہر کاربن ہے اور $[CO(NH_3)_6]Cl_3$ میں لگینڈ NH_3 کا سالمہ ہے اور نائٹروجن کا جوہر donor ہے۔

کوآرڈی نیشن کا کرہ (Coordination sphere)

کوآرڈی نیشن کے مرکب کے کامپلکس کا رواں، جس میں مرکزی دھاتی جوہر یا رواں اور لگینڈ بندھے ہوئے ہیں، ان کو جملہ کوآرڈی نیشن کا کرہ کہا جاتا ہے اور عام طور پر اسے مربع قوسین کے اندر ان کے بار charge کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ دیگر رواں ہونے والے روانوں کو قوسین کے باہر لکھا جاتا ہے، انہیں counter ions کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $K_4[Fe(CN)_6]$ میں کامپلکس کا رواں $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ہے اور اس کو کوآرڈی نیشن کا کرہ کہا جاتا ہے۔ K^+ کے دیگر منسلک روانوں کو counter ions کہا جاتا ہے۔

کوآرڈی نیشن کثیر ضلعی (Coordination poly hedron)

وہ سہ ابعادی ترتیب جس میں لگینڈ کے جوہر یا رواں مرکزی جوہر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کوآرڈی نیشن کثیر ضلعی یا

polygon کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $K_4[Fe(CN)_6]$ میں، کوآرڈی نیشن کثیر ضلعی، آٹھ ضلعی (Octahedral) ہے۔

$[Ni(CO)_4]$ کا کوآرڈی نیشن کثیر ضلعی سہ پہلوئی اہرامی (tetrahedral) ہے۔

مثال کے طور پر

i- $K_4[Fe(CN)_6]$ میں Fe^{2+} کا کوآرڈی نیشن عدد 6 ہے۔

ii- $[Ni(en)_3]Cl_2$ میں Ni^{2+} کا کوآرڈی نیشن عدد بھی 6 ہے۔ یہاں پر لگینڈ 'en' کا مطلب $(NH_2-CH_2-CH_2-NH_2)$

ethane-1,2-diamine ہے اور اس میں دو donor جوہر (نائٹروجن) ہوتے ہیں۔ ہر لگینڈ نکل کے ساتھ دو کوآرڈی نیشن بندش (ہم ربط بندش) بناتا ہے۔ چنانچہ ان کے درمیان جملہ 6 ہم ربط بندشیں پائی جاتی ہیں۔

تکسیدی حالت (عدد) (Oxidation state (number))

ایک کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ (entity) کے مرکزی دھات کے جوہر کی تکسیدی حالت کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جب مرکزی دھات کے جوہر سے تمام لگینڈوں کو ان کی الیکٹرانوں کی جوڑیوں کے ساتھ خارج کر دیا جائے تو اس دھات میں باقی رہنے والا برقی بار ہی اس دھات کی تکسیدی حالت یا تکسیدی عدد ہے۔ ایک کامپلکس کو نام رکھنے کے دوران اس کو رومن ہندسے میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر $[Fe(CN)_6]^{4-}$ کے انفرادی حصہ میں Fe کی تکسیدی حالت کو (II) کی طرح اظہار کیا جاتا ہے۔ کامپلکس رواں میں موجود کل بار، مرکزی دھات کی تکسیدی حالت اور اس کے ساتھ بندھے ہوئے لگینڈوں کے بار کے حاصل جمع کے برابر ہوگا۔ اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے تکسیدی حالت کو اس طرح محسوب کیا جاسکتا ہے۔

$$[\text{کل بار}] = (\text{کلینڈوں کی تعداد}) + (\text{مرکزی دھات کی تکسیدی حالت}) = \text{کل بار}$$

مثال 1 :

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ میں فرض کیجئے کہ Fe کا تکسیدی عدد x ہے۔

$$\text{کل بار} : x + 6(-1) = -4 \Rightarrow x = +2$$

مثال 2 :

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$ میں فرض کیجئے کہ Fe کا تکسیدی عدد x ہے۔

$$\text{کل بار} : x + 5(0) + 1(-1) = +2 \Rightarrow x = +3$$

خود کی جانچ 2 :

2- کمپلکس $[\text{Pt}(\text{NO}_2)(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_2]\text{Br}$ میں درج ذیل کی شناخت کیجئے۔

i- مرکزی دھاتی جوہر / رواں

ii- کلینڈ اوران کی قسمیں

iii- کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ

iv- مرکزی دھاتی رواں کا تکسیدی عدد

v- کوآرڈینیٹیشن عدد

کمپلکس کی قسمیں :


کوآرڈینیٹیشن مرکبات کو ان کی بنیاد پر ذیل کی قسموں میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ (i) کمپلکس رواں کے جملہ بار

(ii) کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ میں موجود کلینڈ کی قسم۔


کمپلکس رواں کے جملہ بار کی بنیاد پر درجہ بندی

ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب جس میں کمپلکس کارواں


i- جملہ مثبت بار رکھتا ہے تو یہ cationic complex منفروانی کمپلکس کہلائے گا۔ مثالیں : $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$



ii- جملہ منفی بار رکھتا ہے تو یہ anionic complex مشروانی کمپلکس کہلائے گا۔ مثالیں : $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$



iii- جملہ بار نہیں رکھتا ہو تو یہ تعدیلی کمپلکس Neutral complex کہلائے گا۔ مثالیں : $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$



کلینڈ کی قسموں کی بنیاد پر درجہ بندی

ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب جس میں i- مرکزی دھاتی رواں / جوہر صرف ایک ہی قسم کے کلینڈ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، homoleptic کمپلکس

کہلاتا ہے۔ مثالیں : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

ii- مرکزی دھاتی رواں/ جو ہر جس میں ایک سے زیادہ (مختلف) قسم کے لگینڈ پائے جاتے ہوں، heteroleptic کا مپکس کہلاتا ہے۔ مثال: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$

5.4 کوآرڈینیٹن کے مرکبات کا تسمیہ (نام رکھنا) (Nomenclature of coordination compounds)

پہلے پہل مرکبات کو ان کے موجودوں کے نام دئے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر $\text{K}[\text{PtCl}_6(\text{C}_2\text{H}_4)]$ کو Zeise's salt کہا گیا اور $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ کو Magnu's green salt کہا گیا۔ اس طرح کے کئی مرکبات ہیں، جن کو تیار کیا گیا اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ کیا گیا۔ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) نے منظم طور پر ان کو نام دینے کے لئے ایک طریقہ بتایا۔ کوآرڈینیٹن مرکبات کو نام رکھنے کے رہنما خطوط (IUPAC) نے دئے ہیں جو اس طرح سے ہیں (2005)۔

1- منفرواں (Cation) کو پہلے نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشرواں (anion) کو نام دیا جاتا ہے، چاہے وہ رواں سادہ ہو یا کامپلکس ہو۔ مثال کے طور پر

- $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ میں K^+ کو پہلے نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ کو۔
 - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ میں کامپلکس منفرواں $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ کو پہلے نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد مشرواں Cl^- کو
 - $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ میں کامپلکس منفرواں $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ کو پہلے نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد کامپلکس مشرواں $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ کو
- 2- دیگر روانی مرکبات کی طرح سادہ روانوں کو نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر :




علامت	سادہ مشرواں	علامت	سادہ منفرواں
Cl^-	Chloride	Na^+	Sodium
NO_3^-	Nitrate	K^+	Potassium
SO_4^{2-}	Sulphate	Cu^{2+}	Copper

3- ایک کامپلکس رواں کو نام دینے کے لئے لگینڈوں کو پہلے نام دیا جاتا ہے، اس کے بعد مرکزی دھاتی جوہر/ رواں کو۔ جب ایک کامپلکس رواں جس میں ایک قسم سے زیادہ لگینڈ ہوں تو ان کو انگریزی حروف تہجی کی ترتیب (alphabetical order) سے نام دیا جاتا ہے۔

a- لگینڈوں کو نام دینا

i- مشروانی لگینڈ کو لاحقہ حرف 'o' اور منفروانی لگینڈ کو لاحقہ 'ium' نام دیا جائے۔ تعدیلی لگینڈ کو ان کے سالمی نام دئے جائیں، سوائے بعض کے، جیسے H_2O کو aqua، CO کو Carbonyl، NH_3 کو ammine اور NO کو nitrosyl نام دیں۔

ii- ambidentate لگینڈ کے لئے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس میں ایک سے زیادہ ہم ربط بندشیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر: thiocyanate لگینڈ، مرکزی جوہر/ رواں کے ساتھ سلفر کے ساتھ یا نائٹروجن کے ساتھ بندش بناتے ہیں۔ اس لگینڈ میں اگر سلفر ہم ربط بندش بناتا ہے تو اسے thiocyanato-kS کہیں گے اور اگر نائٹروجن کے ساتھ لگینڈ بندش بناتا ہے تو thiocyanato-kN کہیں گے۔

عام نام	ضابطہ	IUPAC لگینڈ کے نام
Bromide	Br^-	bromido
Chloride	Cl^-	chlorido
Fluoride	F^-	fluorido
Cyanide	CN^-	cyanido
Hydroxide	OH^-	hydroxido
Carbonate	CO_3^{2-}	carbonato
Nitrate	NO_3^-	nitrate
Nitrite	NO_2^-	$\leftarrow \text{NO}_2^-$; nitrito- κN $\leftarrow \text{ONO}^-$; nitrito- κO
Sulphate	SO_4^{2-}	sulphato
Sulphide	S^{2-}	sulphido
Oxalate (ox)	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	oxalato
Ethylenediamine (en)		ethane-1,2-diamine
Ethylenediaminetetraacetate (EDTA)		2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyl)dinitrilo)tetraacetato
Triphenylphosphine	P(Ph)_3	triphenylphosphane
Pyridine (py)		pyridine

iii۔ اگر کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ (entity) میں ایک سے زیادہ ایک خاص قسم کے لگینڈ پائے جاتے ہوں تو، لگینڈ کے ضعف (2,3,4,...) کو اظہار کرنے کے لئے مناسب یونانی سابقے جیسے (di, tri, tetra, ...) وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگر لگینڈ کے نام میں خود یونانی سابقہ موجود ہو، جیسا کہ ethylenediamine میں، تو ان لگینڈوں کے ضعف کے اظہار کے لئے ایک متبادل سابقہ جیسے (bis, tris, tetrakis, ...) وغیرہ استعمال کیا جائے۔ ان عددی سابقوں کو لگینڈوں کی حروف تہجی کی ترتیب کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

b۔ مرکزی دھات کو نام دینا: (Naming the central metal)

منفردانی/تعدیلی کمپلکسوں میں، عنصر کا نام ہی مرکزی دھاتی جوہر/رواں کے نام کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، جب کہ مشروانی مرکبات میں دھاتی جوہروں کے نام لیتے وقت لاحقہ 'ate' استعمال کیا جاتا ہے۔ دھات کی تکسیدی حالت کو دھات کے نام کے فوراً بعد قوسین میں رومی ہندسوں میں لکھا جاتا ہے۔

عنصر	دھاتوں کے نام	
	منفروانی کا مپکلس	مشبروانی کا مپکلس
Cr	Chromium	Chromate
Zn	Zinc	Zincate
Al	Aluminum	Aluminate
Fe	Iron	Ferrate
Cu	Copper	Cuprate
Co	Cobalt	Cobaltate
Pb	Lead	Plumbate
Ag	Silver	Argentate
Sn	Tin	Stannate
Au	Gold	Aurate
Pt	Platinum	Platinate

IUPAC کے رہنمائی خطوط کے مطابق کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کو نام دینا۔

مثال 1 :

K ₄ [Fe(CN) ₆] : کوآرڈینیٹیشن مرکب		
منفرواں (سادہ) Cation (Simple)	K ⁺	Potassium
مشبرواں (کا مپکلس) Anion (complex)	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	
لگینڈ Ligands	CN ⁻	
لگینڈ کا نام سابقہ کے ساتھ	6 لگینڈ - سابقہ Hexa مشبرواں لگینڈ cyanido-κC (CN ⁻ میں ہم ربطی جوہر، کاربن ہے)	hexacyanido-κC
مرکزی دھات	Fe (مشبرواں کا مپکلس میں)	ferrate
مرکزی دھات (x) میں تکسیدی حالت	$x + 6(-1) = -4$ $x = -4 + 6 = +2$	(II)
Potassium hexacyanido-κC ferrate(II) : نام IUPAC		

مثال 2 : $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$: کوآرڈینیٹیشن مرکب		
منفرواں (کامپلکس)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$	
لگینڈ	NH_3 and Cl^-	
لگینڈ کا نام سابقہ کے ساتھ (NH_3)	4 لگینڈ - سابقہ tetra تعدیلی لگینڈ - ammine	انگریزی حروف تہجی کے حساب سے chlorido سے پہلے ammine آتا ہے
	2 لگینڈ - سابقہ di مشروانی لگینڈ - chlorido	
مرکزی دھات	Co - (منفروانی مرکب میں)	cobalt
مرکزی دھات (x) کی تکسیدی حالت	$x + 4(0) + 2(-1) = +1$ $x = 1 + 2 = +3$	(III)
مشرواں (سادہ)	Cl^-	chloride
IUPAC نام : Tetraamminedichloridocobalt(III) chloride		

مثال 3 : $[\text{Cr}(\text{en})_3][\text{CrF}_6]$: کوآرڈینیٹیشن مرکب		
منفرواں (کامپلکس)	$[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$	
لگینڈ	en - (ethylenediamine)	
لگینڈ کا نام سابقہ کے ساتھ (لگینڈ ہی میں ایک یونانی سابقہ di موجود ہے کوئی اور سابقہ استعمال کریں۔)	3 لگینڈ - سابقہ tris تعدیلی لگینڈ ethane-1,2-diamine	tris(ethane-1,2-diamine)
مرکزی دھات	Cr (منفروانی کامپلکس میں)	chromium
مرکزی دھات میں تکسیدی حالت (x)	$x + 3(0) = +3$ $x = +3$	(III)
مشرواں (کامپلکس)	$[\text{CrF}_6]^{3-}$	
لگینڈ	6 F^-	
لگینڈ کا نام سابقہ کے ساتھ	6 لگینڈ - سابقہ hexa مشروانی لگینڈ : Fluorido	hexafluorido
مرکزی دھات	Cr (مشروانی کامپلکس میں)	chromate
مرکزی دھات (x) کی تکسیدی حالت	$x + 6(-1) = -3$ $x = -3 + 6 = +3$	(III)
IUPAC نام : Tris(ethane-1,2-diamine)chromium(III) hexafluoridochromate(III)		

IUPAC کے تسمیہ (نام دینے) کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے نیچے مزید مثالیں دی گئی ہیں۔

i.	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$	Diamminesilver(I) chloride
ii.	$[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$	Dichloridobis(ethane-1,2-diamine)cobalt(III) chloride
iii.	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$	Tetraamminecopper(II) sulphate
iv.	$[\text{Co}(\text{CO}_3)(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$	Tetraamminecarbonatocobalt(III) chloride
v.	$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})_3]\text{Cl}_3$	Triamminetriaquachromium(III) chloride
vi.	$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$	Potassiumpentacyanidonitrosylferrate(II)
vii.	$\text{Na}_2[\text{Ni}(\text{EDTA})]$	Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyl)dinitrilo) tetraacetatonickelate(II)
viii.	$[\text{PdI}_2(\text{ONO})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$	Diaquadiiododinitrito-κO palladium(IV)
ix.	$[\text{Cr}(\text{PPh}_3)(\text{CO})_5]$	Pentacarbonyltriphenylphosphanechromium(0)
x.	$[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$	Triamminetrinitrito-κNcobalt(III)
xi.	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{CN}][\text{Co}(\text{NH}_3)(\text{CN})_5]$	Pentaamminecyanido-κCcobalt(III) amminepentacyanido-κCcobaltate(III)
xii.	$[\text{Pt}(\text{py})_4][\text{PtCl}_4]$	Tetrapyridineplatinum(II) tetrachloridoplatinate(II)
xiii.	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]_3 [\text{Cr}(\text{CN})_6]$	Tetraamminedichloridocobalt(III) hexacyanido-κCchromate(III)
xiv.	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	diamminesilver(I) ion
xv.	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$	pentaamminechloridocobalt(III) ion
xvi.	$[\text{FeF}_6]^{4-}$	Hexafluoridoferrate(II)ion

14۔ درج ذیل مرکبات کے لئے IUPAC نام لکھئے۔


- (i) $K_2[Fe(CN)_3(Cl)_2(NH_3)]$
- (ii) $[Cr(CN)_2(H_2O)_4][Co(ox)_2(en)]$
- (iii) $[Cu(NH_3)_2Cl_2]$
- (iv) $[Cr(NH_3)_3(NC)_2(H_2O)]^+$
- (v) $[Fe(CN)_6]^{4-}$

15۔ درج ذیل مرکبات کی ساخت بتائیے۔

- (i) diamminesilver(I) dicyanidoargentate(I)
- (ii) Pentaammine nitrito-κNcobalt (III) ion
- (iii) hexafluorido cobaltate (III) ion
- (iv) dichloridobis(ethylenediamine) Cobalt (IV) sulphate
- (v) Tetracarbonylnickel (0)

5.5 کوآرڈی نیشن مرکبات میں ہم ترکیبیت (Isomerism in coordination compounds)

گذشتہ سال کیمیا کی جماعت میں ہم نے نامیاتی مرکبات کے پس منظر میں ہم ترکیبیت سے متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ اسی طرح کوآرڈی نیشن کے مرکبات بھی ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم ترکیبیت ایک ایسا مظہر ہے جس میں کوآرڈی نیشن کے مرکبات جن کا سالمی ضابطہ ایک ہوتا ہے، مگر اس کے طبعی اور کیمیائی خواص مختلف ہوتے ہیں، اس کی وجہ مرکزی دھاتی جوہر کے اطراف لگینڈ کی مختلف ترتیب ہے۔ درج ذیل فلو چارٹ کو آرڈی نیشن مرکبات میں مشاہدہ کردہ عام قسم کی ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتی ہے۔




5.5.1 ساختی ہم ترکیبے (Structural isomers)

وہ کوآرڈی نیشن مرکبات، جن کا ضابطہ ایک ہی ہو، مگر ان سے متعلقہ جوہروں کا رابطہ مختلف ہو، یہ ساختی ہم ترکیبے یا constitutional isomers کہلاتے ہیں۔ ساختی ہم ترکیبے کی چار عام قسمیں ہیں، جن کے بارے میں نیچے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔

رابطی ہم ترکیبے (Linkage isomers)



اس قسم کے ہم ترکیبے اس وقت بنتے ہیں، جب ایک ambidentate لگینڈ کو اپنے مختلف donor جوہروں کے ذریعے مرکزی دھات جوہر/رواں کے ساتھ بندھا گیا ہے۔ نیچے دی گئی مثالوں میں nitrite کارواں مرکزی دھاتی رواں ایک کامپلکس میں Co^{3+} کو ایک نائٹروجن جوہر کے ساتھ اور دوسرے کامپلکس میں آکسیجن کے ساتھ بندھا گیا ہے۔



کوآرڈینیٹیشن ہم ترکیبے (Coordination isomers)

کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات میں اس قسم کے ہم ترکیبے واقع ہوتے ہیں، جس میں منفرواں اور مشرواں دونوں کامپلکس رواں کی طرح موجود ہیں۔ منفروانی اور مشروانی کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ میں ایک یا ایک سے زیادہ لگینڈوں کے تبادلہ سے مختلف ہم ترکیبے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ کوآرڈینیٹیشن مرکب میں امونیا اور سیانائیڈ کے لگینڈ بالترتیب کو بالٹ اور کرومیم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جب کہ اس کے کوآرڈینیٹیشن کے ہم ترکیبے $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$ میں ان کی ترتیب الٹی ہے۔

کوآرڈینیٹیشن کے ہم ترکیبے کی بعض مزید مثالیں :



روانی ہم ترکیبے (Ionisation isomerism)

جب ایک رواں ہونے والا، مخالف سادہ رواں خود ایک لگینڈ کی طرح عمل کرتا ہے تو اس قسم کے ہم ترکیبے حاصل ہوتے ہیں۔ کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ (entity) میں ایک یا ایک سے زیادہ لگینڈوں کے ساتھ اس طرح کے مخالف رواں کے تبادلے سے روانی ہم ترکیبے بنتے ہیں۔ یہ ہم ترکیبے محلول میں مختلف رواں کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مرکب $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Br}_2$ کو فرض کیجئے۔ اس مرکب میں، Br^- اور Cl^- دونوں میں لگینڈ بننے کی صلاحیت موجود ہے اور ان رواں کے تبادلے سے مختلف ہم ترکیبے $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Br}_2]\text{Cl}_2$ بنتے ہیں۔ محلول میں پہلا مرکب Br^- دیتا ہے، جب کہ دوسرا Cl^- رواں دیتا ہے۔ لہذا یہ مرکبات روانی ہم ترکیبے کہلاتے ہیں۔

روانی ہم ترکیبوں کی بعض مزید مثالیں :



3- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{I}_2]\text{Cl}$ کے محلول کو جب AgNO_3 کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تو یہ ایک سفید رسوب دیتا ہے۔ جب حل شدہ کا مپلکس AgNO_3 کے ساتھ زرد رسوب دیتا ہے تو ہم ترکیبے کا ضابطہ کیا ہوگا؟ ان ہم ترکیبوں کو کیا نام دیا جائے گا؟

محلول سازی کی ہم ترکیبیت (Solvate isomerism)

کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ (entity) کی قلمی جالی میں، پانی، امونیا، الکحل جیسے آزاد محلول کے سالموں کا تبادلہ، مختلف ہم ترکیبے دیتا ہے۔ اس قسم کے ترکیبے کو محلول سازی کی ہم ترکیبیت کہتے ہیں۔ اگر محلول کے سالمے پانی کے ہوں تو، ہم ترکیبے کو آبیہ ہم ترکیبے (hydrate isomers) کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر، کا مپلکس جس کا کیمیائی ضابطہ $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ہو، اس کے تین آبیہ ہم ترکیبے ہیں، جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$	ایک بنفشی رنگ کا مرکب جو محلول میں کلورائیڈ کے تین رواں دیتا ہے۔
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	ایک ہلکا سبز رنگ کا مرکب، جو محلول میں کلورائیڈ کے دو رواں دیتا ہے۔
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	گہرے سبز رنگ کا مرکب، جو محلول میں کلورائیڈ کے ایک رواں دیتا ہے۔

5.5.2 - تجسمی ہم ترکیبے (Stereo isomers)

نامیاتی مرکبات ہی کی طرح، کوآرڈی نیشن مرکبات بھی تجسمی ہم ترکیبے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک کوآرڈی نیشن کے مرکب میں ایک ہی کیمیائی ضابطہ ہے اور مرکزی دھاتی جوہر اور لگائیڈ کے درمیان ایک ہی قسم کا رابطہ ہے۔ مگر وہ سہ ابعادی خالی جگہ میں لگائیڈ کی ترتیب میں مختلف ہیں۔ ان کو مزید شکلی ہم ترکیبیت (geometrical isomerism) اور بصری ہم ترکیبیت (optical isomerism) میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے۔

شکلی ہم ترکیبیت (Geometrical isomers)

مختلف قسم کے لگائیڈ رکھنے والے کا مپلکسوں (heteroleptic) کے مرکزی دھاتی جوہر کے اطراف کی خالی جگہ میں لگائیڈوں کی مختلف ممکنہ سہ ابعادی ترتیب کی وجہ سے شکلی ہم ترکیبیت ظاہر ہوتی ہے۔

مربع سطحی (square planar) کا مپلکس جو $[\text{MA}_2\text{B}_2]^{n\pm}$ اور $[\text{MA}_2\text{BC}]^{n\pm}$ کی شکل میں ہوں (جس میں A، B اور C، ایک دندانہ لگائیڈ (monodentate ligand) اور M، مرکزی دھاتی رواں/جوہر ہے)، مماثل گروپ (A یا B) جو مرکزی دھاتی جوہر (M) کے ایک ہی جانب یا مخالف جانب میں ہوں، یہ ترتیب دو مختلف شکلی ہم ترکیبے دیتی ہے۔ ان دونوں کو cis (ایک جانبی) اور trans (مخالف جانبی) ہم ترکیبے کہتے ہیں۔


مربع سطحی (square planar) کا مپلکس جو $[\text{M}(\text{xy})_2]^{n\pm}$ جس میں x اور y، ایک دو دندانہ لگائیڈ (bidentate ligand) ہے، جس میں دو مختلف ہم ربطی جوہر بھی cis-trans isomerism کو ظاہر کرتے ہیں۔ مربع سطحی (square planar) کا مپلکس جو $[\text{MABCD}]^{n\pm}$ بھی شکلی ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی ایک لگائیڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے (A، B، C یا D) دیگر تین لگائیڈوں کو تین مختلف طریقوں سے ترتیب دینے پر تین شکلی ہم ترکیبے حاصل ہوتے ہیں۔

خاکہ 5.4 MA_2B_2 , MA_2BC , $M(xy)_2$, $MABCD$ کے ہم ترکیبے

قسم	مثال	
	ہم جانبی ہم ترکیبہ (Cis isomer)	مخالف جانبی ہم ترکیبہ (Trans isomer)
MA_2B_2		
MA_2BC		
$M(xy)_2$		
$MABCD$		

آٹھ سطحی کمپلکس (Octahedral complexes)


آٹھ سطحی کمپلکس جو $[MA_2B_4]^{n\pm}$ اور $[M(xx)_2B_2]^{n\pm}$ کی شکل میں ہوں، cis-trans isomerism کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر A اور B ایک دندانہ لگائیڈ ہیں اور xx دو دندانہ لگائیڈ ہیں جس میں دو یکساں قسم کے donor جوہر ہیں۔ آٹھ سطحی کمپلکس میں لگائیڈوں کا مقام، درج ذیل عددی طریقے سے کیا جائے گا۔



اوپر کی ترتیب میں مقامات (1,2)، (1,3)، (1,4)، (1,5)، (2,3)، (2,5)، (2,6)، (3,4)، (3,6)، (4,5)، (4,6) اور (5,6) مشابہ (Identical) ہیں، اور اگر دو مماثل (similar) گروپ ان میں سے کسی ایک مقام میں موجود ہوں تو اس ہم ترکیبے کو cis isomer (ہم جانبی) کہا جائے گا۔ اسی طرح مقامات (1,6)، (2,4) اور (3,5) بھی مشابہ ہیں اور اگر مماثل لگائیڈ ان مقامات پر موجود ہوں تو اس ہم ترکیبے کو trans isomer (مخالف جانبی) کہا جائے گا۔

آٹھ سطحی (square planar) کمپلکس جو $[MA_3B_3]^{n\pm}$ کی شکل میں ہوں، وہ شکلی ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر تین مماثل لگائیڈ (A) ایک آٹھ سطحی کے ایک مثالی رخ پر موجود ہوں اور دیگر 3 لگائیڈ (B) آٹھ سطحی کے مخالف مثالی رخ پر موجود ہیں تو، اس ہم ترکیبے کو رُخی ہم ترکیبہ (facial isomer) (fac-isomer) کہا جائے گا۔ خاکہ 5.6 (a)

اگر تین مماثل لگائیڈ نصف النہار (مرکزی خط) (meridian) کے اطراف موجود ہوں، جو ایک آٹھ سطحی کے ایک (apex) سے مخالف (apex) تک ایک فرضی نصف دائرہ بناتا ہے، جیسا کہ خاکہ 5.6 (b) میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ہم ترکیبہ نصف النہاری ہم ترکیبہ (meridional isomer) (mer isomer) کہلاتا ہے۔ یہ نصف النہار اس لئے کہلاتا ہے کہ لگائیڈ کا ہر ایک سیٹ آٹھ سطحی کے نصف النہار پر قائم ہونا فرض کیا جاتا ہے۔



جیسے جیسے مختلف لکینڈوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، ممکنہ ہم ترکیبوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ $[MABCDEF]^{n\pm}$ کی قسم کے آٹھ سطحی کمپلکس کے لئے جس میں A, B, C, D, E اور F ایک دندانہ لکینڈ ہیں، 15 قسم کے مختلف ترتیبیں ممکن ہیں، جس سے 15 ہم ترکیبے حاصل ہوتے ہیں، تمام ممکنہ ہم ترکیبے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔




خود کا محاسبہ 5:

5- A, B اور C نامی تین مرکبات، جن کا عام ضابطہ $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ ہے، انہیں ایک مرتبان میں رکھا گیا ہے، جس میں ایک نابیدہ عامل موجود ہے اور وہ مرکبات اپنے پانی کے سالمے کو کھو کر اپنا مستقل وزن بنا چکے ہیں، جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔ مرکب کے

مرکب	مرکب کا ابتدائی وزن (g میں)	نابیدگی کے بعد مرکب کا مستقل وزن (g میں)
A	4	3.46
B	0.5	0.466
C	3	3

سالمی ضابطہ کی شناخت کیجئے۔

6- درج ذیل کمپلکسوں کے لئے ممکنہ قسم کے ہم ترکیبے بتائیے اور ان ہم ترکیبوں کی ساخت کو چھڑائیے۔



5.5.3 بصری ہم ترکیبیت (Optical isomerism)

نامیاتی مرکبات ہی کی طرح کوآرڈی نیشن کے مرکبات

جو chairality (جو لکینڈ کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں)

رکھتے ہیں، یہ بصری ترکیبیت ظاہر کرتے ہیں۔ دو بصری ہم

ترکیبوں کی جوڑی جو ایک دوسرے کے آئینہ کے خیالات کی

طرح ہیں، انہیں عکاس ہم ترکیبے (enantiomers)

کہا جاتا ہے۔ ان کے محلول سادہ تقطیلی روشنی

(plane polarised light) کو ساعت وار یا غیر

ساعت وار گھماتے ہیں اور ان کے نظیری ہم ترکیبے 'd'

(Dextro rotatory) 'l' اور (Levo rotatory)


بننے ہیں۔ $[M(xx)_3]^{n\pm}$, $[M(xx)_2AB]^{n\pm}$,

اور $[M(xx)_2B_2]^{n\pm}$ قسم کے آٹھ سطحی کمپلکس بصری

ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔


مثالیں :

$[Co(en)_3]^{3+}$ کے بصری ہم ترکیبوں کو خاکہ 5.7 میں بتایا گیا ہے۔



خاکہ 5.7 بصری ہم ترکیبہ

کوآرڈی نیشن کا مپلکس $[\text{CoCl}_2(\text{en})_2]^{3+}$ کے تین ہم ترکیبے ہیں، وہ بصری طور پر حساس cis یک جانبی شکل کے ہیں اور ایک بصری طور پر غیر حساس Trans مخالف جانبی شکل کے ہیں۔ اس کی ساختیں یہاں دکھائی گئی ہیں۔



خود کا محاسبہ 6 :

10- کا مپلکس $\text{Ca}[\text{Co}(\text{NH}_3)\text{Cl}(\text{Ox})_2]$ کے تمام ممکنہ جسمی ہم ترکیبوں (stereo isomers) کو چھڑائیے۔

5.6 کوآرڈی نیشن مرکبات کے نظریے (Theories of coordination compound)

الفرڈ ورنر نے کوآرڈی نیشن مرکبات کی بندشوں کو ایک لیوس ترشہ اور ایک لیوس اساس کے درمیان بندش کہا۔ کوآرڈی نیشن کے مرکبات کے مشاہدہ کردہ خواص کی وضاحت کرنے میں ان کا نظریہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جب کہ خواص جیسا کہ رنگ، مقناطیسی خواص وغیرہ سے متعلق ان کا نظریہ وضاحت نہیں کرتا۔ ورنر کے بعد Linus pauling نے Valence bond theory (VBT) (گرفتی بندش کا نظریہ) کو پیش کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان بننے والی بندش خالص ہم گرفتہ ہے۔ Van vleck اور Bethe نے دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان بننے والی بندش کو برق سکونی کہا ہے اور کوآرڈی نیشن مرکبات کے خواص کی وضاحت کرنے کے لئے Crystal Field theory (CFT) کے نظریے کو پیش کیا۔ مزید یہ کہ Ligand Field theory اور Molecular Orbital Theory کے نظریوں کی مزید ترقی نے کوآرڈی نیشن کے مرکبات کے درمیان بندشوں کی نوعیت کی مزید وضاحت کی۔ اس حصہ میں ہم سادہ کوآرڈی نیشن کے مرکبات کی وضاحت VBT اور CFT سے کریں گے۔

5.6.1- گرفتی بندش کا نظریہ (Valence Bond Theory) (VBT)

اس نظریہ کے مطابق، مرکزی دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان بندش کی وجہ، مدار بھرے ہوئے لگینڈ جس میں الیکٹرانوں کی تہا جوڑی ہو، اس کے ساتھ مرکزی دھاتی جوہر کے خالی مخلوط مداروں کا انطباق (overlap) ہے۔

VBT کے اہم مفروضات

1- ایک کوآرڈی نیشن کا مپلکس میں لگینڈ ← دھات کی نوعیت ہم گرفتہ ہے۔ مرکزی دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان الیکٹرانوں (لگینڈ کی طرف سے دئے گئے) کی ساجھ داری (sharing) سے یہ بندش بنتی ہے۔

- 2- ہر لگینڈ میں کم سے کم ایک بھرتی مدار یہ ہو جس میں الیکٹرانوں کی ایک تنہا جوڑی موجود ہو۔
- 3- لگینڈ کی طرف سے عطا کردہ الیکٹرانوں کی جوڑی کو بھرنے کے لئے، مرکزی دھاتی جوہر کے رواں مناسب تعداد کے (کوآرڈینیٹیشن عدد) کے خالی مدار پر رکھنے ہوں گے۔
- 4- مرکزی دھاتی جوہر کے رواں کے یہ خالی مدار پر اختلاط (hybridisation) پاتے ہیں، وہ عمل جس میں موزوں توانائی والے جوہری مدار پر مساوی تعداد کے نئے مدار پر بناتے ہیں، جن کو مخلوط مدار پر کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوط مدار پر اتنی ہی توانائی رکھتے ہیں۔
- 5- مرکزی دھاتی رواں کے خالی مخلوط مدار پر، خطی طور پر لگینڈ کے بھرتی شدہ مدار یوں کے ساتھ انطباق (overlap) پاتے ہیں، دھات اور لگینڈ کے درمیان ہم ربط ہم گرفتہ سگما بندش (coordinate covalent sigma bond) بناتے ہیں۔
- 6- مخلوط مدار پر سستی ہیں اور خلا میں ان کی ترتیب کا مپکلس رواں کو ایک خاص شکل دیتے ہیں۔

مثالیں	شکل	اختلاط	کوآرڈینیٹیشن عدد
$[\text{CuCl}_2]^-$, $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$	خطی	sp	2
$[\text{HgI}_3]^-$	تین سطحی خطی	sp^2	3
$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, $[\text{NiCl}_4]^{2-}$	تین سطحی اہرامی	sp^3	4
$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	چار سطحی مربع سطحی	dsp^2	4
$\text{Fe}(\text{CO})_5$	تین سطحی دو اہرامی	dsp^3 ($d_{x^2-y^2}$ orbital is involved)	5
$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{2-}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (Inner orbital complexes) اندرونی مدار یوں کا مپکلس	آٹھ سطحی	d^2sp^3 (d_{z^2} and $d_{x^2-y^2}$ orbitals are involved) اندرونی مدار یوں کا مپکلس حصہ لیتے ہیں	6
$[\text{FeF}_6]^{4-}$, $[\text{CoF}_6]^{4-}$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (Outer orbital complexes) بیرونی مدار یوں کا مپکلس	آٹھ سطحی	sp^3d^2 (d_{z^2} and $d_{x^2-y^2}$ orbitals are involved) بیرونی مدار یوں کا مپکلس حصہ لیتے ہیں	6

- 7- آٹھ سطحی کا مپکلسوں میں اگر $(n-1)d$ مدار پر اختلاط میں حصے لیتے ہیں تو ان کو اندرونی مدار یوں کا مپکلس (inner orbital complex) یا کم گردش کا مپکلس (low spin complex) یا گردش جوڑی کا مپکلس (spin paired complex) کہا جاتا ہے۔ اگر nd مدار پر اختلاط میں حصہ لیتے ہیں تو اس طرح کے کا مپکلس کو بیرونی مدار یوں کا مپکلس (outer orbital complex) یا ادنی گردش کا مپکلس (high spin complex) یا آزاد گردش کا مپکلس (spin paired complex) کہا جاتا ہے۔ یہاں n بیرون ترین خول کے principal quantum number کو ظاہر کرتا ہے۔
- 8- ان کا مپکلسوں میں غیر گردش دار الیکٹران والا ایک دھاتی جوہر موجود ہوتا ہے۔ اگر الیکٹران جوڑی کی شکل میں موجود ہوں تو کا مپکلس دوہرے مقناطیس (diamagnetic) والا ہوگا۔

9- CO ، CN⁻ ، en اور NH₃ ، جیسے لگینڈ ، اگر ایک کامپلکس میں موجود ہوں اور اگر وہ الیکٹرانوں کی جوڑی رکھتے ہوں تو ان کو طاقتور میدان والے لگینڈ (Strong field ligands) کہا جاتا ہے۔

10- لگینڈ کے مدار پر اور مخلوط دھاتی مدار یوں کے درمیان انطباق (overlap) زیادہ ہو تو بندشی طاقت (bond strength) بھی زیادہ ہوتا ہے۔

درج ذیل مثالوں کی مدد سے آئیے ہم VBT کی وضاحت کریں گے۔

وضاحت 1

کامپلکس	[Ni(CO) ₄]
مرکزی دھاتی جوہر اور اس کی بیرونی الیکٹران کی تشکیل	Ni: 3d ⁸ , 4s ²
دھاتی جوہر/رواں کا بیرونی مدار پر	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ 3d⁸ $\uparrow\downarrow$ 4s²
لگینڈ کی نوعیت	CO طاقتور میدان والے لگینڈ 4s الیکٹرانوں کے ساتھ دھات کے 3d الیکٹرانوں کے ساتھ جوڑی بناتے ہیں۔
لگینڈ کی موجودگی میں دھاتی جوہر/رواں کا بیرونی مدار پر	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ 3d¹⁰ $\uparrow\downarrow$ 4s⁰
اختلاط (Hybridisation)	کوآرڈینیٹیشن عدد-4 اختلاط sp ³
کامپلکس کے دھاتی جوہر کے مخلوط مدار پر	$\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ 3d¹⁰ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ sp³ مخلوط مدار پر
شکل (geometry)	چهار سطحی
مقناطیسی خواص	غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد = 0 چنانچہ یہ دوہری مقناطیست (diamagnetic) ہے۔
مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کا ضابطہ استعمال کرتے ہوئے)	$\alpha_s = \sqrt{n(n+2)} = 0$

وضاحت 2

کمپلکس	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{4-}$																		
مرکزی دھاتی جوہر/رواں اور اس کی بیرونی الیکٹران کی تشکیل	$\text{Ni}^{2+}: 3d^8, 4s^0$																		
مرکزی دھاتی جوہر/رواں کے بیرونی مدارے	<table> <tr> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow$</td> <td>$\uparrow$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">3d⁸</td> <td>4s²</td> <td colspan="2">4p</td> </tr> </table>	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$				3d ⁸					4s ²	4p			
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$															
3d ⁸					4s ²	4p													
لگینڈ کی نوعیت	CN^- طاقتور میدان والے لگینڈ دھات کے 3d الیکٹرانوں کی جوڑی مہیا کرتے ہیں																		
لگینڈ کی موجودگی میں دھاتی جوہر/رواں کا بیرونی مدار یہ	<table> <tr> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">3d⁸</td> <td>4s⁰</td> <td colspan="2">4p⁰</td> </tr> </table>	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$					3d ⁸					4s ⁰	4p ⁰			
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$																
3d ⁸					4s ⁰	4p ⁰													
اختلاط (Hybridisation)	کوآرڈینیٹیشن عدد-4 اختلاط dsp^2																		
کمپلکس کے دھاتی جوہر کے مخلوط مدارے	<table> <tr> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td>$\uparrow\downarrow$</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">3d⁸</td> <td colspan="4">مخلوط مدارے dsp^2</td> <td>$4p_z^0$</td> </tr> </table>	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$		3d ⁸				مخلوط مدارے dsp^2				$4p_z^0$
$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$												
3d ⁸				مخلوط مدارے dsp^2				$4p_z^0$											
شکل (geometry)	مربع سطحی																		
مقناطیسی خواص	غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد = 0 چنانچہ یہ دوہری مقناطیست (diamagnetic) ہے۔																		
مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کا ضابطہ استعمال کرتے ہوئے)	$\alpha_s = \sqrt{n(n+2)} = 0$																		



وضاحت 3

کمپلکس	[Fe(CN) ₆] ³⁻																				
مرکزی دھاتی جوہر/رواں اور اس کی بیرونی الیکٹرانیک تشکیل	Fe ³⁺ : 3d ⁵ , 4s ⁰																				
مرکزی دھاتی جوہر/رواں کے بیرونی مدارے	<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr><tr><td colspan="5">3d⁵</td></tr></table>	↑	↑	↑	↑	↑	3d ⁵					<table><tr><td></td></tr><tr><td>4s⁰</td></tr></table>		4s ⁰	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">4p⁰</td></tr></table>				4p ⁰		
↑	↑	↑	↑	↑																	
3d ⁵																					
4s ⁰																					
4p ⁰																					
لگینڈ کی نوعیت	CN ⁻ طاقتور میدان والے لگینڈ دھات کے 3d الیکٹرانوں کی جوڑی مہیا کرتے ہیں																				

کمپلکس	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
لگینڈ کی موجودگی میں دھاتی جوہر/رواں کا بیرونی مدار یہ	$3d^5$ $4s^0$ $4p^0$
اختلاط (Hybridisation)	کوآرڈینییشن عدد-6 اختلاط d^2sp^3
کمپلکس کے دھاتی جوہر کے مخلوط مدار یہ	$3d^5$ d^2sp^3 مخلوط مدار یہ
شکل (geometry)	آہٹ سطحی اس کمپلکس میں اندرونی d مدار یہ، اختلاط میں حصہ لیتا ہے، لہذا یہ کمپلکس اندرونی مدار یہ کا کمپلکس کہلاتا ہے۔
مقناطیسی خواص	غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد = 1 چنانچہ یہ اکہری مقناطیسی خاصیت رکھتا (paramagnetic) ہے۔
مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کا ضابطہ استعمال کرتے ہوئے)	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{1(1+2)} = 1.732 \text{ BM}$

وضاحت 4

کمپلکس	$[\text{CoF}_6]^{3-}$
مرکزی دھاتی جوہر/رواں اور اس کی بیرونی الیکٹران کی تشکیل	$\text{Co}^{3+}: 3d^6, 4s^0$
مرکزی دھاتی جوہر/رواں کے بیرونی مدار یہ	$3d^6$ $4s^0$ $4p$
لگینڈ کی نوعیت	F^- کمزور میدان والے لگینڈ دھات کے 3d الیکٹرانوں کی جوڑی نہیں بنتی
لگینڈ کی موجودگی میں دھاتی جوہر/رواں کا بیرونی مدار یہ	$3d^6$ $4s^0$ $4p^0$ $4d^0$
اختلاط (Hybridisation)	کوآرڈینییشن عدد-6 اختلاط sp^3d^2

کامپلکس	$[\text{CoF}_6]^{3-}$
کامپلکس کے دھاتی جوہر کے مخلوط مدارے	 3d⁶  sp³d² مخلوط مدارے  4d⁰
شکل (geometry)	آٹھ سطحی اس کامپلکس میں بیرونی d مدار یہ اختلاط میں حصہ لیتا ہے، لہذا اس کامپلکس کو بیرونی مدار یہ کامپلکس کہتے ہیں۔
مقناطیسی خواص	غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد = 4 چنانچہ یہ اکہری مقناطیسی خاصیت (diamagnetic) رکھتا ہے۔
مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کا ضابطہ استعمال کرتے ہوئے)	$\alpha_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{4(4+2)} = 4.899 \text{ BM}$

VBT کی حد بندیاں

حالانکہ VBT، کامپلکسوں کے کئی مشاہدہ کردہ خواص کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی کئی حد بندیاں ہیں۔

- 1- یہ کامپلکسوں کے رنگوں کے بارے میں وضاحت نہیں کرتا۔
- 2- یہ صرف مقناطیسی معیار حرکت کی صرف گردش کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور دیگر مقناطیسی معیار حرکت کے بارے میں وضاحت نہیں کرتا۔
- 3- یہ اس بات کی مقداری وضاحت نہیں کرتا کہ کیوں ایک ہی دھات کے بعض کامپلکس اندرونی مدار یوں والے اور بعض بیرونی مدار یوں والے ہیں۔
مثال کے طور پر $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ دوہری مقناطیسی (کم گردش والا) جب کہ $[\text{FeF}_6]^{4-}$ اکہری مقناطیسی (اعلیٰ گردش والا) ہے۔

خود کا محاسبہ 7 :

7- Tetrachloridomanganate(II)ion کی صرف گردش والی معیار حرکت 5.9 BM ہے۔ VBT کی بنیاد پر، اس مرکب کے اختلاط کی قسم اور شکل کی پیشین گوئی کیجئے۔

8- VBT کی بنیاد پر $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ میں غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کے تعداد کی پیشین گوئی کیجئے۔

9- ایک دھاتی کامپلکس جس کی ترکیب $\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2\text{Br}$ ہے، اس کو دو قسموں A اور B کی طرح جدا کیا گیا ہے۔ Silver Nitrate کے ساتھ B تعامل پا کر ایک سفید رسوب دیتا ہے جو امونیم ہائڈروآکسائیڈ میں فوری طور پر حل ہوتا ہے۔ جب کہ A ایک ہلکا زرد رسوب دیتا ہے A اور B کا ضابطہ لکھئے۔ ہر ایک میں Co کی مخلوطیت بیان کیجئے اور ان کی صرف گردش مقناطیسی معیار حرکت بیان کیجئے۔

5.6.2 کرسٹل فیلڈ کا نظریہ (CFT) (Crystal field theory)


کامپلکسوں میں بندش کے طریقہ کی وضاحت VBT نے کی ہے، تاہم اس میں بھی بعض حد بندیاں ہیں۔ لہذا CFT نے ان میں سے بعض خواص جیسے رنگ، مقناطیسی طرز عمل وغیرہ کی وضاحت کی ہے۔ اس نظریے کو ابتدا میں روانی قلموں میں بندش کے نوعیت کی وضاحت کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے موری/عبوری عناصر اور ان کے کامپلکسوں کے خواص کی وضاحت کے لئے استعمال کیا گیا۔ اس کے اہم خواص اس طرح ہیں۔

1- CFT یہ فرض کرتی ہے کہ لگینڈ اور مرکزی دھاتی رواں کے درمیانی بندش خالص روانی ہے۔ یعنی الیکٹران سے بھرپور لگینڈ اور الیکٹران کی کمی والے دھات کے درمیان برق سکونی کشش کی وجہ سے بندش بنتی ہے۔

2- کوآرڈینیشن کے مرکبات میں مرکزی دھاتی جوہر/رواں اور لگینڈ کو نقطہ نما بار (point charges) (بار بردار دھاتی رواں یا لگینڈ کی صورت میں) یا برقی قطبین (electric dipoles) (دھاتی جوہر یا تعدیلی لگینڈ کی صورت میں) فرض کیا گیا ہے۔

3- CFT کے مطابق کامپلکس کے بننے کی وضاحت درج ذیل فرضی مرحلوں کے سلسلے سے کی گئی ہے۔

مرحلہ 1: ایک علحدہ کیسی حالت میں مرکزی دھاتی جوہر کے رواں کے تمام 5d مدار یہ زوال پذیر (degenerate) ہیں۔ ابتدا میں لگینڈ، دھات کے اطراف منفی بار کا ایک دائرہ نما میدان بناتے ہیں۔ دھات اور لگینڈ کے درمیان قوت دفع کی وجہ سے اس میدان میں تمام 5d کے دراویوں کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔



مرحلہ 2: دھاتی جوہر کی طرف لگینڈ حقیقی بندش بننے کی جگہ پر متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لئے ایک آٹھ سطحی میدان کو فرض کیجئے، جس میں مرکزی دھاتی رواں مبدا پر ہے اور یہ چھ لگینڈ +z, -y, +y, -x, +x اور -z کی سمتوں (محوروں) سے مبدا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔


خاکہ 5.9 آٹھ سطحی لگینڈ کا میدان

جیسا کہ خاکہ میں دکھایا گیا ہے، dx^2-y^2 اور dz^2 محوروں میں پائے جانے والے مدار یے زیادہ قوت دفع محسوس کرتے ہیں اور اپنی توانائی d_{zx} ، d_{yz} ، d_{xy} کی نسبت زیادہ رکھتے ہیں۔ لہذا زوال پذیر d مدار یہ اب شق ہو کر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور اس عمل کو کرسٹل فیلڈ شق (Crystal field splitting) کہا جاتا ہے۔

مرحلہ 3: اس مرحلہ تک کامپلکس بننے کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تاہم جب لگینڈ مزید قریب آتا ہے تو منفی بار بردار الیکٹرانوں اور دھات کے مثبت روانوں کے درمیان قوت کشش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جملہ توانائی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ توانائی کی یہ کمی کی وجہ سے کامپلکس بننے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔


آٹھ سطحی کامپلکسوں میں کرسٹل فیلڈ کی شق (Crystal field splitting in octahedral complexes)

ایک آٹھ سطحی میدان میں، کرسٹل فیلڈ کی شق کے دوران، مدار یوں میں اوسط توانائی کو برقرار رکھنے (bary centre) یعنی مستقل رکھنے کے لئے dx^2-y^2 اور dz^2 (انہیں e_g مدار یوں کی طرح نمائندگی کی جاتی ہے) مدار یوں کی توانائی میں $3/5\Delta_o$ کا اضافہ ہوتا ہے، جب کہ دیگر تین مدار یوں یعنی d_{zx} ، d_{yz} ، d_{xy} (انہیں t_{2g} مدار یوں کی طرح نمائندگی کی جاتی ہے) میں $2/5\Delta_o$ کی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر Δ_o ، آٹھ سطحی میدان میں crystal field splitting energy کی نمائندگی کرتی ہے۔




خاکہ 5.10 ایک آٹھ سطحی کے میدان میں کرسٹل فیلڈ کا شق ہونا

سہ پہلو اہرامی (چار سطحی) کامپلکسوں میں کرسٹل فیلڈ کا شق ہونا (Crystal field splitting in tetrahedral complexes)



ایک سہ پہلو اہرامی (tetrahedon) کے میدان میں لگینڈوں کے قریب آنے کی منظر کشی اس طرح کی جاسکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک مکعب جس میں مرکزی دھاتی جوہر کو اس کے مرکز (یعنی محدودوں کے مبداء میں رکھا گیا ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے) میں رکھا گیا ہے۔ چار لگینڈ مرکزی دھاتی جوہر کی طرف اس کے اہم وتروں کی سمت میں بڑھتے ہیں، جو مکعب میں ایک کے بعد (alternate) موجود ہیں۔

خاکہ 5.11 سہ پہلو اہرامی شکل میں لگینڈ کا میدان




خاکہ 5.12 سہ پہلو اہرامی شکل کے لگینڈ کا میدان میں d-مداریے

درمیان CFSE کرشل فیلڈ شق ہونے کی توانائی کے تعلق کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے۔ $\Delta t = 4/9 \Delta o$

اس میدان میں، کوئی بھی d مدار، لگینڈ کی طرف براہ راست اشارہ نہیں کر رہا ہے، تاہم t_2 مدار e مداروں کی بہ نسبت اشارہ کر رہے ہیں، جدھر سے لگینڈ قریب آرہے ہیں، یعنی (dxz, dyz, dxy) کی طرف۔

اس کے نتیجے میں t_2 مداروں کی توانائی $2/5 \Delta t$ سے بڑھتی ہے اور e مداروں کی توانائی $3/5 \Delta t$ سے کم ہوتی ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ جب آٹھ سطحی کا موازنہ کیا جائے تو یہ شق (splitting) الٹ ترتیب میں ہے اور شق ہونے کی توانائی کم ہے۔ آٹھ سطحی اور سہ پہلو اہرامی کے لگینڈ کے میدان کے



خاکہ 5.13 ایک سہ پہلو اہرامی شکل کے میدان میں کرشل فیلڈ کا شق ہونا

کرشل فیلڈ کے شق ہونے کی توانائی اور لگینڈ کی نوعیت

کرشل فیلڈ کے شق ہونے کی قدر، نہ صرف لگینڈ کے میدان پر منحصر ہے، بلکہ لگینڈ کی نوعیت، مرکزی دھاتی جوہر/رواں اور اس کے بار پر بھی منحصر ہے۔ titanium (III) کے آٹھ سطحی کمپلکس کے ساتھ مختلف لگینڈ جیسے فلورائیڈ، بروائیڈ، اور پانی کے ساتھ، ان کے جذب کردہ طیفی معطیات (absorption spectral data) کی مدد سے کرشل فیلڈ کے شق ہونے کی توانائی محسوب کی جاسکتا ہے۔ اس کی مدد سے لگینڈ کی نوعیت کا کرشل فیلڈ کے شق ہونے کے اثر کو سمجھ سکتے ہیں۔

کمپلکس $[\text{TiBr}_6]^{3-}$ ، $[\text{TiF}_6]^{3-}$ اور $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ کے جذب شدہ موجی اعداد بالترتیب 12500، 19000 اور 20000 cm^{-1} ہیں۔ روشنی کی جذب شدہ موجی اعداد سے متعلق توانائی، اور کرشل فیلڈ شق توانائی (Δ) کا تعلق اس جملہ سے دیا گیا ہے۔

$$\Delta = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

جس میں h ، پلانک کا مستقل؛ c روشنی کی رفتار اور ν زیادہ سے زیادہ جذب شدہ موجی عدد ہے، جو $1/\lambda$ کے برابر ہے۔

$[\text{TiBr}_6]^{3-}$	$[\text{TiF}_6]^{3-}$	$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
$\Delta = hc\bar{\nu}$	$\Delta = hc\bar{\nu}$	$\Delta = hc\bar{\nu}$
$= (6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$ $\times (3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1})$ $\times (12500 \times 10^2 \text{ m}^{-1})$ $= 248475 \times 10^{-24} \text{ J}$ $= 2.48 \times 10^{-22} \text{ kJ}$	$= (6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$ $\times (3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1})$ $\times (19000 \times 10^2 \text{ m}^{-1})$ $= 377682 \times 10^{-24} \text{ J}$ $= 3.78 \times 10^{-22} \text{ kJ}$	$= (6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$ $\times (3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1})$ $\times (20000 \times 10^2 \text{ m}^{-1})$ $= 397560 \times 10^{-24} \text{ J}$ $= 3.98 \times 10^{-22} \text{ kJ}$
فی مول کی بنیاد پر Δ کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو اووگا ڈرو عدد کے ساتھ ضرب کریں۔	فی مول کی بنیاد پر Δ کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو اووگا ڈرو عدد کے ساتھ ضرب کریں۔	فی مول کی بنیاد پر Δ کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو اووگا ڈرو عدد کے ساتھ ضرب کریں۔
$= (2.48 \times 10^{-22} \text{ kJ})$ $\times (6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$ $= 149.4 \text{ kJ mol}^{-1}$	$= (3.78 \times 10^{-22} \text{ kJ})$ $\times (6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$ $= 227.7 \text{ kJ mol}^{-1}$	$= (3.98 \times 10^{-22} \text{ kJ})$ $\times (6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$ $= 239.7 \text{ kJ mol}^{-1}$

اوپر کے حسابات سے یہ واضح ہوا کہ Ti^{3+} کمپلکسوں کے لگینڈوں میں CFSE کی ترتیب اس طرح ہے۔ $\text{Br}^- < \text{F}^- < \text{H}_2\text{O}$ اسی طرح طیف کی معطیات (spectral data) سے یہ معلوم کیا گیا ہے کہ دھاتی روانوں میں کرشل فیلڈ کے شق ہونے کی طاقت اس ترتیب میں ہے۔



اوپر کا سلسلہ spectrochemical series کہلاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے جانب موجود

آٹھ سطحی کمپلکس میں الیکٹرانوں کی تقسیم (Distribution of electrons in octahedral complexes)

لگینڈ کی موجودگی میں d مدارے میں الیکٹرانوں کی بھرتی، ہنڈس کے اصول (Hund's rule) کے مطابق ہوتی ہے۔ آٹھ سطحی کمپلکس جس میں d^2 اور d^3 الیکٹرانوں کی تشکیل پائی جاتی ہے، وہ مختلف t_{2g} کے زوالی مدارے (degenerate orbitals) رکھتے ہیں اور وہ غیر جوڑی دار رہتے ہیں۔ d^4 کی تشکیل میں دو ممکن ترتیب ہو سکتے ہیں۔ چوتھا الیکٹران e_g مدارے میں اعلیٰ توانائی تک پہنچتا ہے یا یہ t_{2g} کے کسی ایک الیکٹران کے ساتھ جوڑی بنا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تشکیل کے لئے تشکیل اسے دی جائے گی جس میں کم توانائی پائی جاتی ہو۔

اگر آٹھ سطحی کرشل فیلڈشک کی توانائی (Δ_o) ، جوڑی بننے کی توانائی (P) سے زیادہ ہو تو، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک مدارے میں الیکٹرانوں کی جوڑی بنے، تو چوتھا الیکٹران t_{2g} کے ایک الیکٹران کے ساتھ جوڑی بنائے گا۔ اس کے برخلاف اگر $\Delta_o < P$ سے کم ہو تو چوتھا الیکٹران اعلیٰ توانائی والے زوالی مدارے e_g کو پُر کرے گا۔

مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ دو مختلف Iron (III) کے کمپلکس $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (کمزور میدان والا کمپلکس، Δ_o سے متعلق موجب عدد 14000 cm^{-1} ہے) اور $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ (طاقتور میدان والا کمپلکس، Δ_o سے متعلق موجب عدد 35000 cm^{-1} ہے)۔ جوڑی بننے کے لئے Fe^{3+} کی توانائی 30000 cm^{-1} ہے۔ دونوں کمپلکسوں میں Fe^{3+} میں d_5 الیکٹرانوں کی تشکیل ہے۔ اکوا کمپلکس میں $\Delta_o < P$ ہے۔ چنانچہ چوتھے اور پانچویں الیکٹران e_g مدارے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی تشکیل t_{2g}^3, e_g^2 ہے۔ Cyanido کمپلکس میں $\Delta_o > P$ ہے، اس لئے چوتھے اور پانچویں الیکٹران t_{2g} کے الیکٹرانوں کے ساتھ جوڑی بناتے ہیں اور ان کی الیکٹرانوں کی تشکیل t_{2g}^3, e_g^2 ہے۔

الیکٹرانوں کی حقیقی تقسیم کی یقین دہانی کے لئے کرشل فیلڈ کی استحکامی توانائی (CFSE) (Crystal field stabilisation energy) محسوب کی جاتی ہے۔ CFSE کی وضاحت اس طرح سے کی جاسکتی ہے کہ لگینڈ کے میدان (E_{LF}) اور ہم رُخی میدان (Isotropic field) کے درمیان الیکٹرانوں کی تشکیل میں توانائی کا فرق ہے۔

$$\text{CFSE } (\Delta E_o) = \{E_{LF}\} - \{E_{iso}\}$$

$$= \{[n_{t_{2g}}(-0.4) + n_{e_g}(0.6)] \Delta_o + n_p P\} - \{n'_p P\}$$

یہاں پر $n_{t_{2g}}$ کا مطلب t_{2g} مداروں میں الیکٹرانوں کی تعداد، n_{e_g} کا مطلب e_g مداروں میں الیکٹرانوں کی تعداد، n_p کا مطلب لگینڈ کے میدان میں الیکٹران کے جوڑیوں کی تعداد ہے اور n'_p کا مطلب ہم رُخی میدان (isotropic field/barycentre) میں الیکٹران کے جوڑیوں کی تعداد ہے۔

Iron کے کمپلکس کے لئے CFSE محسوب کرنا

کمپلکس $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

اعلیٰ گردش والے کمپلیکس	کم گردش والے کمپلیکس					
d^5 : ہم رُخی میدان (Isotropic field) میں الیکٹرانوں کی تشکیل						
<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr></table>		↑	↑	↑	↑	↑
↑	↑	↑	↑	↑		
جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد $(n'p)=0$ ہے، چنانچہ $E_{iso} = 0$ ہے۔						

High Spin Complex اعلیٰ گردش والے کمپلکس	Low spin complex کم گردش والے کمپلکس
الکٹرائی تشکیل (اعلیٰ گردش والے کمپلکسوں کے لئے) : $t_{2g}^3 e_g^2$ CFSE = $\{[3(-0.4)+2(0.6)] \Delta_o + 0 \times P\} - \{0\}$ = 0	الکٹرائی تشکیل (کم گردش والے کمپلکسوں کے لئے) : $t_{2g}^5 e_g^0$ CFSE = $\{[5(-0.4)+0(0.6)] \Delta_o + 2 \times P\} - \{0\}$ = $-2 \Delta_o + 2P$ = $(-2 \times 14000) + (2 \times 30000)$ = 32000 cm^{-1} اعلیٰ مثبت CFSE کی قیمت یہ بتاتی ہے کہ کم گردش والے کمپلکس موزوں نہیں ہے۔
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ کی حقیقی نوعیت	اعلیٰ گردش (گردش سے آزاد)
مرکزی دھاتی رواں کی الکٹرائی تشکیل	$t_{2g}^3 e_g^2$
مقناطیسی خواص	5 = غیر جوڑی دار الکٹرانوں کی تعداد لہذا یہ اکہرے مقناطیسیت رکھتے ہیں۔
مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کے ضابطہ کو استعمال کرتے ہوئے)	$\alpha_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{5(5+2)} = 5.916 \text{ BM}$


کمپلکس $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

اعلیٰ گردش والے کمپلکس	کم گردش والے کمپلکس
د⁵ : ہم رُخی میدان (Isotropic field) میں الکٹرائی تشکیل جوڑی دار الکٹرانوں کی تعداد (n'p)=0 ہے، چنانچہ $E_{\text{iso}} = 0$ ہے۔	↑ ↑ ↑ ↑ ↑
لگینڈ کا میدان الکٹرائی تشکیل : $t_{2g}^3 e_g^2$ CFSE = $\{[3(-0.4)+2(0.6)] \Delta_o + 0 \times P\} - \{0\}$ = 0	لگینڈ کا میدان الکٹرائی تشکیل : $t_{2g}^5 e_g^0$ CFSE = $\{[5(-0.4)+0(0.6)] \Delta_o + 2 \times P\} - \{0\}$ = $-2 \Delta_o + 2P$ = $(-2 \times 35000) + (2 \times 30000)$ = -10000 cm^{-1} منفی CFSE کی قیمت یہ بتاتی ہے کہ کم گردش والے کمپلکس موزوں ہیں۔

کم گردش (جوڑی دار گردش)	کمپلکس کی نوعیت
$t^5_{2g} e^0_g$	مرکزی دھاتی رواں کی الیکٹرانیک تشکیل
1 = غیر جوڑی دار الیکٹرانوں کی تعداد لہذا یہ اکہرے مقناطیسیت رکھتے ہیں۔	مقناطیسی خواص
$\alpha_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{1(1+2)} = 1.732 \text{ BM}$	مقناطیسی معیار حرکت (صرف گردش کے ضابطہ کو استعمال کرتے ہوئے)

کمپلکس کا رنگ اور کرشل فیلڈ شق ہونے کی توانائی

(Colour of the complex and crystal field splitting energy)



خاکہ 5.15 رنگین پہیہ
مخالف جانب تکمیلی رنگ بتائے گئے ہیں


اکثر مروری/عبوری دھاتوں کے کمپلکس رنگین ہیں۔ ایک شے اُسی وقت رنگین ہو سکتی ہے، جب وہ کسی مخصوص مرئی علاقے میں موجی طول کی روشنی کو جذب کرتی ہے۔ جب یہ منعکس روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اس رنگ کی شناخت کرتا ہے۔ منعکس شدہ روشنی، جذب شدہ روشنی کا تکمیلی رنگ

(complementary colour) ہے۔ مثال کے طور پر، آبیہ کا پر (II) کا رواں نیلے رنگ کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نارنجی رنگ کو جذب کرتا ہے اور اپنے تکمیلی نیلے رنگ کو منعکس کرتا ہے۔ درج ذیل جدول میں جذب شدہ موجی طور اور ان کے تکمیلی رنگوں کو دیا گیا ہے۔

مشاہدہ کردہ رنگ	جذب شدہ روشنی کا رنگ	جذب شدہ روشنی کا موجی عدد (cm^{-1}) (ν)	جذب شدہ روشنی کا موجی طول ($\text{\AA}$) (λ)
زرد	بنفشی	25000	4000
نارنجی	نیلا	21053	4750
سرخ	سبز	19608	5100
بنفشی	زرد	17544	5700
نیلا	نارنجی	16949	5900
سبز	سرخ	15385	6500

کرشل فیلڈ کے نظریہ کی مدد سے کوآرڈینییشن کے مرکبات کے مشاہدہ کردہ رنگوں کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ ہم نے جانا کہ لکیڈ کا میدان، مرکزی دھاتی جوہر کے d مداروں کو دو حصوں میں (t_{2g} اور e_g) شق کرتا ہے۔ جب روشنی کمپلکس کے رواں پر گرتی ہے تو مرکزی دھاتی رواں، اس کی بالترتیب کرشل فیلڈ شق کی توانائی کے مطابق مرئی روشنی کو جذب کرتا ہے اور باقی روشنی کو منعکس کر دیتا ہے، جو اس کمپلکس کے رنگ کی وجہ ہے۔

یہ جذب کاری مرکزی دھاتی رواں کے d الیکٹرانوں کو کم توانائی کی سطح t_{2g} سے اعلیٰ توانائی کی سطح e_g تک مشتعل کرتی ہے، جس کو d-d transition (تبدیلی) کہا جاتا ہے۔



آئیے $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ کو بطور مثال لیتے ہوئے d-d تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کمپلکس میں مرکزی دھاتی رواں Ti^{3+} ہے، جس کی الیکٹرانی تشکیل d_1 ہے۔ یہ واحد الیکٹران اکوا (aqua) لگینڈ کے میدان کے آٹھ سطحی میں t_{2g} کے ایک مدار پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب روشنی اس کمپلکس پر گرتی ہے تو d الیکٹران روشنی کو جذب کر کے e_g سطح پر لے جاتا ہے۔ طیفی معطیات بتاتے ہیں کہ 20000 cm^{-1} پر زیادہ سے زیادہ جذب کاری ہوتی ہے، کرسٹل فیلڈ شق توانائی (Δ_o) کے لحاظ سے جو 239.7 kJ mol^{-1} ہے۔ اس جذب کاری میں منعکس شدہ رنگ بنفسی ہے، لہذا اس کمپلکس کا رنگ بنفسی ہے۔

دیگر لگینڈ جیسے برومائڈ اور فلورائڈ کے ساتھ آٹھ سطحی

titanium(III) کے کمپلکسوں میں مختلف رنگ دیتے ہیں۔ یہ لگینڈ کی مختلف کرسٹل فیلڈ شق کی توانائی کے قدر کے فرق کی وجہ سے ہے۔ (صفحہ 156 ملاحظہ ہو)۔ تاہم $Sc^{3+}, Ti^{4+}, Cu^+, Zn^{2+}, \dots$ جیسے مرکزی دھاتی جوہر کے کمپلکس بے رنگ ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ d_0 یا d_{10} الیکٹرانی تشکیل والے مرکزی دھاتوں کے کمپلکسوں میں d-d تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

خود کا محاسبہ 8 :

- 11- $[Mn(CN)_6]^{3-}$ کی اوسط جوڑی بننے کی توانائی (pairing energy) اور آٹھ سطحی شق توانائی بالترتیب 28800 cm^{-1} اور 38500 cm^{-1} ہے۔ معلوم کیجئے کہ یہ کمپلکس کم گردش میں یا اعلیٰ گردش میں مستحکم (قیام پذیر) ہے؟
- 12- کمپلکس $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ کے لئے توانائی کی سطح کا خاکہ بنائیے اور ہر سطح میں موجود الیکٹرانوں کی تعداد بتائیے۔ معلوم کیجئے کہ یہ کمپلکس اکہری مقناطیسیت رکھتا ہے یا دوہری مقناطیسیت؟
- 13- $[CoF_6]^{3-}$ رواں کے لئے اوسط جوڑی بننے کی توانائی 21000 cm^{-1} پائی گئی ہے۔ Δ_o کی قدر 13000 cm^{-1} ہے۔ اس کمپلکس کے لئے کم گردش اور اعلیٰ گردش کے لحاظ سے CFSE محسوب کیجئے۔

دھاتی کاربونیل (Metallic carbonyls)

کاربن مونو آکسائیڈ کے مروری/عبوری دھاتی کمپلکس دھاتی کاربونیل کہلاتے ہیں، جن میں دھات-کاربن بندش ہوتی ہے۔ ان کمپلکسوں میں CO کا سالمہ ایک تعدیلی لگینڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک ہی قسم کے لگینڈ والے کاربونیل (homoleptic carbonyl) $[Ni(CO)_4]$ کو سب سے پہلے 1890 میں Mond نے رپورٹ کیا۔ صنعتی اہمیت، تھامسی خواص اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے خارج کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے دھاتی کاربونیل کا بہت وسیع مطالعہ کیا گیا۔

درجہ بندی :

عام طور پر کاربونیل کو دو مختلف طریقوں سے درجہ بندی کی گئی ہے، جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔

(i) دھاتی جوہروں کے تعداد کی موجودگی کی بنیاد پر درجہ بندی

دئے گئے دھاتی کاربونیل میں دھاتی جوہروں کے تعداد کی موجودگی کی بنیاد پر انہیں اس طرح درجہ بند کیا گیا ہے۔

a- یک مرکزی کاربونیل (mononuclear carbonyls)

ان مرکبات میں صرف ایک ہی دھاتی جوہر ہوتا ہے اور ان کی ساخت سادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر

Nickel tetracarbonyl $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ سہ پہلو اہرامی، Iron pentacarbonyl $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ سہ پہلوئی دواہرامی اور

Chromium hexacarbonyl $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ آٹھ سطحی ہے۔

b- کثیر مرکزی کاربونیل (poly nuclear carbonyls)

دھاتی کاربونیل جن میں دو یا دو سے زیادہ دھاتی جوہر موجود ہوں، ان کو کثیر جوہری کاربونیل کہا جاتا ہے۔

کثیر جوہری کاربونیل یا تو ہم مرکزی (homonuclear) $([\text{Co}_2(\text{CO})_8], [\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}], [\text{Fe}(\text{CO})]_{12})$ یا

دگر مرکزی (hetero nuclear) $([\text{MnCo}(\text{CO})_9], [\text{MnRe}(\text{CO})_{10}])$ وغیرہ ہیں۔

(ii) ساخت کی بنیاد پر درجہ بندی (Classification based on the structure)

دو مرکزی دھاتی کاربونیل کی ساخت یا تو دھات-دھات کے ساتھ بندش یا CO کے ساتھ بندھی ہوتی ہے یا دونوں قسم سے ہوتی ہے۔ وہ

کاربونیل کے لگینڈ جو صرف ایک دھاتی جوہر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اخروی (terminal) کاربونیل گروپ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ



جو دو دھاتی جوہروں کے ساتھ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پل شدہ کاربونیل (bridging carbonyls) کہتے ہیں۔ ساخت

کی بنیاد پر دھاتی کاربونیل کو اس طرح درجہ بند کیا گیا ہے۔

a- غیر پل شدہ دھاتی کاربونیل (non-bridged metal carbonyls)

یہ دھاتی کاربونیل میں کوئی پل شدہ کاربونیل لگینڈ نہیں ہوتا۔ یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔


(i) غیر پل شدہ (non-bridged) دھاتی کاربونیل جس میں صرف اخروی کاربونیل (terminal carbonyl) ہوتے ہیں۔ مثال:



(ii) غیر پل شدہ دھاتی کاربونیل جس میں اخروی کاربونیل کے ساتھ دھات-دھات بندش موجود ہو۔ مثال کے طور پر، $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ کی

ساخت میں حقیقت میں صرف ایک دھات-دھات بندش ہے۔ لہذا ضابطہ کو زیادہ درست طور پر اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔






اس قسم کی دیگر مثالیں $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$ اور $\text{Tc}_2(\text{CO})_{10}$ ہیں۔



b۔ پل شدہ کاربونیل (bridged carbonyls)

ان دھاتی کاربونیل میں ایک یا ایک سے زیادہ پل شدہ کاربونیل لگائیڈ پائے جاتے ہیں، جن میں اخروی کاربونیل لگائیڈ اور ایک یا ایک سے زیادہ دھات-دھات بندش پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر:

(i) $\text{di-iron nona carbonyl Fe}_2(\text{C})_9$ سالمہ کی ساخت میں تین پل شدہ CO لگائیڈ اور چھ اخروی CO گروپ موجود ہیں۔



(ii) $\text{dicobaltoctacarbonyl Co}_2(\text{CO})_8$ میں دو ہم ترکیبے ممکن ہیں۔ ایک میں دو کوبالٹ کے جوہروں کے درمیان دھات-دھات لگائیڈ اور دیگر میں دو پل شدہ CO کے لگائیڈ پائے جاتے ہیں۔




دھاتی کاربونیل میں بندش (Bonding in metal carbonyls)

دھاتی کاربونیل میں دھاتی جوہر اور کاربونیل لگائیڈ کے درمیان بندش کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کاربونیل کے لگائیڈ کے کاربن کے جوہر سے

کاربن کی ایک جوڑی کا مرکزی دھاتی جوہر کے خالی d مدار یہ کو عطا کرنا ہے۔ الیکٹران کی اس جوڑی کا عطا کرنا $\text{CO} \leftarrow \text{M}$ سگما بندش بناتا ہے۔ سگما بندش بننے سے دھات کے d مدار یہ میں الیکٹران کی کثافت بڑھتی ہے اور دھات میں الیکٹران زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الیکٹران کی اس کثافت کو متوازن کرنے کے لئے، دھات کا ایک بھرتی شدہ d مدار یہ کاربونیل لگائیڈ کے خالی π^* کے مدار یہ کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور الیکٹران کی

اس کثافت کو واپس لگینڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ π -back bonding (پچھلی بندش) کہلاتا ہے۔ چنانچہ دھاتی کاربونیل میں الیکٹران کی کثافت لگینڈ سے دھات کی طرف سگما بندش کے ذریعہ حرکت کرتی ہے اور دھات سے لگینڈ کی طرف π بندش سے ہوتی ہے۔ دونوں کا یہ باہمی اثر (synergic effect) کہلاتا ہے۔ یہی دھاتی کاربونیل میں طاقتور $M \leftarrow CO$ بندش کا ذمہ دار ہے۔ اس ٹرکو تصوری طور پر اس طرح پیش کیا گیا ہے۔




5.7 دھاتی کمپلکس کا استحکام (قیام پذیری) (Stability of metal complexes)

کوآرڈینییشن کے کمپلکسوں کی قیام پذیری (استحکام) کو دو مختلف طریقوں سے تشریح کی جاسکتی ہے۔ پہلی حرارتی قیام پذیری اور دوسری حرکی (فعلی) قیام پذیری ہے۔ ایک کوآرڈینییشن کمپلکس کی حرارتی قیام پذیری، ایک کمپلکس کے بننے کے تعامل کے آزاد توانائی کی تبدیلی (ΔG) کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک کوآرڈینییشن کمپلکس کی فعلی استحکام (قیام پذیری) لگینڈ کے تبادلہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں کمپلکس، فوری لگینڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایسے کمپلکسوں کو نامستحکم کمپلکس labile complexes کہا جاتا ہے۔ تاہم بعض کمپلکس لگینڈ کا تبادلہ آہستہ سے کرتے ہیں (یا بعض اوقات تبادلہ ہی نہیں ہوتا)، ایسے کمپلکس جامد (غیر تعامل پذیر) کمپلکس کہلاتے ہیں۔

استحکام کا مستقلہ (β) (stability complex)

ایک لگینڈ کے دوسرے لگینڈ کے تبادلہ کے دوران، ایک مزاحمت کی پیمائش ہی ایک کوآرڈینییشن کمپلکس کی قیام پذیری (استحکام) کہلاتی ہے۔ توازن کے دوران دو انواع کے شمولیت کے درجہ کو کمپلکس کی قیام پذیری کہتے ہیں۔ آئیے درج ذیل کمپلکس کی تشکیل کے تعامل کو فرض کریں۔




$$\beta = \frac{[Cu(NH_3)_4]^{2+}}{[Cu^{2+}][NH_3]^4} \quad \text{----- (1)}$$

لہذا $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ کا ارتکاز، کمپلکس کے قیام پذیری کی قیمت بڑھتی ہے، چنانچہ قیام پذیری کے مستقلہ کی قیمت زیادہ ہونے پر کمپلکس کی قیام پذیری بھی بڑھتی ہے۔

عام طور پر کوآرڈینییشن کمپلکس اپنے محلولوں میں قیام پذیر ہیں۔ تاہم کمپلکس کارواں بہت ہی کم تحلیل پاتا ہے۔ تحلیل کی شرح دھات-لگینڈ بندش کی طاقت پر منحصر ہے۔ $M \leftarrow L$ کی طاقت زیادہ ہو تو، تحلیل کم ہی ہوگی۔

آبی محلولوں میں جب کمپلکس کے رواں تحلیل پاتے ہیں تو غیر تحلیل پذیر کمپلکس اور تحلیل پذیر روانوں کے درمیان توازن پایا جاتا ہے۔ لہذا دھاتی کمپلکسوں کی قیام پذیری کو تحلیل کا توازن مستقلہ (dissociation equilibrium constant) یا غیر قیام پذیری کا مستقلہ (instability constant) (α) کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آبی محلول میں $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ کی تحلیل پذیری کو فرض کریں۔



$$\alpha = \frac{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} \quad \text{----- (2)}$$

(1) اور (2) سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحلیل کا توازن مستقلہ کو تشکیل کا توازن مستقلہ یا قیام پذیری کا مستقلہ (β) کہتے ہیں۔

$$\beta = \left(\frac{1}{\alpha} \right)$$

قیام پذیری کے مستقلوں کی اہمیت (Significance of stability constants)

کوآرڈینیشن کے کمپلکس کی قیام پذیری (استحکام) کی پیمائش اس کے قیام پذیری کے مستقلہ (β) سے کی جاتی ہے۔ ایک کمپلکس کے رواں کے قیام پذیری کے مستقلہ کی قیمت زیادہ ہو تو، کمپلکس کے رواں کی قیام پذیری بھی زیادہ ہوگی۔ بعض اہم کمپلکسوں کے قیام پذیری کی قیمتیں، جدول میں دی گئی ہیں۔

قیام پذیری کا مستقلہ (β)	غیر قیام پذیری کا مستقلہ (α)	کمپلکس کا رواں
1.0×10^3	1.0×10^{-3}	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$
1.0×10^{12}	1.0×10^{-12}	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
5.4×10^{18}	1.8×10^{-19}	$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
1.6×10^{35}	6.2×10^{-36}	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
2.5×10^{41}	4.0×10^{-42}	$[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$


اوپر کی جدول میں قیام پذیری کے مستقلہ کا موازنہ کرنے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر کے درج کردہ پانچ کمپلکسوں میں، $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ سب سے زیادہ قیام پذیر کمپلکس رواں اور $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ سب سے کم ترین قیام پذیر رواں ہے۔

5.7.1 مرحلہ وار تشکیل کے مستقلے اور منجملہ تشکیل کے مستقلے (Stepwise formation constants and overall formation constants)

آبی واسطہ میں جب ایک آزاد دھاتی رواں پایا جاتا ہے تو اس کے اطراف (ہم ربط گرفتہ ہو کر) پانی کے سالمے موجود رہتے ہیں۔ اس کو [MS₆] کی طرح نمائندگی کی جاتی ہے۔ اگر پانی سے طاقتور لگینڈوں کو اس دھاتی نمک کے محلول میں شامل کیا جائے تو پانی کے سالمے کی جگہ طاقتور لگینڈوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔

آبی محلول میں ایک دھاتی کمپلکس ML₆ کی تشکیل کو فرض کیجئے۔ (دھاتی رواں کے بار کو نظر انداز کیا جاتا ہے)۔ کمپلکس کے بننے کا عمل ایک ہی مرحلہ میں یا مرحلہ وار ہوتا ہے۔

اگر لگینڈ کو ایک ہی مرحلہ میں دھاتی رواں کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو،









$$\beta_{\text{overall}} = \frac{[ML_6] [S]^6}{[MS_6] [L]^6}$$

منجملہ β کو منجملہ قیام پذیری کا مستقلہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ محلل کی مقدار بہت زیادہ ہے، اوپر کی مساوات میں اس کے ارتکاز کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے

$$\therefore \beta_{\text{overall}} = \frac{[ML_6]}{[MS_6] [L]^6}$$

اگر ان چھ لگینڈوں کو ایک کے بعد دیگر شامل کیا جاتا ہے تو، کمپلکس [ML₆] کی تشکیل چھ مختلف مرحلوں میں ہو جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔ عام طور پر مرحلہ وار قیام پذیری کے مستقلوں کی نمائندگی علامت k سے کی جاتی ہے۔



اوپر کے توازن میں k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 اور k_6 کی قیمتوں کو مرحلہ وار قیام پذیری کے مستقلہ کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے حسابی طریقہ کو استعمال کر کے (manipulate) کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ منجملہ قیام پذیری کا مستقلہ β ، مرحلہ وار قیام پذیری کے مستقلوں k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 اور k_6 کا حاصل جمع ہے۔

$$\beta = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6$$

دونوں جانب logarithm استعمال کرتے ہوئے۔

$$\log (\beta) = \log (k_1) + \log (k_2) + \log (k_3) + \log (k_4) + \log (k_5) + \log (k_6)$$

5.8 کوآرڈینییشن کمپلکسوں کی اہمیت اور اطلاقات (Importance and applications of coordination complexes)

کوآرڈینییشن کمپلکس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مرکبات کئی پودوں، جانوروں اور معدنیات میں پائے جاتے ہیں۔ کوآرڈینییشن کمپلکسوں کے بعض اطلاقات نیچے دئے گئے ہیں۔

1- phthalo blue - Cu(II) کے رواں کا ایک گہرے نیلے رنگ کا رنگین مادہ، جس کو چھپائی کی انک اور پینٹنگ کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے۔

2- نکل کی تخلیص میں Mond's process میں $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ بنتا ہے، جو تحلیل پا کر 99.5% خالص نکل دھات دیتا ہے۔

3- لینتھانائڈ کو جدا کرنے کے لئے EDTA کو بطور خلی لگینڈ (chelating ligand)، سخت پانی کو نرم کرنے اور جست (lead) کے زہریلے پن کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

4- چاندی اور سونے کو ان کی کچھ دھاتوں سے حاصل کرنے کے لئے حل پذیر سیانوکامپلکس بنایا جاتا ہے۔ ان سیانوکامپلکسوں کو Zinc کے ساتھ تحویل کر کے دھات حاصل کی جاتی ہے۔ اس عمل کو Mac-Arthur-Forrest cyanide process کہا جاتا ہے۔

5- بعض دھاتی روانوں کو بالکل درست طور پر تخمینہ لگانے (estimate) کے لئے بعض دھاتی رواں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکل کلورائیڈ کے محلول میں Ni^{2+} روانوں کو غیر حل پذیر کامپلکس $[\text{Ni}(\text{DMG})_2]$ میں تبدیل کر کے تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔

6- نامیاتی اور غیر نامیاتی تعاملات میں کئی کامپلکسوں کو متناسی عاملات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

(i) Wilkinson's catalyst $[(\text{PPh}_3)_3\text{RhCl}]$ کو الکینوں کے ہائیڈروجنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(ii) Zeigler-Natta Catalyst $[\text{TiCl}_4] + \text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ کو اتھین کے کثیر ترکیب (polymerisation) کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

7- دھاتوں پر شریف دھاتوں (Ag, Au, Pt, ...) وغیرہ کی نفیس اور ہموار سطح حاصل کرنے کے لئے $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ اور

$[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ جیسے کوآرڈینییشن کمپلکس استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان کامپلکسوں کو برق پاشیدگی کے برتن میں استعمال کیا جاتا ہے۔

8- مختلف بیماریوں کے لئے کئی کامپلکسوں کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:


(i) Ca-EDTA chelate کو جست (lead) اور تابکار کے زہر کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

جسم سے جست اور تابکار دھاتوں کے زہر کو نکالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

(ii) cis-platin کو کینسر کے علاج میں بطور ضد رسولی (antitumor) استعمال کیا جاتا ہے۔

9- فوٹو گرافی میں جب ایک فلم کو sodium thio sulphate (Hypo) محلول سے ڈیولپ کیا جاتا ہے تو فلم مثبت (fix) ہو جاتی ہے۔

غیر تحلیل شدہ AgBr، sodium dithiosulphate oargentate(I)، کا حل پذیر کامپلکس بناتا ہے، جس کو پانی سے دھو کر آسانی سے نکالا جاسکتا ہے۔



10- کئی حیاتیاتی نظاموں میں دھاتی کامپلکس پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر


(i) خون کے سرخ خلیوں (RBC) میں heme group موجود ہے، جو Fe^{2+} -Porphyrin کا کمپلکس ہے۔

یہ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے بافتوں تک اور کاربن ڈی آکسائیڈ کو بافتوں سے پھیپھڑوں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔

(ii) پودوں اور انسانی جسم میں موجود سبز رنگین مادہ کلروفیل میں، Mg^{2+} کو بطور مرکزی دھات کے ایک ترمیم شدہ Porphyrin لگینڈ پایا جاتا ہے، جسے corrin کا حلقہ کہتے ہیں۔ یہ شعاعی ترکیب میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ جس میں پودے CO_2 اور پانی کو کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن میں تبدیل کرتے ہیں۔

(iii) Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin)، صرف ایک وٹامن ہے جس میں دھاتی رواں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک کوآرڈینیٹیشن کمپلکس ہے، جس میں مرکزی رواں Co^{+} کے اطراف Porphyrin جیسا لگینڈ گھیرے ہوئے ہے۔

(iv) کئی خامرے، دھاتی کمپلکس کہلاتے ہیں۔ وہ حیاتیاتی افعال کو قابو میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر Carboxypeptidase ایک protease enzyme ہے، یہ خامرہ ہاضمہ میں اہم رول ادا کرتا ہے، جس میں Zinc کا ایک رواں پروٹین کے ساتھ ہم ربط ہوا ہے۔



Cisplatin

Cisplatin ایک مربع سطحی کوآرڈینیٹیشن کمپلکس (cis-[Pt(NH₃)₂Cl₂]) ہے، جس میں دو مماثل لگینڈ متصل مقامات پر پائے جاتے ہیں۔

یہ ایک platinum کی دھات والا ضد کینسری دوا ہے۔

یہ دوا آب پاشیدہ ہو کر DNA کے ساتھ مختلف crosslinks بناتے ہیں۔ یہ crosslinks، DNA کی دوہرانے اور نقل ثانی کے عمل کو روکتا ہے، جس کے نتیجے میں خلوی نشوونما کو روکتا ہے اور بالآخر خلیہ مر جاتا ہے۔

یہ خلوی پروٹین کے ساتھ بھی cross link کرتا ہے اور خلوی تقسیم mitosis کو روکتا ہے۔

خلاصہ :

- جب دو یا دو سے زیادہ قیام پذیر مرکبات کا محلول بنایا جاتا ہے اور تبخیر کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں دوہرے نمک یا کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات بننے کے مواقع بنتے ہیں۔ دوہرے نمک اپنی شناخت کھودیتے ہیں اور محلول میں اپنے سادہ روانوں کی طرح حل پذیر ہو جاتے ہیں، جب کہ کوآرڈینیٹیشن مرکب کے کمپلکس مرکب، اپنی شناخت کو نہیں کھوتے اور کبھی بھی سادہ روانوں کی طرح حل پذیر نہیں ہوتے۔
- ورنر کے مطابق، اکثر عناصر دو قسم کی گرفتوں کو ظاہر کرتے ہیں، ابتدائی گرفت اور ثانوی گرفت، اور یہ دونوں گرفتوں کو مطمئن کرتی ہیں۔
- جدید اصطلاح میں ابتدائی گرفت (Primary valency) کو دھاتی جوہر کی تکسیدی حالت (Oxidation state) اور ثانوی گرفت (Secondary valency) کو کوآرڈینیٹیشن عدد (Coordination number) کہتے ہیں۔
- کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ ایک رواں یا ایک تعدیلی سالمہ ہے جس میں ایک مرکزی جوہر عام طور پر ایک دھات ہوتی ہے اور بعض جوہروں یا جوہروں کے گروپ (لگینڈ) ہوتے ہیں جو مرکزی جوہر سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔
- مرکزی جوہر یا رواں وہ ہے جو ایک کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ میں مرکزی مقام پر قائم ہوتا ہے۔ یہ دیگر جوہروں یا جوہروں کے گروپوں (لگینڈ) کو اپنے ساتھ ہم گرفتہ ہم ربط بندش (Coordinate covalent bond) کے ذریعہ جوڑ کر رکھتا ہے۔
- لگینڈ جوہروں یا جوہروں کے گروپ ہیں جو مرکزی جوہر یا رواں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لگینڈ میں موجود جوہر جو مرکزی دھاتی جوہر کے ساتھ براہ راست بندھا رہتا ہے، یہ donor کہلاتا ہے۔

- کوآرڈی نیشن کے مرکب کے کمپلکس کا رواں، جس میں مرکزی دھاتی جوہر یا رواں اور لگینڈ بندھے ہوئے ہیں، ان کو جملہ کوآرڈی نیشن کا کرہ کہا جاتا ہے اور عام طور پر اسے مربع قوسین کے اندر ان کے بار charge کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
- وہ سہ ابعادی ترتیب جس میں لگینڈ کے جوہر یا رواں مرکزی جوہر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب کوآرڈی نیشن کثیر ضلعی یا polygon کہا جاتا ہے۔
- ایک کمپلکس میں مرکزی دھاتی رواں کے جملہ لگینڈ کے donor جوہروں کی تعداد کو اس دھات کا کوآرڈی نیشن عدد کہا جاتا ہے۔
- ایک کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ (entity) کے مرکزی دھات کے جوہر کی تکسیدی حالت کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جب مرکزی دھات کے جوہر سے تمام لگینڈوں کو ان کی الکٹرانوں کی جوڑیوں کے ساتھ خارج کر دیا جائے تو اس دھات میں باقی رہنے والا برقی بار ہی اس دھات کی تکسیدی حالت یا تکسیدی عدد ہے۔
- اس قسم کے ہم ترکیبے اس وقت بنتے ہیں، جب ایک ambidentate لگینڈ کو اپنے مختلف donor جوہروں کے ذریعے مرکزی دھات جوہر/رواں کے ساتھ بندھا گیا ہے۔
- کوآرڈی نیشن کے مرکبات میں اس قسم کے ہم ترکیبے واقع ہوتے ہیں، جس میں منفرواں اور مشرواں دونوں کمپلکس رواںوں کی طرح موجود ہیں۔ منفروانی اور مشروانی کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ میں ایک یا ایک سے زیادہ لگینڈوں کے تبادلہ سے مختلف ہم ترکیبے بنتے ہیں۔
- جب ایک رواں ہونے والا، مخالف سادہ رواں خود ایک لگینڈ کی طرح عمل کرتا ہے تو اس قسم کے ہم ترکیبے حاصل ہوتے ہیں۔ کوآرڈی نیشن کے انفرادی حصہ (entity) میں ایک یا ایک سے زیادہ لگینڈوں کے ساتھ اس طرح کے مخالف رواںوں کے تبادلے سے روانی ہم ترکیبے بنتے ہیں۔
- نامیاتی مرکبات ہی کی طرح، کوآرڈی نیشن مرکبات بھی تجسیمی ہم ترکیبے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک کوآرڈی نیشن کے مرکب میں ایک ہی کیمیائی ضابطہ ہے اور مرکزی دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان ایک ہی قسم کا ربط ہے۔
- مختلف قسم کے لگینڈ رکھنے والے کمپلکسوں (heteroleptic) کے مرکزی دھاتی جوہر کے اطراف کی خالی جگہ میں لگینڈوں کی مختلف ممکنہ سہ ابعادی ترتیب کی وجہ سے شکلی ہم ترکیبیت ظاہر ہوتی ہے۔ مربع سطحی (square planar) اور آٹھ سطحی کمپلکس شکلی ہم ترکیبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔
- نامیاتی مرکبات ہی کی طرح کوآرڈی نیشن کے مرکبات جو chairality (جو لگینڈ کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں) رکھتے ہیں، یہ بصری ترکیبیت ظاہر کرتے ہیں۔ دو بصری ہم ترکیبوں کی جوڑی جو ایک دوسرے کے آئینہ کے خیالات کی طرح ہیں، انہیں عکاس ہم ترکیبے (enantiomers) کہا جاتا ہے۔
- Linus pauling نے Valence bond theory (VBT) (گرفتہ بندش کا نظریہ) کو پیش کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان بننے والی بندش خالص ہم گرفتہ ہے۔ Bethe اور Van vleck نے دھاتی جوہر اور لگینڈ کے درمیان بننے والی بندش کو برقی سکونی کہا ہے اور کوآرڈی نیشن مرکبات کے خواص کی وضاحت کرنے کے لئے Crystal Field theory (CFT) کے نظریے کو پیش کیا۔ مزید یہ کہ Ligand Field theory اور Molecular Orbital Theory کے نظریوں کی مزید ترقی نے کوآرڈی نیشن کے مرکبات کے درمیان بندشوں کی نوعیت کی مزید وضاحت کی۔ اس حصہ میں ہم سادہ کوآرڈی نیشن کے مرکبات کی وضاحت VBT اور CFT سے کریں گے۔



صحیح جواب منتخب کیجئے۔

1- کمپلکس $[M(en)_2(Ox)]Cl$ میں دھات M کی ابتدائی گرفت اور ثانوی گرفت کا حاصل جمع یہ ہے۔

- (a) 3 (b) 6 (c) -3 (d) 9

2- 100 ml پنتاآکواکلوریدوکرومیم(III)کلورید کے 0.01M محلول میں، افزود مقدار میں Silver Nitrate

کا محلول شامل کیا جاتا ہے۔ رسوب شدہ AgCl کے مول کی تعداد یہ ہوگی۔

- (a) 0.02 (b) 0.002 (c) 0.01 (d) 0.2

3- ایک کمپلکس کا سالمی ضابطہ $MSO_4Cl \cdot 6H_2O$ ہے۔ اس کا آبی محلول بیریم کلورائیڈ کے ساتھ ایک سفید رسوب دیتا ہے۔ اور جب اس کو سلور نائٹریٹ کے محلول سے گزارا جاتا ہے تو کوئی رسوب نہیں دیتا۔ اگر دھات کی ثانوی گرفت 6 ہے تو ان میں سے کونسا اس کمپلکس کی صحیح نمائندگی کرتا ہے۔

- a) $[M(H_2O)_4Cl]SO_4 \cdot 2H_2O$ b) $[M(H_2O)_6]SO_4$
c) $[M(H_2O)_5Cl]SO_4 \cdot H_2O$ d) $[M(H_2O)_3Cl]SO_4 \cdot 3H_2O$

4- $[Fe(H_2O)_5NO]SO_4$ میں لوہے کی تکسیدی حالت اور لگینڈ NO کا بار بالترتیب یہ ہوں گے۔

- (a) +2 اور 0 (b) +3 اور 0 (c) +3 اور -1 (d) +1 اور +1

5- IUPAC کے رہنمائی خطوط کے تحت، کمپلکس $[Co(en)_2(ONO)Cl]Cl$ کا نام یہ ہے۔

- a) chlorobisethylenediaminenitritocobalt(III) chloride
b) chloridobis(ethane-1,2-diamine)nitro K-Ocobaltate(III) chloride
c) chloridobis(ethane-1,2-diammine)nitrito K-Ocobalt(II) chloride
d) chloridobis(ethane-1,2-diammine)nitrito K-Ocobalt(III)chloride

6- کمپلکس $K_3[Al(C_2O_4)_3]$ کا IUPAC نام یہ ہے۔

- a) potassiumtrioxalatoaluminium(III)
b) potassiumtrioxalatoaluminate(II)
c) potassiumtrisoxalatoaluminate(III)
d) potassiumtrioxalatoaluminate(III)

7- درج ذیل میں سے ایک کی مقناطیسی معیار حرکت 1.73 BM ہوگی۔ (NEET)

- a) TiCl_4 b) $[\text{CoCl}_6]^{4-}$
c) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ d) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$

8- اعلیٰ گردش والے d^3 آٹھ سطحی کمپلکس کے لئے کرسٹل فیلڈ قیام پذیری کی توانائی CFSE یہ ہوگی۔

- a) $-0.6\Delta_0$ b) 0
c) $2(P - \Delta_0)$ d) $2(P + \Delta_0)$

9- ان میں سے کون سے کوآرڈینیٹیشن کے انفرادی حصہ میں Δ_0 کی قدر زیادہ ہوگی۔

- a) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ b) $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$
c) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ d) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

10- ان میں سے کونسا آئینہ کے عکس (enantiomorphs) کی ایک جوڑی کو ظاہر کرتا ہے۔

- a) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$ b) $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$
c) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ d) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{NO}_2$

11- $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ کس قسم کے ہم ترکیبہ کو ظاہر کرتا ہے؟

- (a) کوآرڈینیٹیشن ہم ترکیبہ (b) ہم ربطی ترکیبہ
(c) بصری ہم ترکیبہ (d) شکلی ہم ترکیبہ

12- $[\text{Pt}(\text{Py})(\text{NH}_3)(\text{Br})(\text{Cl})]$ سے کتنے شکلی ہم ترکیبہ ممکن ہیں؟

- (a) 3 (b) 4 (c) 0 (d) 15

13- ان میں سے کونسی جوڑی ربطی ہم ترکیبہ (linkage isomerism) کو ظاہر کرتی ہے؟

- a) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ and $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{CuCl}_4]$
b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_3)]\text{SO}_4$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]\text{SO}_4$
c) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NCS})_2]\text{Cl}$ and $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{SCN})_2]\text{Cl}$
(d) (b) اور (c) دونوں۔

14- کمپلکس $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Br}_2]\text{Cl}$ میں کس قسم کی ہم ترکیبیت ممکن ہے؟

- (a) شکلی اور روانی (b) شکلی اور بصری
(c) بصری اور روانی (d) صرف شکلی

15- ان میں سے کونسے کمپلکسوں سے ہم ترکیبہ کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ (ہم ترکیبہ نہیں بنا سکتے)؟

- a) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$ b) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
c) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl}$ d) $[\text{FeCl}_6]^{3-}$

16۔ ایک کمپلکس جس میں دھات کا تکسیدی عدد صفر ہے، وہ یہ ہے۔

- a) $K_4[Fe(CN)_6]$ b) $[Fe(CN)_3(NH_3)_3]$
c) $[Fe(CO)_5]$ d) both (b) and (c)

17 tris(ethane-1,2-diamine)iron(II)phosphate کا ضابطہ یہ ہے۔

- a) $[Fe(CH_3-CH(NH_2)_2)_3](PO_4)_3$ b) $[Fe(H_2N-CH_2-CH_2-NH_2)_3](PO_4)$
c) $[Fe(H_2N-CH_2-CH_2-NH_2)_3](PO_4)_2$ d) $[Fe(H_2N-CH_2-CH_2-NH_2)_3](PO_4)_2$

18۔ ان میں سے کون سے کمپلکس کی نوعیت اکہرامقناطیس (paramagnetic) ہے؟

- a) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ b) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$
c) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ d) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

19۔ یہ Fac-mer ہم ترکیبہ کو ظاہر کرتا ہے۔

- a) $[Co(en)_3]^{3+}$ b) $[Co(NH_3)_4(Cl)_2]^+$
c) $[Co(NH_3)_3(Cl)_3]$ d) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$

20۔ صحیح بیان کا انتخاب کیجئے۔

- (a) آٹھ سطحی کمپلکس کی بہ نسبت مربع سطحی کمپلکس زیادہ قیام پذیر (مستحکم) ہیں۔
(b) $[Cu(Cl)_4]^{2-}$ کی صرف گردشی مقناطیسی معیار حرکت 1.732 BM ہے اور اس کی ساخت مربع سطحی ہے۔
(c) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ کی بہ نسبت $[FeF_6]^{4-}$ کی کرشل فیلڈ کے شک کی توانائی (Crystal field splitting energy) زیادہ ہے۔
(d) $[Ti(H_2O)_6]^{2+}$ کے CFSE کی بہ نسبت $[V(H_2O)_6]^{2+}$ کے CFSE کی توانائی زیادہ ہے۔

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1۔ درج ذیل کمپلکسوں کے لئے IUPAC نام لکھئے۔

- i) $Na_2[Ni(EDTA)]$
ii) $[Ag(CN)_2]^-$
iii) $[Co(en)_3](SO_4)_3$
iv) $[Co(ONO)(NH_3)_5]^{2+}$
v) $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$

2- درج ذیل کوآرڈینیٹیشن مرکبات کے لئے ضابطہ لکھئے۔

- potassiumhexacyanidoferrate(II)
- pentacarbonyliron(0)
- pentaamminenitrito $\rightarrow$ N -cobalt(III)ion
- hexaamminecobalt(III)sulphate
- sodiumtetrafluoridodihydroxidochromate(III)

3- ان کو مولار ایصالیت (molar conductivity) کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں لکھئے۔

- $\text{Mg}[\text{Cr}(\text{NH}_3)_5(\text{Cl})_5]$
- $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]_3[\text{CoF}_6]_2$
- $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

4- دوا کے طور پر استعمال ہونے والے ایک کوآرڈینیٹیشن مرکب کی ایک مثال اور اہم حیاتیاتی مرکبات کی طرح استعمال ہونے والے کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات کی دو مثالیں دیجئے۔

5- گرفتگی بندش کے نظریے (VBT) کی بنیاد پر وضاحت کیجئے کہ $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ کیوں اکہرے مقناطیسیت والا (paramagnetic) ہے، جب کہ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ دوہرے مقناطیسیت والا (diamagnetic) ہے۔

6- کمپلکس $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ کو تمام ممکن شکلی ہم ترکیبے چھڑائیے اور ان میں سے بصری حساس ہم ترکیبے کی شناخت کیجئے۔

7- $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ رنگین ہے، جب کہ $[\text{Sc}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ بے رنگ ہے۔ وضاحت کیجئے۔

8- کمپلکس $[\text{Ma}_2\text{b}_2\text{c}_2]$ کے قسم کی ایک مثال دیجئے، جس میں a، b اور c ایک دندانیت والے لگینڈ ہیں اور ان کے ممکن ہم ترکیبے بھی بتائیے۔

9- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{SO}_4$ اور $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{SO}_4]\text{Cl}$ کو فرق کرنے کے لئے ایک جانچ بتائیے۔

10- ایک آٹھ سطحی کرشل فیلڈ میں d مدار یوں کے شق ہونے کا خاکہ بنائیے۔

11- ربطی ہم ترکیبیت (linkage isomerism) کیا ہے؟ ایک مثال کے ساتھ وضاحت کیجئے۔

12- donor عطا کنندہ جوہروں کے تعداد کی بنیاد پر درج ذیل لگینڈوں کی درجہ بندی کیجئے۔

pyridine (d) ox^2 (c) en (b) NH_3 (a)

13- دوہرے نمک اور ایک کوآرڈینیٹیشن کے مرکب کے درمیان فرق بتائیے۔

14- ورز کے نظریے کے مفروضات بیان کیجئے۔

15- سہ پہلو اہرامی (tetrahedral) کمپلکس کیوں شکلی ہم ترکیبیت کو ظاہر نہیں کرتے؟

16- ایک مثال کے ساتھ کوآرڈینیٹیشن کے مرکبات میں بصری ہم ترکیبیت کی وضاحت کیجئے۔

17- آبیدگی کی ہم ترکیبیت (Hydrate isomerism) کیا ہے؟ ایک مثال کے ساتھ سمجھائیے۔

18- کرشل فیلڈ شق ہونے کی توانائی (Crystal field splitting energy) کیا ہے؟

19- کرشل فیلڈ کے قیام پذیری (استحکام) کی توانائی (CFSE) (Crystal field stabilization energy) کیا ہے؟

20- $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ محلول کا رنگ سبز ہے، جب کہ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2+}$ محلول بے رنگ ہے۔ وضاحت کیجئے۔

21- دھاتی کاربونیل میں بندشوں کی نوعیت سے متعلق مختصر طور پر وضاحت کیجئے۔


22- کارپرفیلٹ کے محلول میں افزو و مقدار کا مائع امونیا شامل کیا جاتا ہے تو کس قسم کا کوآرڈینیٹیشن کا انفرادی حصہ (entity) بنتا ہے ؟

23- VBT کی بنیاد پر $[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ میں بندش کی نوعیت کی وضاحت کیجئے۔

24- VBT کی حد بندیاں کیا ہیں ؟

25- آٹھ سطحی کرٹل کے میدان میں کمپلکس $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{4-}$ کا تکسیدی عدد، کوآرڈینیٹیشن عدد، لگینڈ کی نوعیت، مقناطیسی خصوصیت اور الیکٹران کی تشکیل لکھئے۔

ذہنی خاکہ





کرسٹل فیلڈ کا نظریہ

CRYSTAL FIELD THEORY

اس آلہ کو استعمال کر کے آٹھ سطحی اور سہ پہلو اہرامی مرکبات کے مختلف دھاتی روانوں کے، کرسٹل فیلڈ کے شق ہونے کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں گے۔ ساتھ ہی کرسٹل فیلڈ کے نظریہ کو استعمال کر کے CFSE محسوب کی جاسکتی ہے۔

URL کو جانیے


<http://vlab.amrita.edu/index.php?sub=2&brch=193&sim=610&cnt=4>

دائیں جانب کے QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔



مرحلے :


- براؤزر کھولنے، اور URL ٹائپ کیجئے یا دئے گئے QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔ ایک ویب پیج کھلے گا، جیسا کہ خاکہ میں دکھایا گیا ہے۔
- نوٹ : اس ویب پیج کو کھولنے کے ایک وقت کا signup کی ضرورت ہے، user name اور password کو استعمال کر کے login کیجئے اور simulation tab کو لاگ کیجئے۔
- drop down menu (box 1) کو استعمال کر کے مناسب ligand field splitting کا انتخاب کیجئے، اپنی پسند کے دھات کا انتخاب کیجئے اور drop down menu (box 2) سے مناسب لگیڈ کا انتخاب کیجئے۔ اب منتخب کردہ کمپلکس کے لئے کرسٹل فیلڈ کا شق ہونا اسکرین پر دکھائی دے گا۔
- انتخاب کردہ کمپلکس کے لئے کرسٹل فیلڈ کے نظریہ کو استعمال کیجئے اور t_{2g} اور e_g مداروں میں الیکٹرانوں کو بھرتی کیجئے۔ الیکٹرانوں کو خارج کرنے کے لئے مداروں کو تین مرتبہ کلک کیجئے۔ مکمل ہونے کے بعد submit button (box 4) کلک کیجئے۔ اب تم الیکٹران کی تقسیم کی جانچ کر سکتے ہو۔ اگر غلط ہو تو دوبارہ کوشش کیجئے۔
- ورک شیٹ کے t_{2g} اور e_g مداروں میں الیکٹرانوں کی تعداد کو بھریئے۔ (box 6) - محسوب کردہ CFSE ڈسپلے ہوگا۔



ٹھوس حالت

(SOLID STATE)

اکائی
6



Sir Lawrence Bragg
(1890 – 1971)

Sir William Henry Bragg
(1862 – 1942)

سرولیم ہنری بریگ سرلارنس بریگ
سرولیم ہنری بریگ ایک انگریز ماہری طبیعیات، کیمیا دان اور ریاضی دان تھے۔ سرولیم ہنری بریگ اور ان کے فرزند لارنس بریگ نے بڑی کامیابی کے ساتھ X-ray کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے X-ray spectrometer کی ایجاد کی اور X-ray crystallography کی جدید سائنس کو پیش کیا۔ X-ray diffraction کی مدد سے قلموں کی ساخت کا تجزیہ کیا۔ ایک شعاع کی مدد سے قلموں کی ساخت کا تجزیہ کرنے کے عوض 1915 میں باپ اور بیٹے دونوں کو متحدہ طور پر نوبل انعام حاصل کیا۔ اس تحقیق کی بدولت ایک معدن ”براگائٹ“ (Braggite) (نیکل، پلٹینم اور پلاٹینم کے سلفائیڈ کی کچھ دھات) کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔




سیکھنے کے مقاصد



- اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلباء یہ جان چکے ہوں گے۔
- ❖ ٹھوس اشیاء کے عام خصوصیات کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ❖ قلمی اور نقلی ٹھوس اشیاء کے فرق کو سمجھ سکیں گے۔
- ❖ ایک اکائی خانہ کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ❖ مختلف خالی جگہوں (voids) اور بند ساختوں کی وضاحت کر سکیں گے۔
- ❖ مختلف مکعبی اکائی خانوں کے Packing کی کارکردگی کو محسوب کر سکیں گے۔
- ❖ اکائی خانوں کے ابعاد سے متعلق عددی حسابات کو حل کر سکیں گے۔
- ❖ ٹھوس اشیاء میں موجود نقطوں کے نقائص (point defects) کے بارے میں وضاحت کر سکیں گے۔

6.2 ٹھوس اشیاء کی درجہ بندی

(Classification of solids)



ترتیب اور ترکیب کی بنیاد پر ہم نے ٹھوس اشیاء کو دو اہم حصوں میں درجہ بندی کی ہے۔

- (i) قلمی ٹھوس اشیاء (ii) نقلی ٹھوس اشیاء

اصطلاح "Crystal" "قلم" یونانی لفظ "Krystallos" سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب شفاف برف ہے۔ اس اصطلاح کو سب سے پہلے کوارٹز کے پتھر وغیرہ کے لئے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اسے ایسی ٹھوس اشیاء کے لئے لیا گیا، جن کی کئی چپٹی اور ترتیب وار سطحیں پائی جاتی ہوں۔



مادہ تین مختلف حالتوں میں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کی طرح پایا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے اطراف و اکناف کی اشیاء کو دیکھو گے تو گیس اور مائع کی بہ نسبت ٹھوس ہی زیادہ دکھائیں گے۔ گیس اور مائع ٹھوس سے اس لئے مختلف ہیں کہ ٹھوس کا حجم اور شکل معین ہے۔ ٹھوس میں جوہر اور سالمے یا رواں بالکل قریب تر، ترتیب وار جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہیرا، دھاتیں، پلاسٹک وغیرہ اور اکثر ایسی چیزیں ہیں، جنہیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں بعض مخصوص کاموں کے لئے ٹھوس اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھوس اشیاء کی ساخت اور خواص کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایسی نئی ٹھوس اشیاء کو بنایا جائے جن کے خواص مختلف اور ضرورت کے مطابق ہوں۔

اس باب میں ہم ٹھوس اشیاء کے خواص، درجہ بندی، ساخت اور ان کی اہمیت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔

6.1 ٹھوس اشیاء کے عام خواص

(General Characteristics of solids)

ہم گیارہویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ گیس کے سالمے بے ترتیبی کے ساتھ بغیر کسی مناسب قوتوں کے آزادانہ طور پر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے برخلاف ٹھوس اشیاء کے جوہر، رواں اور سالمے بہت زیادہ قوت کشش کے ساتھ سختی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھوس کے عام خواص یہ ہیں۔

- ٹھوس اشیاء کی ایک متعین حجم اور شکل ہوتی ہے۔
- ٹھوس اشیاء بہت ہی سخت ہوتے ہیں اور دابے نہیں جاسکتے۔
- ٹھوس اشیاء میں مضبوط بندشی قوت ہوتی ہے۔
- ٹھوس اشیاء میں بہت کم بین جوہری، روانی یا سالماتی فاصلہ پایا جاتا ہے۔

(v) ان کے اجزاء (جوہر، رواں یا سالمے) کا مقام متعین ہوتا ہے اور وہ اپنے اوسط مقام پر اتھرتاز (oscillate) کرتے رہتے ہیں۔

قلمی ٹھوس (Crystalline solid) وہ اشیاء ہیں، جن کے اجزاء (جوہر، رواں یا سائل) طویل حد تک ایک منظم ترتیب میں جڑے ہوں۔ ٹھوس قلمی اشیاء میں ان اجزاء کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ ان کی توانائی بالقواہ بالکل کم ہو۔ اس کے برخلاف نقلمی ٹھوس اشیاء (amorphous) کے معنی (no form بغیر شکل کے) کے اجزاء بے ترتیبی سے جڑے ہوئے ہوں گے۔


درج ذیل جدول، قلمی اور نقلمی ٹھوس اشیاء کا فرق بتاتی ہے۔

S.no	قلمی ٹھوس اشیاء	نقلمی ٹھوس اشیاء
1	طویل حد تک منظم، ترتیب وار اجزاء	کم حد والے بے ترتیب اجزاء
2	متعین شکل ہوتی ہے	غیر متعین شکل ہوتی ہے
3	عام طور پر ٹھوس اشیاء غیر ہم رُخی (anisotropic) ہوتے ہیں۔	وہ ہم رُخی (isotropic) مائع کی طرح ہوتے ہیں۔
4	وہ حقیقی طور پر ٹھوس ہوتے ہیں۔	وہ کاذب ٹھوس یا اعلیٰ ٹھنڈے مائع کہلاتے ہیں۔
5	ان کے پگھلاؤ کی حرارت متعین ہے۔	ان کے پگھلاؤ کی حرارت غیر متعین ہے۔
6	ان کا نقطہ پگھلاؤ معین ہوتا ہے۔	مختلف تپشوں پر وہ پگھلتے ہیں، تاکہ وہ ڈھالے جائیں۔
7	مثالیں : NaCl، ہیرا وغیرہ	مثالیں : ربڑ، پلاسٹک، شیشہ وغیرہ

جدول 6.1 قلمی اور نقلمی ٹھوس اشیاء کے درمیان فرق

ہم رُحیت (Isotropy)

ہم رُحیت کے معنی تمام سمتوں میں یکسانیت ہے۔ ٹھوس حالت میں ہم رُحیت کا مطلب عام طبعی خواص جیسے انعطاف نما، برقی ایصال کی قیمتیں یکساں طور پر تمام سمتوں میں پائے جاتے ہوں۔ جب کہ غیر ہم رُحیت (anisotropy) میں خواص جس سمت میں پیمائش کی جاتی ہوں، اُس پر منحصر ہے۔ ٹھوس اشیاء غیر ہم رُخی ہیں اور پیمائش کے وقت وہ مختلف سمتوں میں مختلف طبعی خواص ظاہر کرتے ہیں۔ درج ذیل خاکہ، قلموں میں غیر ہم رُحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے اجزاء کی ترتیب مختلف سمتوں میں مختلف ترتیب کی وجہ سے ہے۔




6.3 قلمی ٹھوس اشیاء کی درجہ بندی

(Classification of crystalline solids)

6.3.1 روانی ٹھوس اشیاء (Ionic solids)

ایک روانی قلمی اشیاء کی بنیادی اکائیاں مشرواں (Cations) اور منفرواں (anions) ہیں۔ وہ آپس میں مضبوطی کے ساتھ قوت کشش کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشرواں جتنا ہو سکے، اتنے منفرواں کے اطراف گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی طرح منفرواں جتنا ہو سکے، اتنے مشرواں کے اطراف گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی آپسی قوت کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ روانی قلمیں متعین قلمی ساخت رکھتے ہیں۔ کئی ٹھوس اشیاء، مکعبی طور پر قریب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال: NaCl کے قلم میں Na^+ اور Cl^- کی ترتیب۔



خواص : (Characteristics)

- 1- روانی ٹھوس اشیاء کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔
- 2- یہ ٹھوس اشیاء برقی ایصال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے رواں جالی (lattice) کے مقامات پر مثبت ہوئے ہوتے ہیں۔
- 3- یہ پگھلی ہوئی حالت میں یا پانی میں حل ہونے پر برقی ایصال کرتے ہیں، کیونکہ پگھلی ہوئی حالت یا محلول میں روانوں میں حرکت پائی جاتی ہے۔
- 4- وہ سخت ہوتے ہیں۔ لہذا مضبوط اور طاقتور بیرونی قوتیں، ان روانوں کے مقام میں تبدیلی لاسکتے ہیں۔

6.3.2 ہم گرفتہ ٹھوس اشیاء : (Covalent solids)

ہم گرفتہ ٹھوس اشیاء میں اس کے اجزاء (جوہر) ہم گرفتہ بندشوں کے ذریعہ ایک سہ ابعادی جالی (Lattice) بناتے ہیں۔ مثال: ہیرا، سیلیکان کاربائیڈ، وغیرہ۔ ایسی ہم گرفتہ جالی دار قلمیں بہت ہی سخت ترین ہوتے ہیں اور ان کا نقطہ پگھلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر حرارت اور برق کے غیر موصل ہیں۔



6.3.3 سالماتی ٹھوس اشیاء : (Molecular solids)

سالماتی ٹھوس اشیاء کے اجزاء تعدیلی سالمے ہوتے ہیں۔ وہ کمزور وائڈروال کی قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نرم ہوتے ہیں اور برقی ایصال نہیں کرتے۔ ایسی سالماتی ٹھوس اشیاء کو مزید تین قسموں میں درجہ بند کیا گیا ہے۔




گرافائٹ کو پینسل کی نوک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کاغذ پر آسانی کے ساتھ پھسلتا ہے اور ایک سیاہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ کئی مدھنوں (Lubricants) میں گرافائٹ ایک اہم جز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سائیکل کی زنجیر کے تیل میں، کیونکہ یہ پھسلنے والا ہوتا ہے۔

(i) غیر قطبی سالماتی ٹھوس اشیاء

(Non-polar molecular solids)


غیر قطبی سالماتی ٹھوس اشیاء میں اس کے سالمی اجزاء کمزور انتشاری قوتوں (weak dispersion forces) یا لنڈن قوتوں (London forces) کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک سہ ابعادی نمونے کے طور پر سمونے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قلم میں ان انواع کی منظم ترتیب قلمی جالی (Crystal lattice) کہلاتی ہے۔ ایک ٹھوس قلم کی مکرر ساختی اکائی اکائی خانہ (Unit cell) کہلاتی ہے۔ درج ذیل خاکہ جالی دار نقطہ اور اکائی خانہ کو ظاہر کرتا ہے۔




ایک قلم کو اس طرح فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس میں متعدد اکائی خانے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی اکائی خانہ کے ساتھ خلاء میں مشابہت کے ساتھ ترتیب پائے ہوئے ہیں جو ایک قلم کے ذرہ کے اطراف گھرے ہوتے ہیں۔ ذرات کے تعداد اس کے کوآرڈینیٹیشن عدد (Co-ordination number) کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک اکائی خانہ میں تین طول کے کنارے یا جالی کے مستقل a ، b اور c ہوتے ہیں اور ان کناروں کا درمیانی زاویہ α ، β اور γ ہوتا ہے۔



ان کا نقطہ پگھلاؤ کم ہوتا ہے اور وہ کمرے کی تپش پر مائع یا گیس کی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ مثال: نائٹریلین، اینتھرسین، وغیرہ

(ii) قطبی سالمی ٹھوس اشیاء (Polar molecular solids)



اس کے اجزاء ایسے سالمے ہیں، جو قطبی ہم گرفتہ بندشوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آپس میں مضبوط دو قطبی-دو قطبی

(Dipole-Dipole) تعلق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ غیر قطبی سالمی ٹھوس اشیاء کی بہ نسبت ان کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال: ٹھوس CO_2 ، ٹھوس NH_3 وغیرہ۔

(iii) ہائڈروجن کی بندش والے سالمی ٹھوس اشیاء :

(Hydrogen bonded molecular solids)

ان کے اجزاء ہائڈروجن کی بندشوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر کمرے کی تپش پر ٹھوس حالت میں ہوتے ہیں۔ مثالیں : ٹھوس برف (H_2O)، گلوکوز، یوریا وغیرہ۔

6.3.4 دھاتی ٹھوس اشیاء: (Metallic solids)

تم نے گیارہویں جماعت میں دھاتی بندشوں سے متعلق پڑھا ہوگا۔ دھات کی ٹھوس اشیاء میں جالی کے نقاط (lattice points) پر مثبت دھاتی رواں پائے جاتے ہیں اور اطراف کی خالی جگہ میں الیکٹرانوں کے بادل پائے جاتے ہیں۔ یہ سخت ہوتے ہیں ان کا نقطہ پگھلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دھاتی ٹھوس اشیاء برق اور حرارت کے بہترین موصل ہیں۔ ان میں دھاتی چمک پائی جاتی ہے۔ مثالیں: دھات اور ادھات کی بھرتیں، اس قسم کے ٹھوس اشیاء میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر Cu, Fe, Zn, Ag, Au وغیرہ۔

6.4 قلمی جالی اور اکائی خانہ

(Crystal lattice and unit cell)


قلمی ٹھوس اشیاء میں جوہروں، روانوں یا سالموں کا ایک متعین رویہ (Orientation) پایا جاتا ہے،

6.5 ابتدائی اور غیر ابتدائی اکائی خانے


(Primitive and non-primitive unit cell)














اکائی خانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ابتدائی (Primitive) اور غیر ابتدائی (non-primitive) : ایک اکائی خانہ جس کے ہر کنارے پر ایک ہی قسم کے جالی دار نقاط پائے جاتے ہیں اور یہ ابتدائی اکائی خانہ (Primitive unit cell) کہلاتا ہے۔

غیر ابتدائی اکائی خانہ (Non-primitive unit cell) میں اضافی جالی دار نقطہ ہوتے ہیں۔ وہ اکائی نقطہ کے چہرہ (رخ) (face) کی طرف یا اکائی خانہ کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔




سات ابتدائی قلمی نظام پائے جاتے ہیں۔ مکعبی (Cubic)، معین سطحی (Rhombohedral)، مسدسی (Hexagonal)، چہار جانبی (Tetragonal)، عمودی معین (orthorhombic)، یک طرفہ مائل (Monoclinic)، سہ طرفہ مائل (Triclinic) جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔



 رُخ مرکزی	 جسم مرکزی	 ابتدائی	مکعبی cubic
	 جسم مرکزی	 ابتدائی	چهار زاویہ والا tetragonal
			مسدسی hexagonal
 بنیادی رُخ مرکزی	 رُخ مرکزی	 جسم مرکزی	عمودی معین orthorhombic
 بنیادی رُخ مرکزی		 ابتدائی	یک طرفہ مائل monoclinic
			سہ پہلوئی trigonal
			سہ طرفہ مائل triclinic


جدول 6.2 بریولیس کی 14 جالیاں

ایک مکعبی اکائی خانہ میں جوہروں کی تعداد
6.5.1 ابتدائی یا سادہ مکعبی خانہ (sc)



ایک سادہ مکعبی اکائی خانہ کے ہر کونہ میں ایک مماثل جوہر یا رواں
یا سالمہ موجود ہوتا ہے اور وہ مکعب کے کنارے کو چھوتے ہیں، وہ وتر کو
نہیں چھوتے۔ ہر جوہر کا آؤرڈی نیشن عدد 6 ہوتا ہے۔
ایک مکعب اکائی خانہ کے کونے کا ہر جوہر، 8 پڑوسی اکائی خانوں
کے ساتھ سا جھے دار ہے۔ چنانچہ ہر اکائی خانہ $N/8$ کے مساوی ہوتا
ہے، جس میں N_c ، کونوں کے جوہروں کی تعداد ہے۔

6.5.2 جسم مرکزی مکعبی اکائی خانہ (bcc)




ایک جسم مرکزی مکعبی اکائی خانہ کے ہر کونہ میں ایک مماثل ذرہ کے
ساتھ ایک جوہر جسم کے مرکز میں پایا جاتا ہے۔ جوہر ہر کونہ میں
ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوتے، جب کہ وہ تمام مرکز پر
موجود جوہر کو چھوتے ہیں۔ چنانچہ ہر جوہر اپنے قریب میں موجود 8
خانوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کا آؤرڈی نیشن عدد 8 ہے۔ bcc
میں موجود ایک جوہر صرف ایک مخصوص اکائی خانہ کے لئے ہوتا ہے، جو
دیگر اکائی خانوں کے ساتھ سا جھے داری (شیئر) نہیں کرتے۔

$$\begin{aligned} \text{ایک bcc اکائی خانہ میں موجود} \\ \text{جوہروں کی تعداد} \therefore &= \left(\frac{N_c}{8} \right) + \left(\frac{N_b}{1} \right) \\ &= \left(\frac{8}{8} + \frac{1}{1} \right) \\ &= (1 + 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ایک sc اکائی خانہ میں موجود} \\ \text{جوہروں کی تعداد} \therefore &= \left(\frac{N_c}{8} \right) \\ &= \left(\frac{8}{8} \right) = 1 \end{aligned}$$

6.5.3 رُخ مرکزی مکعبی اکائی خانہ (fcc)



کاغذ پر قلموں کی جالی کا خاکہ بنانا آسان نہیں ہے۔ ایک اکائی خانہ میں موجود اجزاء ایک دوسرے کو چھو کر ایک سہ ابعادی جالی بناتے ہیں۔ آسانی کے لئے چھوٹے چھوٹے دائرے (کرے) بنا کر بالترتیب ذرات بنا کر انہیں ان کے قریبی ذرات کے ساتھ چھو کر ایک سیدھی لکیر کھینچیں جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔

6.5.4 اکائی خانہ کے ابعاد سے متعلق حسابات

(Calculations involving unit cell dimensions)

(X-ray کے انکسار کا تجزیہ (X-ray diffraction analysis))

قلموں کی ساخت کے مطالعہ کے لئے بہترین آلہ ہے۔ اس کی مدد سے دو متصل جوہروں کے سطحوں کے درمیان بین سطحی فاصلہ (inter planar distance) (d) کو درج ذیل مساوات کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

اوپر کی اس مساوات کو بریگ کی مساوات کہا جاتا ہے، جس میں λ ، استعمال کردہ x-ray کا موجی طول،

θ زاویہ انکسار (Angle of diffraction) اور

n انکسار کا درجہ (Order of diffraction) ہے۔

λ ، θ ، اور n کی قیمتیں معلوم کر کے ہم d کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

$$d = \frac{n\lambda}{2\sin \theta}$$

ان قیمتوں کو استعمال کر کے ہم ایک اکائی خانہ کے کنارے کی لمبائی معلوم کر سکتے ہیں۔

6.5.5 کثافت محسوب کرنا (Calculation of density)

ایک اکائی خانہ کے کنارے کی لمبائی محسوب کرنے کے بعد قلموں کی کثافت (d) معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\rho = \frac{\text{اکائی خانہ کی کمیت}}{\text{اکائی خانہ کا حجم}} \quad \dots(1)$$

ایک رُخ مرکزی مکعبی اکائی خانہ میں مماثل جوہر، ہر کونے اور ہر رُخ کے مرکز میں پائے جاتے ہیں۔ کونہ میں موجود جوہر، جو سطح پر رُخ کئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوتے۔ رُخ مرکز میں موجود جوہر دو اکائی خانوں کے ساتھ سا جھے داری (شیر) کرتا ہے۔ ہر رُخ مرکز کا ہر جوہر فی اکائی خانہ میں $(\frac{1}{2})$ حصہ داری کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{ایک fcc اکائی خانہ میں موجود جوہروں کی تعداد} &= \left(\frac{N_c}{8} \right) + \left(\frac{N_f}{2} \right) \\ &= \left(\frac{8}{8} + \frac{6}{2} \right) \\ &= (1 + 3) \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\text{اکائی خانہ کی کمیت} = \left\{ \begin{array}{l} \text{اکائی خانہ میں موجود} \\ \text{جملہ جوہروں کی تعداد} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{ایک جوہر کی کمیت} \end{array} \right\} \quad \dots(2)$$

$$\text{ایک جوہر کی کمیت} = \frac{\text{مولار کمیت (gmol}^{-1}\text{)}}{\text{اووگیڈر عدد (mol}^{-1}\text{)}}$$

$$m = \frac{M}{N_A} \quad \dots(3)$$

(3) کو (2) میں بھرتی کرنے پر

$$\text{اکائی خانہ کی کمیت} = n \times \frac{M}{N_A} \quad \dots(4)$$

ایک مکعبی اکائی خانہ میں، تمام کناروں کی لمبائی مساوی ہوتی ہے، یعنی $a = b = c$

$$\text{ایک اکائی خانہ کا حجم} = a \times a \times a = a^3 \quad \dots(5)$$


$$\therefore \text{اکائی خانوں کی کثافت} \rho = n M \quad \dots(6)$$

مساوات (6) میں چار متغیرات ρ, n, M اور a موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی تین متغیرات معلوم ہوں تو چوتھا متغیر معلوم کر سکتے ہیں۔

مثال 2

بیریم میں bcc اکائی خانہ ہے، جس کا طول ایک کنارے پر 508 pm ہے۔ بیریم کی کثافت g cm^{-1} میں کیا ہوگی؟

حل :



$$\rho = \frac{n M}{a^3 N_A}$$

ایسی صورت میں

$$n=2 ; M=137.3 \text{ gmol}^{-1} ; a = 508 \text{ pm} = 5.08 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$\rho = \frac{2 \text{ atoms} \times 137.3 \text{ g mol}^{-1}}{(5.08 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 (6.023 \times 10^{23} \text{ atoms mol}^{-1})}$$

$$\rho = \frac{2 \times 137.3}{(5.08)^3 \times 10^{-24} \times 6.023 \times 10^{23}} \text{ g cm}^{-3}$$

$$\rho = 3.5 \text{ g cm}^{-3}$$

خود کا محاسبہ - 1


- 1- ایک عنصر میں fcc اکائی خانہ ہے، جس کے کنارے کی لمبائی 352.4 pm ہے۔ اس عنصر کی کثافت 8.9 g cm^{-3} ہے۔
100 گرام عنصر میں موجود جوہروں کی تعداد معلوم کیجئے۔
- 2- CsCl کی کثافت معلوم کیجئے، جو bcc قسم کے قلم کی ساخت رکھتا ہے اور اس کے کنارے کی لمبائی 412.1 pm ہے۔
- 3- ایک ٹھوس عنصر جس کی شکل fcc ہے (جوہری عدد 60)۔ اس کے مکعب کے کنارے کی لمبائی $4 \text{ \AA}$ ہے۔ اس کی کثافت معلوم کیجئے۔

6.6 قلموں میں پیکنگ (Packing in crystals)



آئیے ہم ایک پھلوں کی دوکان میں پھلوں کی ترتیب کو فرض کرتے ہیں۔ وہ قریب ترین ترتیب میں جوڑے گئے ہیں جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ ہم اس نظریہ کو قلموں میں موجود اجزاء (جوہر/رواں/سالموں) کو ٹھوس کروں کی طرح فرض کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپسی قوت کشش کے لئے جتنا زیادہ ہو سکے، اتنا قریب سے قریب پیک کرنا چاہئے۔ اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مکعبی اور مسدسی اکائی خانوں میں مشابہ کروں کو پیک کیا جاتا ہے۔ سہ ابعادی ترتیب کا مطالعہ کرنے سے پہلے آئیے کروں کی دو ابعادی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

6.6.1 ایک سمت میں کروں کی خطی ترتیب (Linear arrangement of spheres in one direction)



ایک مخصوص سمت میں کروں کو ترتیب دینے کی صرف ایک ہی


ترتیب ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ اس ترتیب میں ہر کرہ پڑوسی دو کروں کو چھوتا ہے۔

6.6.2 دو ابعادی قریبی پیکنگ (Two dimensional close packing)

(Two dimensional close packing)

دو ابعادی سطحی پیکنگ دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔


(i) AAA ... قسم: (AAA ... type)



ایک سمت میں دو ابعادوں میں کروں کی خطی ترتیب اس طرح کی گئی ہے، یعنی زیادہ صفوں کو ایک ابعادی ترتیب میں لائیں۔ اس میں ہمیں عمودی اور افقی دونوں طرف صف حاصل ہوں گے، جیسا کہ خاکہ

میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلی صف کو A قسم کی ترتیب کو ظاہر کریں تو اس طرح کی پیکنگ AAA قسم کہلاتی ہے، کیونکہ تمام صفیں پہلی صف ہی کی طرح مشابہ ہیں۔ اس ترتیب میں ہر کرہ اپنے اطراف کے چار پڑوسیوں کو چھوتا ہے۔

ABAB... (ii) قسم : (ABAB... type)




اس قسم میں دوسری صف کے کرے اس طرح ترتیب پائے ہوئے ہیں کہ وہ پہلی صف کے گڑھوں میں پیک ہوتے ہیں، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ دوسری صف کو B قسم کہا جاتا ہے۔ تیسری صف، پہلی صف ہی کی طرح پاتی ہے اور چوتھی صف دوسری صف کی طرح ترتیب پاتی ہے۔ یعنی نمونہ کی ترتیب ABAB ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر کرہ اپنے اطراف 6 پڑوسیوں کو چھوتا ہے۔

ان دو ترتیبوں کا موازنہ (AAAA ... قسم اور ABAB ... قسم) کرنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ قریبی ترتیب ABAB ہے۔

6.6.3 سادہ مکعبی ترتیب

(Simple cubic arrangement)




Simple Cubic (SC)

اس ترتیب میں AAAA قسم کے دو ابعاد کو تین ابعاد میں دوہرایا جاتا ہے۔ یعنی پہلی صف کے کرے، اس کے بعد کی صف میں اس طرح ترتیب پاتے ہیں کہ تمام صفیں مشابہ دکھائی دیتے ہیں۔ قلم کے مختلف سطحوں کے تمام کرے منظم طور پر عمودی اور افقی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک سادہ مکعبی ساخت ترتیب پاتی ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔

ایک سادہ مکعبی پیکنگ میں ہر کرہ اپنے اطراف کے 6 پڑوسیوں کو چھوتا ہے۔ 4 اپنی ہی سطح میں، ایک اوپر کی سطح میں اور ایک نیچے کی سطح میں۔ لہذا سادہ مکعبی ترتیب میں کرہ کا کوآرڈینیٹیشن عدد 6 ہے۔

پیکنگ کی کارکردگی (Packing efficiency)

ایک سطح اور اس سے متصل سطحوں کے درمیان بعض خالی جگہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کڑوں کا جملہ حجم میں پائے جانے کا فی صد، ایک ترتیب کے پیکنگ کی کارکردگی کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک سادہ مکعبی ترتیب میں پیکنگ کی کارکردگی محسوب کریں گے۔




$$\text{پیکنگ کسر / کارکردگی} = \frac{\text{ایک اکائی خانہ میں موجود کڑوں کا جملہ حجم}}{\text{ایک اکائی خلیہ کا حجم}} \times 100$$

فرض کریں کہ ایک مکعب جس کے کنارے کی لمبائی a اکائیاں ہیں جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔

$$\text{کنارے کی لمبائی } a \times a \times a = a^3 = \text{مکعب کا حجم}$$


$$\text{فرض کیجئے کہ کرہ کا نصف قطر } r \text{ ہے۔ خاکہ کی مدد سے } a = 2r \Rightarrow r = \frac{a}{2}$$

اس ترتیب میں ہر کرہ کا کوآرڈینیٹیشن عدد 8 ہوتا ہے۔ نیچے کی سطح میں 4 اور اوپر کی سطح میں 4 -



پیکنگ کی کارکردگی (Packing efficiency)

یہاں پر کڑے اہم وتروں کو چھوتے ہیں جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔



In $\triangle ABC$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$AC = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2} a$$

In $\triangle ACG$

$$AG^2 = AC^2 + CG^2$$

$$AG = \sqrt{AC^2 + CG^2}$$

$$AG = \sqrt{(\sqrt{2}a)^2 + a^2}$$

$$AG = \sqrt{2a^2 + a^2} = \sqrt{3a^2}$$

$$AG = \sqrt{3} a$$

چنانچہ r نصف قطر والے کرہ کا حجم

$$= \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^3$$

$$= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a^3}{8}\right)$$

$$= \frac{\pi a^3}{6}$$

... (1)

ایک سادہ مکعبی ترتیب میں، ایک اکائی خانہ میں موجود کڑوں کی تعداد ایک 1 کے مساوی ہے۔

$$\therefore \text{ایک sc اکائی خانہ میں} = 1 \times \left(\frac{\pi a^3}{6}\right) \text{ موجود جملہ کڑوں کا حجم} \quad \dots (2)$$

(2) کو (3) سے تقسیم کرنے پر

$$\text{پیکنگ کی کسر (Packing fraction)} = \frac{\left(\frac{\pi a^3}{6}\right)}{(a^3)} \times 100 = \frac{100 \pi}{6} = 52.38\%$$

یعنی ایک سادہ مکعب کی پیکنگ میں ایک مکمل مکعب میں موجود حجم کا صرف 52.38% حصہ ہی کڑوں نے استعمال کیا ہے۔ اس سے جتنا ہو سکے، اتنی جگہ گھیرا ہے، جس سے قوت کشش بہت کم ہو جاتی ہے۔

مزید جانکاری کے لئے : دوری جدول کے تمام جوہروں میں سے صرف پولونیم کی دھات ہی سادہ مکعبی sc نمونے میں پائی جاتی ہے۔

6.6.4 جسم مرکزی مکعبی ترتیب bcc

(Body centred cubic arrangement)

اس ترتیب میں پہلی سطح (A قسم) کو تھوڑا الگ کیا جاتا ہے اور سطح A کے گڑھوں میں دوسری سطح کے کڑے ترتیب دئے جاتے ہیں جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ تیسری طرح، پہلی سطح کی تکرار ہے یعنی دوبارہ ایسے ہی ترتیب دئے جاتے ہیں۔ یہ نمونہ ABABAB مکمل قلم میں دوہرایا جاتا ہے۔

$$= 2 \times \left(\frac{\sqrt{3} \pi a^3}{16} \right) = \frac{\sqrt{3} \pi a^3}{8}$$

(2) کو (3) سے تقسیم کرنے پر

$$\begin{aligned} \text{پیکنگ کی کسر (Packing fraction)} &= \frac{\left(\frac{\sqrt{3} \pi a^3}{8} \right)}{(a^3)} \times 100 \\ &= \frac{\sqrt{3} \pi}{8} \times 100 \\ &= \sqrt{3} \pi \times 12.5 \\ &= 1.732 \times 3.14 \times 12.5 \\ &= 68 \% \end{aligned}$$

یعنی ایک bcc کی پیکنگ میں ایک مکمل مکعب میں موجود حجم کا صرف 68% حصہ ہی کڑوں نے استعمال کیا ہے۔ سادہ مکعبی sc پیکنگ کی بہ نسبت bcc میں کارکردگی زیادہ ہے۔

$$\text{i.e., } \sqrt{3}a = 4r$$

$$r = \frac{\sqrt{3}}{4} a$$

چنانچہ نصف قطر r والے کڑے کا حجم

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{3} \pi r^3 \\ &= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{4} a \right)^3 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{16} \pi a^3 \end{aligned} \quad \dots(1)$$

ایک bcc ترتیب میں اکائی خانہ میں موجود کڑوں کی تعداد 2 ہے۔ لہذا یہ تمام کڑوں کا جملہ حجم ہوگا۔

6.6.5 مسدسی اور رُخ مرکزی مکعبی ترتیب


(The Hexagonal and face centred cubic arrangement)


پہلی سطح کی تشکیل: (Formation of first layer):

دو ابعادی ترتیب سے جس طرح ABAB ترتیب میں پہلی سطح بنائی گئی، اسی طرح پہلی سطح بنائی جاتی ہے یعنی دوسری صف کے کڑے، پہلی صف کے گڑھوں (depressions) میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس سطح کو a نام دیں۔ پہلی سطح کے گڑھوں میں اس کے بعد کی سطح، بنائی جاتی ہے۔ اب دوسری سطح کو b نام دیں۔

دوسری سطح کی تشکیل: (Formation of second layer):

پہلی سطح (a) میں دو طرح کی خالی جگہیں (voids or holes) پائی جاتی ہیں۔ اور ان کو x اور y نام دیا جاتا ہے۔ دوسری سطح کے کڑوں کو x یا y (voids or holes) کے گڑھوں میں دوسری سطح b بنائی جاتی ہے۔ آئیے x کے گڑھوں میں کڑوں کو رکھ کر دوسری سطح بنانے کے بارے میں فرض کریں۔





خالی جگہوں کی تعداد قریب ترین پیک شدہ کرویوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ اگر قریب ترین پیک شدہ کرویوں کی تعداد 'n' ہو تو آٹھ سطحی خالی جگہوں (Octahedral voids) کی تیار شدہ تعداد n کے مساوی ہوگی اور چار سطحی خالی جگہوں (Tetrahedral voids) کی تیار شدہ تعداد 2n کے مساوی ہوگی۔

جہاں کہیں بھی دوسری سطح (b)، پہلی سطح (a) کے اوپر کی خالی جگہ (x) پر رکھی جاتی ہے، تو ایک سہ پہلو اہرامی شکل (چار سطحی) (Tetrahedral) کی خالی جگہ بنتی ہے۔ اس میں چار کرے ہوتے ہیں۔ تین سطحی سطح a اور ایک اوپری سطح b میں۔ جب ان چار کرویوں کے مرکزوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایک سہ پہلو اہرامی شکل بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی سطح (a) کی خالی جگہ (y) جزوی طور پر سطح (b) پر چھا (cover) جاتی ہے۔ (a) کی خالی جگہ کو آٹھ سطحی خالی جگہ (octahedral void) کہتے ہیں۔ اس میں 6 کرے ہوتے ہیں، تین سطح (a) کے نیچے اور تین سطح (b) کے اوپر۔ جب ان چھ کرے کے مرکزوں کو جوڑا جاتا ہے تو ایک آٹھ سطحی (Octahedron) بنتا ہے۔ اسی طرح پہلی سطح (a) اور دوسری سطح (b) کے تین کرے سے نئے آٹھ سطحی خالی جگہیں یا holes بنتے ہیں۔

تیسری سطح کا بننا (Formation of third layer)

قریب ترین پیکنگ حاصل کرنے کے لئے کرے کی تیسری سطح کو دو طریقوں سے ترتیب دیا جاسکتا ہے

(i) aba ترتیب - hcp ساخت


(ii) abc ترتیب - ccp ساخت

کروں کو گڑھوں میں اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ تیسری سطح براہ راست اوپر کی سطح پر ترتیب پاتی ہے، جیسا کہ خاکہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس abc ترتیب کو hexagonal close pack (hcp) (معدنی قریب ترین پیک) کہتے ہیں۔ اس ترتیب میں دوسری سطح کے سہ پہلو اہرامی خالی جگہوں پر تیسری سطح کے کرے چھا جاتے ہیں۔ (Cover)


متبادل طور پر دوسری سطح پر تیسری سطح کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ تیسری سطح کے آٹھ سطحی خالی جگہوں میں برابر فٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسری سطح کی ترتیب (a) اور (b) دونوں سے مختلف ہے، لہذا تیسری سطح کو (c) نام دیا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح abcabcabc... سطحیں بنتی جاتی ہیں تو اس طرح کی ترتیب کو مکعبی قریب ترین پیکنگ (ccp) (cubic close pack) ساخت کہتے ہیں۔

hcp اور ccp دونوں ترتیبوں میں ہر کرے کا کوآرڈینیٹیشن عدد 12 ہوتا ہے۔ 6 اپنے ہی پڑوسی کرے کے ساتھ، 3 اوپر کی سطح سے اور 3

نیچے کی سطح سے۔ یہی سب سے کارکردہ پیکنگ (most efficient packing) ہے۔




aba ترتیب - hcp ساخت
aba arrangement - hcp structure



abc ترتیب - ccp ساخت
abc arrangement - ccp structure

fcc کی بنیاد پر ccp بنتی ہے۔ آئیے ہم fcc اکائی خانہ کی پیکنگ کی کارکردگی محسوب کریں



خاکہ کی مدد سے

$$\begin{aligned} AC &= 4r \\ 4r &= a\sqrt{2} \\ r &= \frac{a\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

In ΔABC

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2}$$

$$AC = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2} a$$

$$\begin{aligned} \text{نصف قطر } r \text{ کے ساتھ کرہ کا حجم} &= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{2}a}{4} \right)^3 \\ &= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{2\sqrt{2}a^3}{64} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2} \pi a^3}{24} \end{aligned}$$

ایک اکھرے fcc اکائی خانے میں موجود کرویوں کی تعداد 4 ہے۔

$$\begin{aligned} \text{چنانچہ ایک fcc اکائی خانے} &= 4 \times \left(\frac{\sqrt{2} \pi a^3}{24} \right) \\ \text{میں موجود تمام کرویوں کی تعداد} & \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2} \pi a^3}{6} \right)$$

$$\text{پیکنگ کی کارکردگی} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2} \pi a^3}{6} \right)}{(a^3)} \times 100$$

$$= \frac{\sqrt{2} \pi}{6} \times 100$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1.414 \times 3.14 \times 100}{6} \\ &= 74\% \end{aligned}$$

نصف قطر کی نسبت (Radius ratio)

روانی مرکبات کی ساخت ان کے روانوں کی کیمیائی مقدار (Stoichiometry) اور ساخت پر منحصر ہے۔ عام طور پر قریب ترین پیک کردہ ترتیبوں میں بڑے منفرواں ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں اور مشرواں خالی جگہوں (Voids) میں ہوتے ہیں۔ مشرواں اور منفرواں کے نصف قطر کی نسبت $\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}} \right)$ ساخت کو متعین کرنے میں اہم رول انجام دیتے ہیں۔ درج ذیل جدول روانی ٹھوس اشیاء میں نصف قطر کی نسبت اور ساختی ترتیب کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔

Example	Structure	Coordination number	کوآرڈینیٹیشن عدد	$\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}} \right)$
B ₂ O ₃	مثلاثی سطح	3		0.155 – 0.225
ZnS	سہ پہلو اہرامی	4		0.225 – 0.414
NaCl	آٹھ سطحی	6		0.414 – 0.732
CsCl	مکعبی	8		0.732 – 1.0

جدول 6.3 نصف قطر کی نسبت

6.7 ٹھوس میں نقص (Imperfection in solids)

قدرت کے اصول کے مطابق کوئی بھی چیز بے نقص نہیں ہے اور اسی طرح قلمیں بھی بے نقص نہیں ہیں۔ ان کے ذرات کی ترتیب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ یہ نقص ان کی طبعی اور کیمیائی خواص پر اثر کرتے ہیں اور مختلف عمل پر اثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عمل جسے نشہ آور کرنا (Doping) کہتے ہیں،

وہ قلموں کی بے نقصی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ سلیکان جیسے نیم موصل اشیاء کی برقی ایصالیت کو بڑھاتی ہے۔
لوہا، نکل جیسے فیرو مقناطیسی اشیاء کو مقناطیسی اور غیر مقناطیسی کا عمل بھی انہی نقائص کی وجہ سے ہے۔
قلموں کے نقائص کی درجہ بندی اس طرح کی گئی ہے۔


(1) نقطوں کا نقص (Point defects)

(2) خطی نقص (Line defects)

(3) بین خلوی نقص (Intrinsic defects)


(4) حجمی نقص (Volume defects)

اس باب میں ہم نقطوں کے نقص، وہ بھی خصوصی طور پر ٹھوس روانی اشیاء میں ان نقائص کا مطالعہ کریں گے۔
نقطوں کے نقائص کو مزید اس طرح سے درجہ بند کیا گیا ہے۔



روانی ٹھوس اشیاء میں کیمیائی مقدار کا نقص (Stoichiometric defects in ionic solids)

اس نقص کو حرر کی نقص (Thermodynamic defect) یا بین خلوی نقص (Intrinsic defect) بھی کہا جاتا ہے۔ روانی قلموں میں ایک رواں کی جگہ خالی ہوتی ہے، جو مخالف بار بردار رواں کی غیر موجودگی یا خالی جگہوں میں یکساں بار بردار رواں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے برقی تعدیلیت برقرار رہتی ہے۔



شٹ کا نقص

6.7.1 شٹ کا نقص (Shottky defect)


یہ نقص مساوی تعداد کے مثبت رواں اور منفرواں کے غائب ہونے (missing) سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے قلم کی کیمیائی مقدار (stoichiometry) میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔
روانی ٹھوس اشیاء جس میں مثبت رواں اور منفرواں دونوں کی جسامت مشابہ ہوتی ہے، اس سے شٹ کا واقع ہوتا ہے۔

مثال NaCl

زیادہ تعداد میں شٹ کی کے نقص سے اس کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔

مثال کے طور پر وینیڈیم مونا کسائیڈ (VO) کی طبعی کثافت 6.5 g cm^{-3} ہے۔ مگر تجرباتی کثافت 5.6 g cm^{-3} ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ VO کی قلموں میں تقریباً 14% شٹ کی نقص پایا جاتا ہے۔ شٹ کی نقص کی موجودگی سے ایک قلم کے جوہر یا رواں قلموں کے اندر آسانی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔


6.7.2 فرنکل نقص (Frenkel Defect)



فرنکل نقص

روانوں کی جالی میں سے رواں کا اس کے مقام سے ہٹنے سے فرنکل نقص واقع ہوتا ہے۔ جالی سے نکلا ہوا رواں بین خلوی مقام پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے روانی ٹھوس اشیاء میں ہوتا ہے جس میں مثبت رواں اور منفروانوں کی جسامت مختلف ہوتی ہے۔ شٹ کی نقص کی طرح فرنکل نقص ٹھوس کی کثافت پر اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر AgBr میں Ag^+ کا رواں اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ اور درمیانی جگہ میں قائم ہو جاتا ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔

6.7.3 اضافی دھات کا نقص (Metal Excess defect)




اضافی دھات کا نقص

منفروانوں کی بہ نسبت دھاتی روانوں کی تعداد زیادہ ہو تو اضافی دھات کا نقص پیدا ہوتا ہے۔ قلعوی دھاتی ہیلائیڈ (Alkali metal halides) جیسے NaCl، KCl وغیرہ اس طرح کے نقص کو ظاہر کرتے ہیں۔ منفرواں کی خالی جگہوں کے ساتھ مساوی دھاتی روانوں کو رکھ کر یا درمیانی جگہیں اضافی مثبت رواں اور الیکٹرانوں کو رکھ کر اس میں برقی تعدیلیت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر جب NaCl کی قلموں کو سوڈیم کے بخارات کی موجودگی میں گرم کیا جاتا ہے تو Na^+ کے رواں قلموں کی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں۔ کلورائیڈ کے رواں Cl^- قلموں کی جالیوں میں سے نفوذ کر جاتے ہیں اور Na^+ رواں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ سوڈیم کے بخارات سے کھونے والے الیکٹران قلموں کی جالی سے نفوذ پا کر Cl^- کی طرف سے خالی کردہ جگہوں (بین خلوی جگہوں) پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسی منفرواں کی خالی جگہیں جس میں غیر جوڑی دار الیکٹران (Unpaired electron) قائم ہوتے ہیں، F مرکز کہلاتے ہیں۔ لہذا وہ NaCl کی قلم جس میں Na^+ کے رواں پائے جاتے ہیں۔ ان کا ضابطہ اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔ Na_{1+x}Cl

کمرے کی تپش پر ZnO بے رنگ ہوتا ہے۔ جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو یہ زرد ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے پر وہ آکسیجن کھوتا ہے، جس سے Zn^{2+} کے رواں آزاد ہوتے ہیں۔ Zn^{2+} کے اضافی رواں اندرونی بین خلوی جگہوں میں داخل ہوتے ہیں اور الکٹرن بھی بین خلوی جگہوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔



دھات کی کمی کا نقص

6.7.4 دھات کی کمی کا نقص

(Metal deficiency defect)

منفردانوں کی بہ نسبت مشرورانوں کی تعداد کم ہو تو دھات کی کمی کا نقص واقع ہوتا ہے۔ قلمیں جس میں مشرورانوں کی تکسیدی حالت (Oxidation state) متغیر ہو تو اس قسم کا نقص واقع ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر FeO کی قلموں میں Fe^{2+} کے بعض رواں قلموں کی جالی سے غائب ہوتے ہیں۔ برقی تعدیلیت

(Neutrality) کو برقرار رکھنے کے لئے قلم کے Fe^{2+} رواں انوں کی دوہری تعداد کے رواں تکسید پا کر Fe^{3+} رواں بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں O^{2-} رواں انوں کی بہ نسبت Fe^{2+} اور Fe^{3+} کے جملہ رواں انوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ فیرس آکسائیڈ کا عام ضابطہ Fe_xO ہے۔ جس میں x کی قیمت 0.93 سے 0.98 ہے۔

6.7.5 لوٹ (غیر خالص پن) کا نقص (Impurity defect)

روانی ٹھوس اشیاء میں نقص کو داخل کرنے کا ایک عام طریقہ لوٹ (غیر خالص) رواں انوں کو شامل کرنا ہے۔ اگر غیر خالص رواں انوں کی گرتی حالت (Valence State) میزبان رواں سے کم ہو تو میزبان قلم کی جالی میں خالی جگہیں (Vacancies) پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر $CdCl_2$ کے ساتھ $AgCl$ شامل کرنے پر ٹھوس محلول حاصل ہوتا ہے جس میں دو گرتہ Ag^{2+} کی جگہ میں دو گرتہ Cd^{2+} بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے قلم کی برقی تعدیلیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لئے مناسب تعداد کے Ag^{+} رواں جالی سے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جالی میں مشروران کی خالی جگہ (Vacancy) پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے قلمی نقص کو لوٹ یا غیر خالص پن کا نقص کہتے ہیں۔



پیزو الیکٹرک قلموں سے توانائی حاصل کرنا (Energy harvesting by piezoelectric crystals)

پیزو برقی رو، (پیزو برقی اثر) (Piezoelectric effect) کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک قلم کو میکائیٹک طور پر زور یا دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس سے برقی تفاوت پیدا ہوتی ہے۔ پیزو الیکٹریسٹی کا مطلب دباؤ اور مخفی حرارت سے برقی رو حاصل

کرنا ہے۔ اس کا برعکس بھی ممکن ہے جسے معکوس پیزو الیکٹرک اثر کہتے ہیں۔

ایک قلم پر دباؤ یا زور دے کر ایک چھوٹی مقدار میں برقی رو حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی قلموں کو زور دینے پر کچھ مقدار میں برقی رو حاصل ہو سکتی ہے۔ جب پیزو الیکٹرک قلموں کو سڑکوں پر بچھا کر اس سے گزرنے والی گاڑیوں کے وزن پڑنے پر توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔

اس طریقہ نے کئی لوگوں میں دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ حالانکہ زیادہ مقدار میں برقی رو حاصل کرنا مشکل ہے۔ مگر کم از کم اسے موبائل چارجنگ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایسے جوتے تیار کئے جاسکتے ہیں جن کے تلوؤں پر پیزوالکٹرک کی فلمیں نصب کی جاسکتی ہیں۔ چہل قدمی کے دوران اتنی مقدار میں برقی رو حاصل ہو جاتی ہے کہ اس سے بیٹری اور USB چارج کئے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ

- ❖ ٹھوس اشیاء کی معین حجم اور شکل ہوتی ہے۔
- ❖ ترتیب اور ترکیب کی بنیاد پر ہم نے ٹھوس اشیاء کو دو اہم حصوں میں درجہ بندی کی ہے۔ (i) قلمی ٹھوس اشیاء (ii) نقلی ٹھوس اشیاء
- ❖ قلمی ٹھوس وہ اشیاء ہیں، جن کے اجزاء (جوہر، رواں یا سالمے) طویل حد تک ایک منظم ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں۔
- ❖ قلمی ٹھوس اشیاء (amorphous کے معنی no form بغیر شکل کے) کے اجزاء بے ترتیبی سے جڑے ہوتے ہیں۔
- ❖ قلمی ٹھوس اشیاء میں جوہروں، روانوں یا سالموں کا ایک متعین رویہ (Orientation) پایا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک سہ ابعادی نمونے کے طور پر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک قلم میں ان انواع کی منظم ترتیب قلمی جالی (Crystal lattice) کہلاتی ہے۔
- ❖ ایک ٹھوس قلم کی مکرر ساختی اکائی اکائی خانہ (Unit cell) کہلاتی ہے۔ درج ذیل خاکہ جالی دار نقطہ اور اکائی خانہ کو ظاہر کرتا ہے۔
- ❖ ایک قلم کو اس طرح فرض کیا جاسکتا ہے کہ اس میں متعدد اکائی خانے موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی اکائی خانہ کے ساتھ خلاء میں مشابہت کے ساتھ ترتیب پائے ہوئے ہیں جو ایک قلم کے ذرہ کے اطراف گھرے ہوتے ہیں۔
- ❖ سات ابتدائی قلمی نظام پائے جاتے ہیں۔ مکعبی (Cubic)، (Rhombohedral)، مسدسی (Hexagonal)، چہار زاویہ والا (Tetragonal)، عمودی معین (orthorhombic)، یک طرفہ مائل (Monoclinic)، سہ طرفہ مائل (Triclinic) جیسا کہ خاکہ میں بتایا گیا ہے۔
- ❖ ایک سادہ مکعبی اکائی خانہ (sc) کے ہر کونہ میں ایک مماثل جوہر یا رواں یا سالمہ موجود ہوتا ہے اور وہ مکعب کے کنارے کو چھوتے ہیں، وہ وتر کو نہیں چھوتے۔ ہر جوہر کا کوآرڈینیٹیشن عدد 6 ہوتا ہے۔
- ❖ ایک جسم مرکزی مکعبی اکائی خانہ (bcc) کے ہر کونہ میں ایک مماثل ذرہ کے ساتھ ایک جوہر جسم کے مرکز میں پایا جاتا ہے۔ جوہر ہر کونہ میں ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوتے، جب کہ وہ تمام مرکز پر موجود جوہر کو چھوتے ہیں۔ چنانچہ ہر جوہر اپنے قریب میں موجود 8 خانوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کا کوآرڈینیٹیشن عدد 8 ہے۔
- ❖ ایک رخ مرکزی مکعبی اکائی خانہ (fcc) میں مماثل جوہر، ہر کونے اور ہر رخ کے مرکز میں پائے جاتے ہیں۔ کونہ میں موجود جوہر، جو سطح پر رخ کئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نہیں چھوتے۔ رخ مرکز میں موجود جوہر دو اکائی خانوں کے ساتھ ساجھے داری (شیر) کرتا ہے۔ ہر رخ مرکز کا ہر جوہر فی اکائی خانہ میں $(\frac{1}{2})$ حصہ داری کرتا ہے۔

❖ x-ray کے انکسار کا تجزیہ ((X-ray diffraction analysis) قلموں کی ساخت کے مطالعہ کے لئے بہترین آلہ ہے۔ اس کی مدد سے دو متصل جوہروں کے سطحوں کے درمیان بین سطحی فاصلہ (d) (inter planar distance) کو درج ذیل مساوات کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ $2d \sin\theta = n\lambda$

❖ روانی مرکبات کی ساخت ان کے روانوں کی کیمیائی مقدار (Stoichiometry) اور ساخت پر منحصر ہے۔ عام طور پر قریب ترین پیک کردہ ترتیبوں میں بڑے منفرواں ترتیب پائے ہوئے ہوتے ہیں اور مشرواں خالی جگہوں (Voids) میں ہوتے ہیں۔ مشرواں اور منفرواں کے نصف قطر کی نسبت (r_C/r_A) ساخت کو متعین کرنے میں اہم رول انجام دیتے ہیں۔

❖ ذراتی اجزاء کے ترتیب کی بنیاد پر قلموں میں ہمیشہ بعض نقص پائے جاتے ہیں۔

❖ شٹ کی نقص مساوی تعداد کے مشرواں اور منفرواں کے غائب ہونے (missing) سے پیدا ہوتا ہے۔

❖ روانوں کی جالی میں سے رواں کا اس کے مقام سے ہٹنے سے فریکل نقص واقع ہوتا ہے۔

❖ منفروانوں کی بہ نسبت دھاتی روانوں کی تعداد زیادہ ہو تو اضافی دھات کا نقص پیدا ہوتا ہے۔

❖ منفروانوں کی بہ نسبت مشروانوں کی تعداد کم ہو تو دھات کی کمی کا نقص واقع ہوتا ہے۔



محاسبہ



صحیح جواب منتخب کیجئے۔

1- گرافائٹ اور ہیرا یہ ہیں۔

(a) ہم گرفتہ اور سالمی قلمیں (b) روانی اور ہم گرفتہ قلمیں

(c) دونوں ہم گرفتہ قلمیں (d) دونوں سالمی قلمیں

2- ایک روانی مرکب جس کا ضابطہ $AxBy$ ہے، وہ fcc قسم میں قلمی شکل اختیار کرتا ہے جس میں B رواں مکعب کے ہر رخ کے درمیان میں ہوتے ہیں اور A رواں مکعب کے کونوں پر واقع ہوتے ہیں۔ $AxBy$ کا صحیح ضابطہ ہے۔

AB (a) AB₃ (b)

A₃B (c) A₈B₆ (d)

3- ایک ملعی پیکنگ میں قریب ترین پیک شدہ جوہر اور چار سطحی خالی جگہ (tetrahedral) کی نسبت ہے۔

1:1 (a) 1:d (b)

2:1 (c) 1:4 (d)

4- ٹھوس CO₂ اس کی ایک مثال ہے۔

(a) ہم گرفتہ ٹھوس (b) دھاتی ٹھوس

(c) سالمی ٹھوس (d) روانی ٹھوس

5- توثیق (A) : ایک طرفہ مائل (Monoclinic) قلمی نظام کی ایک مثال ایک طرفہ مائل سلفر ہے۔

سبب (R) : ایک طرفہ مائل نظام میں $a \neq b \neq c$ اور $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$

(a) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توثیق کی صحیح وضاحت سبب کرتا ہے۔

(b) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توثیق کی صحیح وضاحت سبب نہیں کرتا ہے۔

(c) توثیق (A) صحیح ہے مگر سبب غلط ہے۔

(d) توثیق (A) اور سبب (R) دونوں غلط ہیں۔

6- کیلشیم فلورائیڈ، جس کی ساخت فلورائیٹ نمونہ ہوتی ہے، اس میں Ca^{2+} اور F^- رواں کے کوآرڈی نیشن اعداد ہیں۔ (NEET)

(a) 4 اور 2 (b) 6 اور 6

(c) 8 اور 4 (d) 4 اور 8

7- 8 گرام کا ایک عنصر (جو ہری عدد 40) جو bcc نمونہ میں قلم بنتا ہے، اس موجودہ کائی خانوں کی تعداد (NA) اوگیڈرو عدد ہے)

(a) 6.023×10^{23} (b) 6.023×10^{22}

(c) 60.23×10^{23} (d) $\left(\frac{6.023 \times 10^{23}}{8 \times 40} \right)$

8- ایک ٹھوس شے میں جو ہر M ، ccp جالی کی ساخت رکھتا ہے اور چہار سطحی کے گڑھوں (Tetrahedral voids) کے $\left(\frac{1}{3} \right)$ حصوں میں N جو ہر موجود ہیں۔ M اور N سے بننے والے ٹھوس کا ضابطہ بتائیے۔

(a) MN (b) M₃N (c) MN₃ (d) M₃N₂

9- A⁺ اور B⁻ کے جوہری نصف قطریں $0.98 \times 10^{-10} \text{m}$ اور $1.81 \times 10^{-10} \text{m}$ ہیں۔ AB کے ہر رواں کا کوآرڈی نیشن عدد ہے

(a) 8 (b) 2 (c) 6 (d) 4

10- CsCl میں bcc ترتیب پائی جاتی ہے۔ اس کے اکائی خانہ کے کنارے کی لمبائی 400 pm ہے۔ اس کا بین جوہری فاصلہ ہے

(a) 400 pm (b) 800 pm (c) $\sqrt{3} \times 100 \text{pm}$ (d) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times 400 \text{pm}$

11- XY قسم کا ایک ٹھوس مرکب NaCl کی ساخت رکھتا ہے۔ اگر مشہور واں کا نصف قطر 100 pm ہو تو منفرواں کا نصف قطر ہوگا۔

(a) $\left(\frac{100}{0.414} \right)$ (b) $\left(\frac{0.732}{100} \right)$ (c) 100×0.414 (d) $\left(\frac{0.414}{100} \right)$

12- bcc جالی کے خانوں میں خالی جگہ ہوتی ہے۔

(a) 48% (b) 23% (c) 32% (d) 26%

13- ایک جوہر کا نصف قطر 300 pm ہے۔ اگر یہ fcc مکعبی جالی کی طرح قلم بنتا ہے تو اکائی خانہ کے کنارے کی لمبائی ہے۔

(a) 488.5 pm (b) 848.5 pm (c) 884.5 pm (d) 484.5 pm

14- ایک سادہ مکعب میں جوہروں کے پیکنگ کے جملہ حجم کا کسر

(a) $\left(\frac{\pi}{4\sqrt{2}}\right)$ (b) $\left(\frac{\pi}{6}\right)$ (c) $\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (d) $\left(\frac{\pi}{3\sqrt{2}}\right)$

15- NaCl کے قلم میں زرد رنگ کی وجہ ہے۔

(a) F مرکزوں میں الیکٹرانوں کا مشتعل ہونا (Excited)

(b) سطح پر Cl- رواں سے روشنی کا منعکس ہونا

(c) Na+ رواں سے روشنی کا انحراف ہونا

(d) اوپر کے تمام

16- مکعبی نظام sc, bcc اور fcc میں اگر a ان کے کناروں کی لمبائی کو ظاہر کرتا ہے تو، ان نظاموں کے کڑوں کے نصف قطروں

بالترتیب یہ ہوگی۔ (a) $\left(\frac{1}{2}a : \frac{\sqrt{3}}{2}a : \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$ (b) $\left(\sqrt{1}a : \sqrt{3}a : \sqrt{2}a\right)$

(c) $\left(\frac{1}{2}a : \frac{\sqrt{3}}{4}a : \frac{1}{2\sqrt{2}}a\right)$ (d) $\left(\frac{1}{2}a : \sqrt{3}a : \frac{1}{\sqrt{2}}a\right)$

17- اگر ایک مکعب کے ضلع کی لمبائی a ہو تو، مکعب کے جسم کے مرکز سے ایک کونہ کا درمیانی فاصلہ یہ ہوگا۔

(a) $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)a$ (b) $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)a$

(c) $\left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)a$ (d) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$

18- پوٹاشیم میں bcc ساخت ہے جس کے قریبی جوہر کا فاصلہ $4.52 \text{ \AA}$ ہے۔ اس کا جوہری عدد 39 ہے۔ اس کی کثافت یہ ہو

(a) 915 kg m^{-3} (b) 2142 kg m^{-3} (c) 452 kg m^{-3} (d) 390 kg m^{-3}

19- ایک قلم میں شاٹ کی نقص واقع ہوگا جب

(a) قلمی جالی سے غیر مساوی تعداد کے مشبرواں اور منفرواں غائب ہوں۔

(b) قلمی جالی سے مساوی تعداد کے مشبرواں اور منفرواں غائب ہوں۔

(c) ایک رواں اپنے مقام سے ہٹ کر بین خلوی جگہ پر قائم ہو جائے۔

(d) قلمی جالی سے کوئی بھی رواں غائب نہ ہو۔

20- ایک قلم میں مشبر واں اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے اور کسی بین خلوی مقام پر قائم ہو جاتا ہے۔ قلم میں اس قسم کے نقص کو یہ کہتے ہیں۔

(b) F مرکز

(a) شٹ کی نقص

(d) غیر کیمیائی مقدار کا اثر (Non-stoichiometric defect)

(c) فرنکل نقص

12- توشیق (A) : فرنکل نقص کی وجہ سے قلمی ٹھوس کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔

سبب (R) : فرنکل نقص مشبر واں اور منفرواں قلم سے باہر نکل جاتے ہیں۔

(a) توشیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توشیق کی صحیح وضاحت سبب کرتا ہے۔

(b) توشیق (A) اور سبب (R) دونوں صحیح ہیں اور توشیق کی صحیح وضاحت سبب نہیں کرتا ہے۔

(c) توشیق (A) صحیح ہے مگر سبب غلط ہے۔

(d) توشیق (A) اور سبب (R) دونوں غلط ہیں۔

22- دھات کی کمی کا نقص والے قلم کی مثال ہے

(d) KCl


(c) ZnO

(b) FeO

(a) NaCl

23- X اور Y نامی دو مختلف جوہروں سے ایک دوابعادی ٹھوس نمونہ بنتا ہے جیسا کہ خاکہ میں بتلایا گیا ہے۔ سیاہ اور سفید خانے بالترتیب

X اور Y کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمونہ سے اکائی خانہ کی بنیاد پر مرکب کا سادہ ترین ضابطہ یہ ہے۔



(d) XY_4

(c) XY_2

(b) X_4Y_9

(a) XY_8

درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔

1- اکائی خانہ کی وضاحت کیجئے۔

2- روانی قلموں کی کوئی تین خصوصیات بتائیے۔

3- قلمی ٹھوس اشیاء اور نقلی ٹھوس اشیاء میں فرق کیجئے۔

4- درج ذیل ٹھوس اشیاء کی درجہ بندی کیجئے۔

(e) ایوڈین

(d) NaCl

(c) ہیرا

(b) پیتل

(a) P_4

5- سات قسم کے اکائی خانوں کی مختصر وضاحت کیجئے۔

6- مسدسی قریب ترین پیکنگ اور ملکی قریب ترین پیکنگ میں فرق کیجئے۔

- 7- چار سطحی (Tetrahedral) اور آٹھ سطحی (Octahedral) جگہوں (Voids) میں فرق کیجئے۔
- 8- نقطہ کے نقائص کیا ہیں؟
- 9- شاٹ کی نقص کی وضاحت کیجئے۔
- 10- دھات کے اضافہ کا نقص اور دھات کی کمی کے نقص کے بارے میں مثال کے ساتھ ایک مختصر نوٹ لکھئے۔
- 11- ایک fcc اکائی خانہ میں جوہروں کی تعداد محسوب کیجئے۔
- 12- ایک صاف نقشہ کے ذریعہ AAAA اور ABABA اور ABCABC قسم کے سہ ابعادی پیکنگ کی وضاحت کیجئے۔
- 13- روانی قلمیں، کیوں سخت اور پھونک ہوتے ہیں؟
- 14- ایک bcc قلم میں پیکنگ کی کارکردگی کا فی صد محسوب کیجئے۔
- 15- ایک مربعی قریب پیکنگ کی سطح والے ایک سالمہ میں دو ابعادی کوآرڈینیٹیشن عدد کیا ہوگا؟
- 16- اصطلاح ”کوآرڈینیٹیشن عدد“ سے کیا مراد ہے؟ ایک bcc ساخت میں جوہروں کا کوآرڈینیٹیشن عدد کیا ہے؟
- 17- bcc ساخت والے ایک عنصر کے کنارے کی لمبائی 288 pm ہے۔ اس عنصر کی کثافت 7.2 g cm^{-3} ہے۔ 208 g عنصر میں موجود جوہروں کی تعداد کتنی ہے؟
- 18- المونیم ایک ملکی قریب ترین پیکنگ ساخت میں قلم بنتا ہے۔ اس کا دھاتی نصف قطر 125 pm ہے۔ اس کے اکائی خانہ کے کنارے کی لمبائی محسوب کیجئے۔
- 19- اگر NaCl میں 10^{-2} فی صد اسٹرائیم کلورائیڈ کے ساتھ نشہ آور (dope) کیا جائے، مشرواں کے خالی جگہ (vacancy) کا ارتکاز کیا ہوگا؟
- 20- سوڈیم کلورائیڈ ہی کی طرح KF بھی fcc ساخت میں قلم بنتا ہے۔ KF میں K^+ اور Cl^- کا درمیانی فاصلہ محسوب کرو۔
(دیا گیا ہے : KF کی کثافت 2.48 g cm^{-3} ہے)۔
- 21- ایک جوہر bcc قلمی جالی کی ساخت میں قلم بنتا ہے۔ اس کی کثافت 10 g cm^{-3} ہے اور اکائی خانہ کی لمبائی 100 pm ہے۔ ایک گرام کے قلم میں موجود جوہروں کی تعداد محسوب کیجئے۔
- 22- X اور Y نامی دو جوہر bcc قلمی ساخت رکھتے ہیں۔ جوہر X مکعب کے کونے میں موجود ہے، اور Y مکعب کے مرکز میں موجود ہے۔ اس مرکب کا ضابطہ کیا ہے؟
- 23- سوڈیم کی دھات bcc قلمی ساخت رکھتی ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی 4.3×10^{-8} ہے۔ سوڈیم کے رواں کا نصف قطر محسوب کیجئے۔
- 24- فرنکل نقص پر ایک نوٹ لکھئے۔

ٹھوس






CRYSTAL SYSTEMS قلمی نظام


اس آلہ کو استعمال کر کے تم مختلف قلموں کے نظاموں کے بارے میں اور ان کے اکائی خانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔

اس URL میں جائیے
<http://vlab.amrita.edu>
(یا) دائیں جانب دے گئے
QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔

مرحلے :

- دے گئے URL کو ٹائپ کیجئے یا QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔ وب پیج میں physical science tab پر کلک کیجئے، اس کے بعد solid state virtual lab پر کلک کیجئے۔ اس کے بعد crystal structure پر کلک کر کے simulator پر کلک کیجئے۔
- نوٹ : اس وب پیج میں جانے کے لئے ایک مرتبہ sign up کی ضرورت ہے۔ اپنے User name اور password کو استعمال کرتے ہوئے login کیجئے۔ login کے بعد simulator ٹیب پر کلک کیجئے۔
- اب مینو (box 1) کو استعمال کر کے سات کرسٹل کے نظاموں اور جالی کی قسموں میں سے کسی ایک پر کلک کیجئے۔ اب اکائی خانہ کا انتخاب کرنے سے اسکرین پر جالی کا نظام ظاہر ہوگا (box 2)۔ measurement tab (box 3) میں اکائی خانہ کی پیمائشیں بھی اسکرین پر ظاہر ہوں گی۔





UNIT 7



Svante August Arrhenius
(1859 – 1927)

سیکھنے کے مقاصد



- اس سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہو سکتے ہیں کہ
- تعامل کی ترتیب (order) اور شرح کی تعریف کر سکیں گے۔
- صفر اور پہلی ترتیب تعامل کے لئے مربوط شرح مساوات (integrated rate equation) کا اظہار کر سکیں گے۔
- نصف حیاتی مدت Half-life Period کی تشریح کر سکیں گے۔
- تصادم کے نظریہ کی تشریح کر سکیں گے۔
- کسی تعامل کی شرح کے درجہ حرارت پر انحصار متبادلہ خیال کر سکیں گے اور
- تعامل کی شرح پر متاثر کرنے والے مختلف عوامل کی وضاحت کر سکیں گے۔


Svante August Arrhenius

سوانت آگسٹ ارہینیس سویڈن کے سائنسدان تھے۔ ارہینیس (Arrhenius) سائنس کے طبیعی کیمیاء کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے برقیوں (electrolytes) کے ایصالیت (Conductivities) پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جب نمک کی قلموں کو پانی میں حل کیا جاتا ہے تو وہ تحلیل پا کر جوڑی دار بار بردار رواں فراہم کرتے ہیں۔ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے 1903 میں کیمیاء میں انہیں نوبل انعام ملا۔ انہوں نے ترشے اور اساس کی تعریف کی بھی تجویز پیش کی اور انہوں نے متحرک توانائی کا نظریہ بھی تیار کیا تھا۔

7.1۔ کیمیائی تعامل کی شرح:

(Rate of a Chemical reaction)

فی اکائی وقت میں ایک خاص متغیر میں تبدیلی شرح کہلاتی ہے۔ آپ طبیعیات (Physics) میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ فی اکائی وقت میں شے کے ہٹاؤ میں تبدیلی، سمتی رفتار (Velocity) کہلاتی ہے۔ اسی طرح کیمیائی تعامل میں، کیمیائی تعامل میں فی اکائی وقت میں شامل نوعیت کے ارتکاز میں تبدیلی ایک تعامل کی شرح دیتی ہے۔ ایک سادہ عام تعامل پر غور کریں۔



متعاملات کے ارتکاز [A] کو مختلف وقت کے موقف سے پیمائش کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں A کا ارتکاز دو مختلف وقتوں میں t_1 اور t_2 ہے۔ بالترتیب $(t_1 > t_2)$ ، [A₁] اور [A₂] تعامل کی شرح کو اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{شرح} = \frac{[\text{متعاملات کے ارتکاز میں تبدیلی}]}{(\text{وقت میں تبدیلی})}$$

جیسے

$$\text{شرح} = \frac{-([A_2] - [A_1])}{(t_2 - t_1)} = -\left(\frac{\Delta[A]}{\Delta t}\right) \dots (7.1)$$

تبادل کے دوران، متعاملات کا ارتکاز گھٹتا ہے۔ یعنی $[A_2] < [A_1]$ ، لہذا ارتکاز میں تبدیلی $[A_2] - [A_1]$ منفی قیمت دیتی ہے۔ مجموعی طور پر تعامل کی شرح مثبت ہوتی ہے۔ چنانچہ شرح کے اظہار کے لئے منفی علامت سے متعارف کیا جاتا ہے۔

(مساوات 7.1)

اگر حاصلات کے ارتکاز کی پیمائش سے تعامل ظاہر ہوتا ہے،

$$\text{شرح اس طرح دیتا ہے} - \left(\frac{\Delta[B]}{\Delta t}\right)$$


کیونکہ $[B_2] < [B_1]$

یہاں منفی نشان کی ضرورت نہیں ہے۔

ہم پہلے ہی گیارہویں جماعت میں تھرموڈائنامکس (Thermo dynamics) کا اصول کا استعمال کرتے ہوئے دئے گئے شرائط پر کیمیائی تعاملات کے کارآمد ہونے کی پیشن گوئی کو سیکھ چکے ہیں۔ تاہم تھرموڈائنامکس / حرکیات پر اہم سوالات کا جواب نہیں فراہم کرتا ہے کہ کیمیائی رد عمل کتنی تیزی سے ہوتا ہے؟ ہم عملی تجربہ سے یہ جانتے ہیں کہ تمام کیمیائی تعاملات کے مکمل ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ رد عمل کی رفتار انتہائی تیز (فمٹو سکنڈ Femto Second) سے لے کر انتہائی سست (سالوں میں) تک واقع ہوتا ہے۔ مثال، جب حاصلات BaCl₂ محلول اور ہلاکے ہوئے سلفیورک H₂SO₄ کو ملا یا جاتا ہے تو فوری طور پر BaSO₄ کا سفید رسوب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف تعامل جیسے لوہے کے زنگ آلودہ ہونے کے لئے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جوابات جیسے (1) کیمیائی تبدیلی کتنی تیزی سے واقع ہو سکتی ہے؟ (2) کیمیائی حرکیات کے فراہم کردہ ابتدائی مرحلے اور آخری مرحلے کے درمیانی مدت کے دوران کیمیائی رد عمل میں کیا ہوتا ہے۔ حروف اصطلاح Kinetics لاطینی حرف Kinetics "لاٹینی حرف "Kinesis" سے لیا گیا ہے جس کے معنی حرکت Movement کے ہیں۔


کیمیائی حرکیات، کیمیائی تعاملات کی شرح اور طریقہ کار (میکانزم) کا مطالعہ ہے۔ دباؤ، ارتکاز، درجہ حرارت، وغیرہ کے دئے گئے شرائط کے تحت آگے بڑھتا ہے۔ کیمیائی حرکیات کا مطالعہ نہ صرف کیمیائی تعامل کی شرح کا تعین کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، بلکہ صنعتی تیاری کے عمل نامیاتی اور غیر نامیاتی کی تیاری وغیرہ کے صورت حال کو بہتر بنانے میں بھی مفید ہے۔

اس باب میں ہم کیمیائی تعامل کی شرح اور اس پر اثر کرنے والے عوامل کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کیمیائی رد عمل نظریہ پر بھی بحث کریں گے۔



خاکہ 7.1- تعامل کے لئے A اور B کے ارتکاز میں تبدیلی $A \longrightarrow B$

آئیے اب ہم مختلف تعامل پر غور کریں گے۔




ایسی حالت میں A کے ہر مول غائب ہو کر B کے دو مول نمودار ہوتے ہیں۔ یعنی B کی تشکیل کی شرح A کے غائب ہونے کی شرح سے دوگنا تیز ہے۔ لہذا تعامل کی شرح کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\text{شرح} = \frac{+d[B]}{dt} = 2 \left(\frac{-d[A]}{dt} \right)$$

بہ الفاظ دیگر

$$\text{شرح} = \frac{-d[A]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[B]}{dt}$$

عام تعامل کے لئے، ایک توازنی مساوات میں، تعامل کی شرح (یا حاصلات کے بننے کی) اس کے (Co-efficient) ضریب کے ذریعہ تقسیم شدہ ایک حاصلات کے استعمال شدہ شرح کے برابر ہے۔



$$\text{Rate} = \frac{-1}{x} \frac{d[A]}{dt} = \frac{-1}{y} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{l} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{m} \frac{d[D]}{dt}$$

شرح تعامل کی اکائی (Unit of rate of a reaction)

$$\text{شرح کی اکائی} = \frac{\text{ارتکاز کی اکائی}}{\text{وقت کی اکائی}}$$

ہمیشہ ارتکاز کو مول فی لیٹر کی تعداد اور وقت کو سکنڈ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہذا تعامل کی شرح کی اکائی $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ ہے۔ تعامل کے فطرت کی بنیاد پر منٹ، گھنٹہ، سال وغیرہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

گیسی ہیبتی تعامل کے لئے (Gas Phase reaction) گیسوی نوعیت کے ارتکاز کو ہمیشہ ان کے جزوی دباؤ (partial pressure) کے اعداد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں شرح تعامل کی اکائی atm s^{-1} ہے۔

7.1.1- کیمیائی مقدار کی پیمائش اور تعامل کی شرح:


(Stoichiometry and rate of a reaction)

تفاعل A B میں متعاملات اور حاصلات دونوں کی کیمیائی مقدار پیمائش (Stoichiometry) مساوی ہے۔ لہذا متعاملات کے غائب ہونے کی شرح (A) اور حاصلات کے نموداری کی شرح (B) مساوی ہے۔

7.12۔ اوسط اور فوری شرح

(Average and Instantaneous rate)

سائیکلو پروپین Cyclopropane کی ہم ترکیبیت (Isomerisation) کو مد نظر رکھتے ہوئے اوسط اور فوری شرح کو سمجھیں گے۔



حرکیات کا مندرجہ بالا تعامل سائیکلو پروپین کے ارتکاز کو باقاعدہ وقفوں اور مشاہدے پر پیمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔ (جدول 7.1)

جدول 7.1 980 K پر مختلف وقتوں میں سائیکلو پروپین کا ارتکاز اس کے ہم ترکیبی جسم (isomerisation) کے دوران مختلف وقتوں میں دیا گیا ہے۔

وقت (منٹ)	سائیکلو پروپین (mol L ⁻¹)
0	2.00
5	1.67
10	1.40
15	1.17
20	0.98
25	0.82
30	0.69

$$\text{تفاعل کی شرح} = \frac{-\Delta(\text{سائیکلو پروپین})}{\Delta t}$$

$$\text{پورے 30 منٹ میں شرح} = \frac{-(0.69-2) \text{ mol L}^{-1}}{(30-0) \text{ min}}$$

$$= \frac{1.31}{30} = 4.36 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعامل کے پہلے 30 منٹوں کے دوران، ہر منٹ میں $4.36 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ اوسط میں متعاملات (سائیکلو پروپین) کا ارتکاز گھٹتا ہے۔

آئیے ایک ابتدائی اور آخری مرحلہ کے لئے اوسط شرح مختصر عرصہ میں محسوب کریں گے۔

$$\begin{aligned} \text{ابتدائی مرحلہ (شرح)} &= \frac{-(1.4-2)}{(10-0)} \\ &= \frac{0.6}{10} = 6 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{شرح (آخری مرحلہ)} &= \frac{-(0.69 - 0.98)}{(30-20)} \\ &= \frac{0.29}{10} = 2.9 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$


مذکورہ بالا محاسبات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعامل کے آگے بڑھنے سے وقت کے ساتھ شرح بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تعامل کی شرح کا اندازہ لگانے کے لئے کسی بھی وقفہ پر اوسط شرح کا استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تعامل کے دوران کسی خاص وقت پر تعامل کی شرح کو فوری شرح (Instantaneous rate) کہا جاتا ہے۔ ہم جب مختصر ترین مدت کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم فوری شرح کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔

As $\Delta t \rightarrow 0$;

$$\frac{-\Delta[\text{cyclopropane}]}{\Delta t} = \frac{-d[\text{cyclopropane}]}{dt}$$

[سائیکلو پروپین] بمقابلہ (وقت) کو مترسم کرنے پر ایک منحنی خط دیتا ہے، جسے 7.2 خاکہ میں بتایا گیا ہے۔ کسی مخصوص وقفہ 't' پر فوری شرح سائیکلو پروپین $\frac{-d[\text{cyclopropane}]}{dt}$ اس لمحے میں منحنی خطوط پر کھینچی جانے والی کسی مماس کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہوئے حاصل کی جاتی ہے۔

عام طور پر متعاملات کے اختلاط کے ایک لمحے میں فوری تعامل کی شرح منحنی خطوط کی طرف کھینچی جانے والی مماس کا ڈھلوان (t = 0) محسوب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ سے محسوب کی گئی شرح کو **تفاعل کی ابتدائی شرح** کہتے ہیں۔



خاکہ 7.2۔ وقت بمقابلہ سائیکلو پروپین کا ارتکاز کی ترسیم

مندرجہ بالا تعامل کے لئے شرح کلیہ کو عام طور پر یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$\text{شرح} = k [A]^m [B]^n$$

یہاں k تناسبیت کا مستقلہ ہے، جسے شرح کا مستقلہ کہا جاتا ہے۔ m اور n کی قیمت بالترتیب A اور B کے سلسلے میں تعامل کے ترتیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ تعامل کی کل مجموعی ترتیب کو $(m+n)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شرح کے کلیہ میں قوت نما (exponent) کی قیمت (m اور n) کو تجربے کے ذریعہ تعین کرنا چاہئے۔ کیمیائی مقادیر پیمائش (Stoichiometry) سے نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر سائیکلو پروپین کی ہم ترکیبیت پر غور کریں، جس کا پہلے ہی تذکرہ کر چکے ہیں۔

جدول 7.2 میں دکھائے گئے نتیجے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سائیکلو پروپین کے ارتکاز کو آدھا کر دیا جائے، تو شرح بھی کم ہو کر نصف ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح پہلی قوت تک اٹھائے جانے والے (سائیکلو پروپین) پر منحصر ہے۔

یعنی شرح = K (سائیکلو پروپین)

$$\Rightarrow \frac{\text{شرح}}{[\text{سائیکلو پروپین}]} = k$$

آئیے ہم سائیکلو پروپین کی ہم ترکیبیت کا مختلف ارتکاز پر $0.5M$ ، $1M$ ، $2M$ پر خاکہ 7.2 میں بتائے گئے ترسیم کی مدد سے محسوب کریں گے۔ حاصل ہونے والے نتائج کی جدول بندی نیچے دی گئی ہے۔


[cyclopropane] mol L ⁻¹	Rate mol L ⁻¹ min ⁻¹
2	6.92×10^{-2}
1	3.46×10^{-2}
0.5	1.73×10^{-2}

جدول 7.2 ہم ترکیبیت کی شرح

7.3۔ شرح کا کلیہ اور شرح کا مستقلہ

(Rate law and rate Constant)

ہم نے ابھی یہ سیکھا ہے کہ تعامل کی شرح متعاملات کے ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم یہ سمجھیں گے کہ مندرجہ ذیل عام مساوات پر غور کر کے تعامل کی شرح کا ارتکاز کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔



$$38.40 \times 10^{-2} = k [1.3]^m [2.2]^n \quad \dots(2)$$

تجربہ 3 کے لئے

$$3 \text{ شرح} = k [\text{NO}]^m [\text{O}_2]^n$$

$$76.8 \times 10^{-2} = k [2.6]^m [1.1]^n \quad \dots(3)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{38.40 \times 10^{-2}}{19.26 \times 10^{-2}} = \frac{k [1.3]^m [2.2]^n}{k [1.3]^m [1.1]^n}$$

$$2 = \left(\frac{2.2}{1.1} \right)^n$$

$$2 = 2^n \text{ i.e., } n=1$$

لہذا آکسیجن کے لحاظ سے پہلے درجہ کا تعامل

O_2 (First Order) اس طرح ہے۔

$$\frac{(3)}{(1)} \Rightarrow \frac{76.8 \times 10^{-2}}{19.26 \times 10^{-2}} = \frac{k [2.6]^m [1.1]^n}{k [1.3]^m [1.1]^n}$$

$$4 = \left(\frac{2.6}{1.3} \right)^m$$

$$4 = 2^m \text{ i.e., } m=2$$

لہذا NO کے لحاظ سے دوسرے درجہ کا تعامل

(Second Order) اس طرح ہے۔

شرح کا کلیہ اس طرح ہے۔

$$1 \text{ شرح} = k [\text{NO}]^2 [\text{O}_2]^1$$

$$(2+1)=3 = \text{تعال کی مجموعی ترتیب اس طرح ہے}$$

تعال کی شرح اور شرح کا مستقلہ کے درمیان موازنہ


تعال کی شرح کا مستقلہ Rate constant of a reaction	تعال کی شرح Rate of a reaction	s.no
یہ تناسبیت کا مستقلہ ہے۔	یہ رفتار کی نمائندگی کرتا ہے جس میں کسی بھی وقت متعاملات، حاصلات میں تبدیل ہو سکتے ہیں	1

جدول 7.3۔ ہم ترکیبیت کے لئے مستقلہ

(Rate Constant for isomerisation)

شرح Rate $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$	سائیکلو پروپین [cyclopropane] mol L^{-1}	شرح Rate $k = \frac{\text{Rate}}{[\text{cyclopropane}]}$
6.92×10^{-2}	2	3.46×10^{-2}
3.46×10^{-2}	1	3.46×10^{-2}
1.73×10^{-2}	0.5	3.46×10^{-2}

تجربات کے سلسلے کی کارروائیاں ایک عاملات کے ارتکاز کو مستقل رکھ کر اور دوسرے عاملات کے ارتکاز کو تبدیل کر کے کی جاتی ہے۔



تجربہ Experiment	[NO] X 10 ⁻² (mol L ⁻¹)	[O ₂] X 10 ⁻² (mol L ⁻¹)	Initial rate x 10 ⁻² (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
1	1.3	1.1	19.26
2	1.3	2.2	38.40
3	2.6	1.1	76.80

$$\text{شرح} = k [\text{NO}]^m [\text{O}_2]^n$$

تجربہ (1) کے لئے شرح کا کلیہ اس طرح ہے۔

$$1 \text{ شرح} = k [\text{NO}]^m [\text{O}_2]^n$$


$$19.26 \times 10^{-2} = k [1.3]^m [1.1]^n \quad \dots(1)$$

اسی طرح تجربہ 2 کے لئے


$$2 \text{ شرح} = k [\text{NO}]^m [\text{O}_2]^n$$

ہے کہ تعامل میں I^- بھی مشتمل ہے۔ مندرجہ ذیل مرحلے پر یہ میکائزم مشتمل ہے۔


مرحلہ 1 :



مرحلہ 2 :



مجموعی تعامل اس طرح ہے
(گیس)



یہ دونوں تعاملات ابتدائی تعاملات ہیں۔ مساوات (1) اور (2) مجموعی تعاملات دیتا ہے۔ مرحلہ 1 شرح تعین مرحلہ ہے۔ لہذا H_2O_2 اور I^- دونوں پر مشتمل ہے۔ مجموعی تعامل دوسالماقی ہے۔

درجہ (order) اور سالمیت کے درمیان موازنہ

تفاعل کی سالمیت Molecularity of a reaction	تفاعل کا درجہ Order of a reaction	s.no
ابتدائی مرحلے میں مشتمل حاصلات کے نوعیت کی طاقت کا مجموعہ ہے۔	یہ تجرباتی طور پر طے شدہ شرح کے کلیہ میں مشتمل ارتکاز کے رقم کا حاصل جمع ہے۔	1
یہ ہمیشہ صحیح عدد (Whole Number) ہے، صفر یا کسری عدد نہیں ہو سکتا۔	یہ صفر (Zero) یا کسر (Fractional) یا سالم عدد (integer) ہو سکتا ہے۔	2
ہر ابتدائی مرحلے کے میکائزم عمل کے لئے تفویض مقرر کیا گیا ہے۔	یہ مجموعی تعامل کے لئے تفویض / مقرر کیا گیا ہے۔	3

تفاعل کی شرح	تفاعل کی شرح کا مستقلہ	
2	تفاعل کی شرح کے مساوی ہے، جب ہر ایک عاملات کا ارتکاز (Unity) اکائی ہے۔	متعاملات کے ارتکاز میں گھٹوتی یا حاصلات کے ارتکاز میں اضافے سے اس کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔
3	متعاملات کے ابتدائی ارتکاز پر منحصر نہیں ہے۔	متعاملات کے ابتدائی ارتکاز پر منحصر ہے۔


7.4۔ سالمیت (Molecularity)

حرکیات نہ صرف تعامل کی شرح کی پیمائش کرتا ہے، بلکہ یہ مناسب تعامل کے میکائزم کی تجویز کرتا ہے۔ تعامل کے میکائزم میں ہر ایک مرحلہ کو ابتدائی تعامل (elementary reaction) کہا جاتا ہے۔

ابتدائی مرحلہ کی تصویر کشی اس کی سالمیت سے کی جاتی ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں مشتمل جملہ تعداد کے عاملات کی نوعیت کو اسی مخصوص مرحلے کی سالمیت کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم گیارہویں جماعت میں پڑھے گئے (t-Butyl Bromide) کی آب پاشیدگی کا اعادہ کریں گے۔ لہذا شرح کی تعین کا ابتدائی مرحلہ t-بیوٹیل برومائڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس تعامل کو ایک سالماقی نیوکلیوفیلک تبادلہ تعامل (SN^1)

(Unimolecular Nucleophilic Substitution reaction)


آئیے ہم I^- کی تناسی عامل انگیزی میں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کی تجلیلی تعامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی تعامل کو سمجھیں گے۔



تجربہ سے معلوم ہوا کہ H_2O_2 اور I^- دونوں کے لحاظ سے یہ تعامل پہلے درجہ (First Order) کا ہے۔ جو یہ ظاہر کرتا

مثال 1-

ناکٹرک آکسائیڈ کی تکسید (oxidation) سے NO₂ بننے پر غور کیجئے۔



(a) NO، O₂ اور NO₂ کے ارتکاز میں تبدیلی کے لحاظ سے تعامل کی شرح کا اظہار کریں۔

(b) کسی مخصوص وقفہ پر جب آکسیجن [O₂]

0.2 mol L⁻¹s⁻¹ کی شرح سے کم ہو رہا ہے تو

[NO₂] کس شرح سے بڑھ رہا ہے؟

حل:

$$\text{a) Rate} = \frac{-1}{2} \frac{d[\text{NO}]}{dt} = \frac{-d[\text{O}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt}$$

$$\text{b) } \frac{-d[\text{O}_2]}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt}$$

$$\frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = 2 \times \left(\frac{-d[\text{O}_2]}{dt} \right) = 2 \times 0.2 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$= 0.4 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

خود جانچئے - 1

1- مندرجہ ذیل تعامل کو ابتدائی تعامل فرض کرتے ہوئے

شرح کا اظہار لکھئے - 3A + 5B₂ → 4CD

ii) X₂ + Y₂ → 2XY

2- N₂O₅(g) کی تحلیل سے (گیس) NO₂ اور O₂

بننے پر غور کیجئے۔ ایک مخصوص وقفہ پر N₂O₅(g)

2.5 × 10⁻² mol dm⁻³s⁻¹ کی شرح سے غائب ہو جاتا

ہے۔ NO₂ اور O₂ کس شرح پر بننے ہیں؟ تعامل کی شرح


کیا ہے؟

مثال 2

1- مندرجہ ذیل تعامل کے لئے مجموعی ترتیب اور ہر متعاملات


کے لحاظ سے ترتیب کیا ہے؟

(a). 5Br⁻(aq) + BrO₃⁻(aq) + 6H⁺(aq)



تجرباتی شرح کا کلیہ

$$\text{Rate} = k [\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}^+]^2$$



تجرباتی شرح کا کلیہ

$$\text{Rate} = k [\text{CH}_3\text{CHO}]^{\frac{3}{2}}$$

حل:

(a) Br⁻ کے لحاظ سے پہلا درجہ (First Order)،

BrO₃⁻ کے لحاظ سے پہلا درجہ (First Order)، H⁺ کے

لحاظ سے دوسرا درجہ (Second Order)، لہذا تعامل کی مجموعی

ترتیب مساوی ہے۔

$$1+1+2=4$$

(b) Acetaldehyde کے لحاظ سے تعامل کا درجہ $\frac{3}{2}$ ہے

اور مجموعی درجہ بھی $\frac{3}{2}$ ہے۔

مثال 3

2- تعامل، حاصل x + 2y → کی شرح

[x]=[y]= 0.2 M اگر 4 × 10⁻³ mol L⁻¹s⁻¹ ہے۔

اور 400K پر شرح کا مستقل 2 × 10⁻² s⁻¹ ہے

تو تعامل کا مجموعی درجہ کیا ہے؟

حل:

$$\text{Rate} = k [\text{x}]^n [\text{y}]^m$$

$$4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1} = 2 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1} (0.2 \text{ mol L}^{-1})^n (0.2 \text{ mol L}^{-1})^m$$

$$\frac{4 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}}{2 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}} = (0.2)^{n+m} (\text{mol L}^{-1})^{n+m}$$

$$0.2 (\text{mol L}^{-1}) = (0.2)^{n+m} (\text{mol L}^{-1})^{n+m}$$

دونوں جانب قوتوں کا موازنہ کرنے پر

تعامل کا مجموعی درجہ n+m=1

خود جانچئے - 2

(1) تعامل، حاصل x + y → کے لئے،

[x] کو چوگنا کرنے پر شرح میں 8 کا اضافہ ہوتا ہے۔


اور d[y] دونوں کو چوگنا کرنے پر شرح میں 16 کا اضافہ ہوتا ہے۔

ایسے سوالات کے جوابات کے لئے ہمیں مذکورہ بالا شرح کے کلیہ کی مربوط حالت کی ضرورت ہے، جس میں وقت، متغیر کی طرح ہوتا ہے۔

7.5.1 پہلے درجہ کے تعامل کے لئے مربوط کلیہ شرح:

(Integrated rate law for a first order reaction)

ایک ایسا تعامل جس کی شرح پہلی طاقت تک بڑھنے والی تعاملات کے ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے۔ اسے پہلے درجہ کا تعامل (First order reaction) کہا جاتا ہے۔



شرح کے کلیہ کا اظہار یوں کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{شرح} = k[A]^1$$

یہاں k پہلے درجہ (First order) کی شرح کا مستقل ہے۔

$$\frac{-d[A]}{dt} = k[A]^1$$

$$\Rightarrow \frac{-d[A]}{[A]} = k dt$$

...(1)

مندرجہ بالا مساوات کو وقت کی حد $t = 0$ اور وقت مساوی ہے t کے، ان درمیان انٹگریٹ (Integrate) کریں۔ جب کہ ارتکاز ابتدائی ارتکاز $[A_0]$ سے $[A]$ تک مختلف ہوتا ہے۔

$$\int_{[A_0]}^{[A]} \frac{-d[A]}{[A]} = k \int_0^t dt$$

$$(-\ln[A])_{[A_0]}^{[A]} = k(t)_0^t$$

$$-\ln[A] - (-\ln[A_0]) = k(t-0)$$

$$-\ln[A] + \ln[A_0] = kt$$

$$\ln\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt$$


...(2)

یہ مساوات طبعی لوگارتھی (natural logarithm) ہے۔ قاعدہ 10 کے معمولی لوگارتھم میں تبدیل کرنے کے لئے ہمیں رقم کو 2.303 سے ضرب کرنا ہے۔

$$2.303 \log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt$$

x اور y کے لحاظ سے تعامل کی ترتیب محسوب کیجئے۔ تعامل کی مجموعی ترتیب کیا ہے؟

(2) مندرجہ ذیل تعامل میں دئے گئے معطیات (data) کو استعمال کر کے انفرادی اور مجموعی درجہ محسوب کیجئے۔




تجرباتی عدد Experiment number	ابتدائی ارتکاز Initial concentration		ابتدائی شرح Initial rate
	NO	Cl ₂	NOCl mol L ⁻¹ s ⁻¹
1	0.1	0.1	7.8 x 10 ⁻⁵
2	0.2	0.1	3.12 x 10 ⁻⁴
3	0.2	0.3	9.36 x 10 ⁻⁴

7.5- مربوط شرح مساوات:

(The Integrated rate equation)

ہم نے ابھی سیکھا ہے کہ تعاملات کے ارتکاز میں تبدیلی کی شرح براہ راست تعاملات کے ارتکاز کی شرح کے تناسب میں ہے۔ ایک عام تعامل کے لئے




شرح کا کلیہ اس طرح ہے

$$\text{شرح} = \frac{-d[A]}{dt} = k[A]^x$$

یہاں k شرح کا مستقل اور x تعامل کا درجہ (order) ہے۔

مذکورہ بالا مساوات تفرقی مساوات $\frac{-d[A]}{dt}$ ہے۔ اس لئے یہ کسی بھی وقفہ میں شرح دیتا ہے۔ البتہ مذکورہ بالا اظہار کا استعمال کر کے ہم سوال کا جواب نہیں دے سکتے جیسے تعامل میں استعمال ہونے والے A کا مخصوص ارتکاز میں کتنا وقت لگے گا؟ وقت 't' کے بعد متعامل کا ارتکاز کیا ہوگا؟



خاکہ 7.3 پہلے درجہ کے تعامل، حاصل $A \rightarrow$ کے لئے $\ln[A]$ Vs t کی ترسیم،
 $[A]=1.00 \text{ M}$ اور $k=2.5 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ کا ابتدائی ارتکاز

$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right) \text{ ---- (3)}$$

مساوات (2) ذیل کی شکل $y=mx+c$ میں لکھی جاسکتی ہے۔


$$\ln[A_0] - \ln[A] = kt$$

$$\ln[A] = \ln[A_0] - kt$$



$$\Rightarrow y = c + mx$$

اگر ہم باقاعدہ وقت کے وقفے پر متعاملات کے ارتکاز کی پیمائش کر کے تعامل کی پیروی کرتے ہیں، 't' کے خلاف $\ln[A]$ کی ترسیم منفی میلان کے ساتھ ایک خط مستقیم دیتی ہے۔ اس سے شرح کا مستقل محسوب کیا جاتا ہے۔
 پہلے درجہ کے تعامل (First order reaction) کے لئے مثالیں :

(i) ڈائی نائٹروجن پنٹا آکسائیڈ کی تحلیل




(ii) سلفیوریل کلورائیڈ کی تحلیل



(iv) سائیکلو پروپین سے پروپین کی ہم ترکیبیت

کاذب پہلے درجہ کا تعامل: (Pseudo First Order reaction)

اعلیٰ درجہ کے تعامل کا حرکی مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر دو مختلف متعاملات والے دو درجی تعامل (Second order reaction) کے مطالعہ میں بیک وقت دونوں متعاملات کے ارتکاز میں تبدیلی کی پیمائش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے کے لئے ایک متعامل کو زیادہ مقدار میں لے کر دوسرے درجہ کے تعامل کو پہلی تعامل میں بدلایا جاسکتا ہے۔ ایسے تعامل کو کاذب پہلے درجہ کا تعامل (Pseudo First Order reaction) کہا جاتا ہے۔ آئیے (ایسٹر) Ester کے ترشہ آب پاشیدگی پر غور کریں گے۔



$$\text{شرح} = k [\text{CH}_3\text{COOCH}_3] [\text{H}_2\text{O}]$$

اگر تعامل پانی کی زائد مقدار کے ساتھ عمل پذیر ہوتا ہے۔ آب پاشیدگی کے دوران پانی کے ارتکاز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی پانی کا ارتکاز تقریباً مستقل رہتا ہے۔


اب ہم $k[\text{H}_2\text{O}] = k^1$ کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا شرح مساوات اس طرح بن سکتی ہے۔

$$\text{شرح} = k' [\text{CH}_3\text{COOCH}_3]$$

لہذا یہ پہلی درجہ والی حرکیات First order Kinetics کی پیروی کرتا ہے۔

7.5.2 - صفر درجہ والے تعامل کے لئے مربوط شرح کا کلیہ (Integrated rate law for a zero order reaction)

وہ تعامل جس میں شرح، وسیع ارتکاز پر، متعاملات کے ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتا، ایسا تعامل صفر درجہ والا تعامل (Zero Order reaction) کہلاتا ہے۔ ایسے تعاملات کبھی کبھار واقع ہوتے ہیں۔ آئیے مندرجہ ذیل قیاسی صفر درجہ والے تعامل پر غور کریں گے۔



شرح کے کلیہ کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\text{شرح} = k [\text{A}]^0$$

$$\frac{-d[\text{A}]}{dt} = k (1) \quad (\because [\text{A}]^0 = 1)$$

$$\Rightarrow -d[\text{A}] = k dt$$

مندرجہ بالا مساوات کو صفر وقت پر $[\text{A}_0]$ اور $[\text{A}]$ کے حدود کے درمیان اور بعد میں کچھ وقت t کے ساتھ انٹگریٹ کریں۔

$$\int_{[\text{A}_0]}^{[\text{A}]} d[\text{A}] = k \int_0^t dt$$

$$-([\text{A}])_{[\text{A}_0]}^{[\text{A}]} = k(t)_0^t$$

$$[\text{A}_0] - [\text{A}] = kt$$


$$k = \frac{[\text{A}_0] - [\text{A}]}{t}$$

مساوات (2) خط مستقیم کی مساوات $y = mx + c$ کی شکل میں ہے۔

$$\text{یعنی I.e., } [\text{A}] = -kt + [\text{A}_0]$$

$$\Rightarrow y = c + mx$$

وقت بمقابلہ $[\text{A}]$ کو مرتسم کرنے پر خط مستقیم حاصل ہوتی ہے، جس کا میلان $-k$ اور y مقطوعہ $[\text{A}_0]$ ہے۔



خاکہ 7.4 صفر درجہ کے تعامل، حاصل $A \rightarrow$ کے لئے ترسیم، $[A]=0.5 \text{ M}$ اور $k=1.5 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ کا ابتدائی ارتکاز

7.6۔ تعامل کی نصف حیاتی مدت:

(Half life Period of a reaction)

تبادل کی نصف حیاتی مدت کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ حاصلات کے ارتکاز کو اپنی ابتدائی قیمت کے نصف تک پہنچنے کے لئے درکار وقت، پہلے درجہ کے تعامل

(First order reaction) کے لئے درکار وقت، پہلے درجہ

کے تعامل (First order reaction) کے لئے نصف حیاتی

مدت مستقل ہے، جیسے یہ ابتدائی ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتا۔

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے شرح مستقل اس طرح دیا گیا ہے

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$\text{at } t = t_{1/2}; [A] = \frac{[A_0]}{2}$$

$$k = \frac{2.303}{t_{1/2}} \log \frac{[A_0]}{[A_0]/2}$$


$$k = \frac{2.303}{t_{1/2}} \log 2$$

$$k = \frac{2.303 \times 0.3010}{t_{1/2}} = \frac{0.6932}{t_{1/2}}$$


$$t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$$

صفر درجہ کے تعامل کے لئے مثالیں :

(1) H_2 اور I_2 کے درمیان شعاعی کیمیائی تعامل




(2) گرم پلاٹینم سطح پر N_2O کی تحلیل



(3) تیزابی واسطہ میں اسیٹون کی ایوڈین کاری

ایوڈین کے لحاظ سے درجہ صفر ہے۔



$$\text{شرح} = k [\text{CH}_3\text{COCH}_3] [\text{H}^+]$$

ایک متبادل $[A]$ پر مشتمل n ویں درجہ کے تعامل کے لئے

عام شرح کی مساوات حاصلات $A \rightarrow$

$$\text{شرح کا کلیہ} \quad \frac{-d[A]}{dt} = k[A]^n$$

ایسی صورت حال پر غور کریں جس میں $n \neq 1$ ہے۔

$t = 0$ پر $[A_0]$ اور $t = t$ کے درمیان

مندرجہ بالا مساوات کو Integrate کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{1}{[A]^{n-1}} - \frac{1}{[A_0]^{n-1}} = (n-1)kt$$

$$k = \frac{2.303}{t_{80\%}} \log \left(\frac{100}{20} \right)$$

$$t_{80\%} = \frac{2.303}{k} \log (5) \text{ —————(2)}$$

دئے گئے معطیات کا استعمال کر کے k کی قیمت محسوب کیجئے

$$k = \frac{2.303}{t_{90\%}} \log \left(\frac{100}{10} \right)$$

$$k = \frac{2.303}{8 \text{ hours}} \log 10$$

$$k = \frac{2.303}{8 \text{ hours}} (1)$$

مساوات (2) میں k کی قیمت درج کریں۔

$$t_{80\%} = \frac{2.303}{2.303 / 8 \text{ hours}} \log (5)$$

$$t_{80\%} = 8 \text{ hours} \times 0.6989$$

$$t_{80\%} = 5.59 \text{ hours}$$

مثال 5

(ii) 500K پر ایک پہلے درجہ کے تعامل، حاصلات $x \rightarrow$ کے لئے نصف مدت حیات $6.932 \times 10^4 \text{ s}$ ہے۔ 500K پر 100 منٹ کے لئے گرم کرنے پر x کا کتنا فیصد تحلیل ہوگا؟
($e^{0.06} = 1.06$)

حل:

دیا گیا ہے

حل کرنا ہے: جب منٹ $t = 100$ ہو

$$\frac{[A_0] - [A]}{[A_0]} \times 100 = ?$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$t_{1/2} = \frac{0.6932}{k} \text{ پہلے درجہ کے تعامل کے لئے}$$

$$k = \frac{0.6932}{6.932 \times 10^4}$$

$$k = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

آئیے صفر درجہ کے تعامل کے لئے نصف حیاتی مدت کا حساب

لگائیں۔ $k = \frac{[A_0] - [A]}{t}$ شرح کا مستقل

$$\text{at } t = t_{1/2} ; [A] = \frac{[A_0]}{2}$$

$$k = \frac{[A_0] - \frac{[A_0]}{2}}{t_{1/2}}$$

$$k = \frac{[A_0]}{2t_{1/2}}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A_0]}{2k}$$

لہذا پہلے درجہ کے تعامل (First order reaction)

کی نصف مدت کے برعکس، صفر درجہ کے تعامل کی نصف مدت حیات، متعاملات کے ابتدائی ارتکاز کے راست تناسب میں ہے۔

مزید جانکاری کے لئے

$n \neq 1$ اور A متعاملات پر مشتمل n ویں درجہ کے تعامل

کے لئے نصف مدت حیات

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k [A_0]^{n-1}}$$

مثال 4

(i) پہلے درجہ کے تعامل کو 90% تکمیل پانے کے لئے 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ 80% تکمیل پانے کے لئے درکار وقت محسوب کیجئے۔

$$(\log 5 = 0.6989 ; \log 10 = 1)$$

حل:

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے

$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right) \text{(1)}$$

فرض کریں کہ $[A_0] = 100M$

جب

$$t = t_{90\%} ; [A] = 10M \text{ (given that } t_{90\%} = 8 \text{ hours)}$$

$$t = t_{80\%} ; [A] = 20M$$

$$t_{99.9\%} = \frac{6.909}{k}$$

$$t_{99.9\%} \approx 10 \times \frac{0.69}{k}$$

$$t_{99.9\%} \approx 10 t_{1/2}$$

خود جانچئے:

(1) پہلے درجہ کے تعامل، حاصلات $A \rightarrow$ میں
دئے گئے نمونہ A کا 60% چالیس منٹ میں تحلیل پاتا ہے۔
تبادل کا نصف حیات کیا ہوگا؟

(2) پہلے درجہ کے تعامل کے لئے شرح کا مستقل

$2.3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ہے۔ اگر متعاملات کا ابتدائی ارتکاز

0.01M ہو تو 1 گھنٹے کے بعد ارتکاز کیا ہوگا؟


(3) آبی محلول میں اسٹر (ester) کی آب پاشیدگی کا
مطالعہ کیا گیا، جس میں سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول کے خلاف
آزاد شدہ کاربوکسلک ترشہ کو Titrate کیا گیا۔ مختلف وقفوں
میں اسٹر کے ارتکاز کو نیچے دیا گیا ہے۔

Time (min)	0	30	60	90
Ester concentration mol L ⁻¹	0.85	0.80	0.754	0.71

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعامل پہلے درجہ کے حرکیات
(Kinetics) کی پیروی کرتا ہے۔

7.7۔ تصادم کا نظریہ (Collision theory)

تصادم کے نظریہ کو 1916 میں میکس ٹراؤس (Max Trautz) اور 1918 میں ولیم لیوس نے آزادانہ طور پر پیش کیا تھا۔
یہ نظریہ گیسوں کے فعلی نظریہ (Kinetic theory) پر مبنی ہے۔
اس نظریہ کے مطابق متعاملات کے سالموں کے درمیان تصادم کے
نتیجہ میں ایک کیمیائی تعامل واقع ہوتا ہے۔ آئیے مندرجہ ذیل
تبادل پر غور کر کے اس نظریہ کو سمجھیں گے۔



$$k = \left(\frac{1}{t} \right) \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$10^{-5} \text{ s}^{-1} \times 100 \times 60 \text{ s} = \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$0.06 = \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$\frac{[A_0]}{[A]} = e^{0.06}$$

$$\frac{[A_0]}{[A]} = 1.06$$

$$\therefore \frac{[A_0] - [A]}{[A_0]} \times 100 \%$$

$$= \left(1 - \frac{[A]}{[A_0]} \right) \times 100 \%$$

$$= \left(1 - \frac{1}{1.06} \right) \times 100 \%$$

$$= 5.6 \%$$

مثال 6

یہ ظاہر کریں کہ پہلے درجہ کے تعامل کی صورت حال میں
99.9% تکمیل کے لئے درکار وقت کا تقریباً دس گنا تعامل
کی نصف تکمیل کے لئے درکار ہے۔

فرض کریں

$$[A_0] = 100; \text{ جب}$$


$$\text{when } t = t_{99.9\%}; [A] = (100 - 99.9) = 0.1$$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} \log \left(\frac{100}{0.1} \right)$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} \log 1000$$

$$t_{99.9\%} = \frac{2.303}{k} (3)$$



خاکہ 7.5۔ تعامل کا آگے بڑھنا

لئے اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ تعامل پانے کے لئے تصادمی سالموں کے پاس کم از کم توانائی ہونا ضروری ہے جسے فعال توانائی (activation energy) کہا جاتا ہے۔
فعال توانائی سے کم توانائی کے ساتھ تصادم پانے والے سالمے برقرار رہیں گے اور کوئی تعامل واقع نہیں ہوگا۔
مؤثر تصادم (f) کی کسر کو مندرجہ ذیل اظہار سے دیا گیا ہے۔

$$f = e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

تصادم کے جز (f) کی قدر کو سمجھنے کے لئے، آئیے ہم 300K پر 100 kJ mol⁻¹ فعال توانائی رکھنے والے تعامل کے تصادم کے عامل (collision factor) کو محسوب کریں گے۔

$$f = e^{-\left(\frac{100 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 300 \text{ K}}\right)}$$

$$f = e^{-40} \approx 4 \times 10^{-18}$$

لہذا 10¹⁸ تصادموں میں سے صرف 4 تصادم ہی متعلقات کو حاصلات میں تبدیل کرنے کے لئے کافی توانائی بخش ہیں۔
تصادم کی یہ کسر، تشریقی کسر (Orientation Factor) کی وجہ سے مزید کم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر متعلقات کافی توانائی

اگر ہم A₂ اور B₂ کے درمیان تعامل کو فرض کریں تو ان کے درمیان تصادم کے ذریعہ تعامل آگے بڑھتا ہے، تب یہ شرح فی سکند میں ہونے والے تصادم کی تعداد کے تناسب میں ہوگی۔
فی سکند میں فی لیٹر میں تصادم کرنے والے سالموں کی تعداد ∝ شرح (تصادم کی شرح)

تصادم کی تعداد A₂ اور B₂، دونوں کے ارتکاز کے راست تناسب میں ہوگی۔


$$[A_2][B_2] \propto \text{تصادم کی شرح}$$

$$Z[A_2][B_2] = \text{تصادم کی شرح}$$

یہاں Z مستقل ہے۔

گیسوں میں تصادم کی شرح گیسوں کے فعلی (متحرک) نظریہ سے محسوب کی جاسکتی ہے۔ گیسوں کے لئے کمرے کی پیش (298K) اور 1atm دباؤ پر، ہر سالمہ فی سکند میں تقریباً

10⁹ تصادموں سے گزرتا ہے۔ یعنی 10⁻⁹ سکند میں ایک تصادم۔ لہذا اگر ہر تصادم کے نتیجہ میں تعامل ہوتا ہے تو 10⁻⁹ سکند میں تعامل مکمل ہوگا۔ حقیقت میں عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تصادم تعامل پانے کے لئے اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تصادم تعامل پانے کے



خاکہ 7.6 متعالمات کی تشریق - خاکہ کے ذریعہ وضاحت

7.8۔ اربینیس کی مساوات - شرح تعامل پر تپش کا اثر

عام طور پر، تپش کے اضافے سے تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اس میں بہت کچھ رعایتیں ہیں۔ شرح میں اس اضافے کی شدت مختلف تعامل کے لئے مختلف ہے۔ کسی نہ کسی اصول کے تحت کمرے کی تپش کے قریب بہت سے تعاملات کے لئے، جب تپش میں 10°C کا اضافہ ہو تو تعامل کی شرح دگنی ہو جاتی ہے۔

کارروائی:

اس کارروائی سے ہم تعامل کی شرح پر تپش کے اثر کو سمجھیں گے۔

- دو امتحانی نالیاں لیں۔ ان کو A اور B نشان کریں۔
- امتحانی نالی A میں 5ml ٹھنڈا پانی لیں۔ نمائندہ فیٹھلین کا ایک قطرہ شامل کریں اور بعد میں میکینیشیم کے دانے ملائیں۔
- امتحانی نالی B میں 5ml گرم پانی لے کر اوپر کی کارروائی کو دوہرائیں۔
- دونوں بیکروں کا مشاہدہ کریں۔

سے تصادم پائے۔ وہ تعامل نہیں کر سکتے جب تک کہ متعالمی سالموں کی تشریق رتین رخ (orientation)، منتقلی حالت کے بننے کے لئے موزوں ہو۔

خاکہ 7.6 تعامل پانے والے سالموں کی مناسب صف بندی کے اہمیت کی وضاحت کرتا ہے۔

موزوں صف بندی رکھنے والے مؤثر تصادم (f) کی کسر کو (ضععی عامل) Steric Factor سے دیا گیا ہے۔

$$\text{تصادم کی شرح} = p \times f \times \text{شرح} \Rightarrow$$

$$\text{شرح} = p \times e^{\frac{-E_a}{RT}} \times Z [A_2][B_2] \dots (1)$$

شرح کے کلیہ کے تحت

$$\text{شرح} = k [A_2][B_2] \dots (2)$$

جہاں k شرح کا مستقل ہے۔

مساوات (1) اور (2) کا موازنہ کرنے پر، شرح کا مستقل k

یہ ہے۔

$$k = p Z e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

یہاں A تعددی عامل ہے اور R گیس کا مستقلہ ہے۔

E_a ، تعامل کی فعال توانائی اور T مطلق تپش (K میں) ہے۔

تعددی عامل (A) (Frequency Factor) متعاملات کے سالموں کے درمیان تصادم کے تعدد (فی سکند میں تصادم کی تعداد) کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تپش کے ساتھ عامل A نمایاں طور پر تبدیل نہیں ہوتا، لہذا اسے مستقل کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔

E_a تعامل کی فعال توانائی ہے جب کہ اربنیس (Arrhenius) نے اسے سالموں کے تعامل پانے کے لئے کم از کم توانائی بتایا ہے۔

مساوات (1) کے دونوں جانب لوگارتم کو لگانے پر

$$\ln k = \ln A + \ln e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT}\right) \quad (\because \ln e = 1)$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right) \left(\frac{1}{T}\right) \quad \dots(2)$$

$$y = c + m x$$



مندرجہ بالا مساوات خط مستقیم کی مساوات کی شکل میں ہے۔

$\ln k$ بمقابلہ $1/T$ کو مرتبہ کرنے پر ایک خط مستقیم حاصل ہوتی ہے، جس کا منفی میلان $-\frac{E_a}{R}$ ہے۔ اگر تعامل کی شرح مستقل دو مختلف تپش کے لئے معلوم ہو تو ہم ذیل سے فعال توانائی محسوب کر سکتے ہیں۔

$$k = k_1 \quad \text{تپش } T \text{ پر } T_1 = \text{شرح کا مستقل}$$

$$\ln k_1 = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT_1}\right) \quad \dots(3)$$

v۔ اس مشاہدہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امتحانی نالی B میں گلابی رنگ کی تبدیلی ہوئی اور امتحانی نالی A میں اسے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے مندرجہ بالا تعاملات کے تحت میکینزم گرم پانی کے ساتھ تعامل پاتا ہے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ کوئی تعامل نہیں ہوتا۔



vi۔ حاصل ہونے والے محلول کی نوعیت اساسی ہے، اور اس کی نمائندگی فیٹھلین سے کی جاتی ہے۔

ہمیں بے شمار تعاملات معلوم ہیں جو کمرے کی تپش پر واقع نہیں ہوتے، مگر اعلیٰ تپش پر واقع ہوتے ہیں۔ مثال: پانی کی تشکیل کے لئے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے درمیان اسی وقت عمل ہوتا ہے جب بجلی کی چنگاری (Electric Spark) اس میں گزاری جائے۔

(Arrhenius) اربنیس نے مشورہ دیا کہ زیادہ تر تعامل کی شرح تپش کے ساتھ اس طرح مختلف ہوتی ہے کہ شرح کا مستقل $e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$ کے راست تناسب میں ہوگا اور انہوں نے شرح کے مستقل اور تپش کے درمیان تعلق کو پیش کیا۔

$$k = A e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)} \quad \dots(1)$$

$$\log(2) = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}} \left(\frac{1}{400\text{K}} \right)$$

$$E_a = \log(2) \times 2.303 \times 8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1} \times 400\text{K}$$

$$E_a = 2305 \text{ J mol}^{-1}$$

مثال 8

مندرجہ ذیل اربینیس مساوات کے مطابق تپش کے ساتھ تعامل کی شرح کا مستقل k مختلف ہوتا ہے۔

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T} \right)$$

یہاں E_a فعال توانائی ہے۔ جب $\log k$ بمقابلہ $\frac{1}{T}$ کے لئے ترسیم مرتسم کرتے ہیں تو -4000K کے میلان کے ساتھ ایک خط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ فعال توانائی (Activation energy) محسوب کیجئے۔

حل:

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T} \right)$$

$$y = c + mx$$

$$m = -\frac{E_a}{2.303R}$$

$$E_a = -2.303 R m$$

$$E_a = -2.303 \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times (-4000\text{K})$$

$$E_a = 76,589 \text{ J mol}^{-1}$$

$$E_a = 76.589 \text{ kJ mol}^{-1}$$

خود جانچئے:

پہلے درجہ کے تعامل (First order reaction) کے لئے 500K پر شرح کا مستقل $8 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ ہے۔ تعدد کا عامل (Frequency Factor) محسوب کیجئے، اگر تعامل کے لئے فعال توانائی 190 kJ mol^{-1} ہے۔

تپش $T_2 = T_1$ پر $k = k_2$ شرح کا مستقل

$$\ln k_2 = \ln A - \left(\frac{E_a}{RT_2} \right)$$

....(4)

(4) - (3)

$$\ln k_2 - \ln k_1 = - \left(\frac{E_a}{RT_2} \right) + \left(\frac{E_a}{RT_1} \right)$$

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$2.303 \log \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$\log \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$\ln k_2 - \ln k_1 = - \left(\frac{E_a}{RT_2} \right) + \left(\frac{E_a}{RT_1} \right)$$

T_1 اور T_2 تپشوں پر k_1 اور k_2 شرح مستقلوں سے E_a محسوب کرنے کے لئے اس مساوات کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مثال 7

200K اور 400K پر تعامل کے لئے شرح مستقل بالترتیب 0.04 اور 0.02 s^{-1} ہے۔ فعال توانائی کی قیمت محسوب کیجئے۔

حل:

اربینیس (Arrhenius) کی مساوات کے مطابق

$$\log \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$T_2 = 400\text{K} ; k_2 = 0.04 \text{ s}^{-1}$$

$$T_1 = 200\text{K} ; k_1 = 0.02 \text{ s}^{-1}$$

$$\log \left(\frac{0.04 \text{ s}^{-1}}{0.02 \text{ s}^{-1}} \right) = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}} \left(\frac{400\text{K} - 200\text{K}}{200\text{K} \times 400\text{K}} \right)$$

7.9- تعامل کی شرح پر اثر کرنے والے عوامل:

تعامل کی شرح پر مندرجہ ذیل عوامل اثر کرتے ہیں۔

- 1- متعاملات (reactant) کی حالت اور نوعیت
- 2- متعاملات کا ارتکاز (Concentration)
- 3- متعاملات کا سطحی رقبہ (Surface area)
- 4- تھامی عامل کی موجودگی (Catalyst)
- 5- تعامل کا درجہ حرارت (Temperature)

7.9.1- متعاملات کی حالت اور نوعیت:

ہم جانتے ہیں کہ کیمیائی تعامل میں متعاملات کے کچھ موجودہ بندشیں ٹوٹ کر نئی بندشیں تشکیل پاتی ہیں، جس سے نئے حاصلات بنتے ہیں۔ اس عمل میں شامل کل توانائی متعاملات کی نوعیت پر منحصر ہے، لہذا مختلف حاصلات کے لئے شرح مختلف ہوتی ہے۔

آئیے مندرجہ ذیل حجمی تجزیہ (Volumetric analysis) میں کئے گئے دو تعاملات کا موازنہ کریں گے۔

(1) $KMnO_4$ (پوٹاشیم پرمنگنیٹ) اور فیرس امونیم سلفیٹ

FAS کے درمیان تکسلی تعامل (Redox reaction)

(2) آکسائلک ترشہ اور $KMnO_4$ کے درمیان تکسلی تعامل

(redox reaction) (redox reaction)

$KMnO_4$ اور Oxalate کے رواں کے درمیان

ہونے والے تعامل کے مقابلے میں $KMnO_4$ اور Fe^{2+}

رواں کی تکسید بہت سست ہے۔

درحقیقت Oxalate ion اور $KMnO_4$ کے مابین

تعامل کے لئے پیش ضروری ہے اور یہ تقریباً $60^\circ C$ پر ہوتا ہے۔

تعاملات کی شرح کو متاثر کرنے میں متعاملات کی طبعی

حالت اہم رول ادا کرتی ہے۔ ٹھوس یا مائع متعاملات پر مشتمل

تعاملات کے مقابلے میں گسی ہیئت تعامل تیز (Faster) ہے۔

مثال: ٹھوس سوڈیم اور ٹھوس ایوڈین کے درمیان تعامل سے بخاراتی

ایوڈین کے ساتھ دھاتی سوڈیم کا تعامل تیز ہوتا ہے۔

آئیے ہم جست نمک (Lead Salts) کے غیر نامیاتی معیاری تجزیہ میں Qualitative analysis کئے گئے دوسری مثال پر غور کریں گے۔

اگر ہم بے رنگ لیڈ نائٹریٹ کے آبی محلول کے ساتھ بے رنگ پوٹاشیم ایوڈائیڈ کو شامل کرتے ہیں تو فوراً لیڈ ایوڈائیڈ کا ایک زرد رنگ کا رسوب بنتا ہے، جب کہ ٹھوس لیڈ نائٹریٹ کے ساتھ ٹھوس پوٹاشیم ایوڈائیڈ کو شامل کرنے پر آہستہ سے زرد رنگ نمودار ہوگا۔



7.9.2 متعاملات کا ارتکاز

(Concentration of the reactants)

تعاملات کے ارتکاز میں اضافہ سے تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ تصادم کے نظریہ کی تعاملی شرح کی بنیاد پر ارتکاز کے اثر کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تعامل کی شرح، متعاملات کے سالموں کے درمیان تصادم کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ ارتکاز اعلیٰ ہو تو تعامل کی شرح اور تصادم کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔


کارروائی

- 1- تین مخروطی صراحیاں لیں اور ان کو A, B, C نام دیں۔
- 2- ظرف (Burette) استعمال کر کے صراحی (Flask) میں 0.1M سوڈیم تھیوسلفیٹ محلول کو بالترتیب 10, 20, 40ml شامل کریں۔ بعد میں فلاسک میں 10, 30, 40ml کا مقطر پانی اس طرح شامل کریں کہ ہر صراحی میں محلول کا حجم 50ml ہو جائے۔
- 3- A مخروطی صراحی میں 10 ملی لیٹر 1M HCl محلول شامل کریں۔ HCl کا آدھا محلول شامل کرنے پر روک گھڑی چالو کریں۔ مواد کو احتیاط سے ہلائیں اور ٹائل (Tile) پر ترچھانسان کے ساتھ رکھیں جیسا کہ خاکہ میں دکھایا گیا ہے۔ اوپر سے مخروط صراحی کا مشاہدہ کریں جیسا کہ خاکہ میں دکھایا گیا ہے۔ اوپر سے مخروطی صراحی کا مشاہدہ کریں جب ترچھانسان (Cross mark) پوشیدہ ہو جائے تو روک گھڑی (Stop Watch) کو روک لیں۔ وقت کو نوٹ کریں۔
- 4- B اور C مواد کے ساتھ تجربہ کو دہرائیں اور مشاہدہ کو درج کریں۔

لیا گیا وقت (t)	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ کا ارتکاز	پانی کا حجم	Volume of $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	فلاسک کا حجم
	0.02	40	10	A
	0.04	30	20	B
	0.08	10	40	C

شرح تعامل کی براہ راست پیمائش $\frac{1}{t}$ دیتا ہے۔ چنانچہ متعامل یعنی $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ کے ارتکاز میں اضافہ کے ساتھ اس کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

$\frac{1}{t}$ کے مقابلہ میں سوڈیم تھیوسلفیٹ کے ارتکاز کے درمیان ترسیم کھینچئے۔ مندرجہ ذیل کی طرح ترسیم حاصل ہوگی۔




7.9.3- حاصلات کے سطحی رقبہ کا اثر: (Effect of Surface area of the reactant)

غیر متجانس تعاملات میں ٹھوس متعاملات کا سطحی رقبہ شرح کو طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دئے گئے متعاملات کی کمیت کے لئے جب ذرات کی جسامت میں کمی ہو تو سطحی رقبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ متعاملات کے سطحی رقبہ میں اضافے سے فی سکند فی لیٹر میں زیادہ تصادم ہوتا ہے۔ لہذا تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال سنگ مرمر کے ٹکڑوں کے ساتھ dil HCl کے مقابلے میں اسی کمیت کے سنگ مرمر کا سفوف بہت تیزی سے تعامل پاتا ہے۔

کارروائی

ایک معلوم شدہ کمیت کے سنگ مرمر کی کنکریوں کو ایک صراحی میں لیں۔ معلوم شدہ dil HCl کے حجم کو صراحی میں شامل کریں۔ جب HCl کا آدھا حجم شامل کیا جاتا ہے تو روک گھڑی (Stop watch) چالو کریں اور روک گھڑی تعامل مکمل ہونے تک باقاعدہ وقفوں میں کمیت نوٹ کرتے رہیں۔ اسی کمیت کے سنگ مرمر کے سفوف کے ساتھ اسی تجربہ کو دہرائیں اور مشاہدہ کو درج کریں۔




لہذا تعامل کے دوران CO_2 خارج ہو جاتی ہے، تعامل کے شروع ہوتے ہی صراحی کی کمیت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس لئے صراحی کی پیمائش کر کے تعامل کی شرح کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وقت کے مقابلہ میں کمیت میں کمی کی ترسیم کھینچی جائے اور ترسیم ایسے دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ خاکہ میں بتائی گئی ہے۔

سنگ مرمر کے سفوف کے لئے تعامل کم وقت میں گراف مکمل ہوتا ہے۔ یعنی جیسے جب ٹھوس متعاملات کے سطحی رقبہ میں اضافہ ہوتا ہے تو تعامل کی حاصلات کے سطحی رقبہ درجہ حرارت اور شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

7.9.4- تماسی عامل کی موجودگی کا اثر (Effect of Presence of Catalyst)

اب تک ہم نے سیکھا کہ ارتکاز میں اضافے سے تعامل کی شرح میں کچھ حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم کسی مادے کو شامل کر کے تعامل میں نمایاں تبدیلی لائی جاسکتی ہے جسے تماسی عامل (Catalyst) کہا جاتا ہے۔ تماسی عامل انگیزہ مادے ہیں جو خود کوئی مستقل کیمیائی تبدیلی لائے



بغیر تعامل کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ تعامل میں حصہ لیتے ہیں مگر تعامل کے اختتام پر دوبارہ پیدا (regenerate) ہوتے ہیں۔ تماسی عامل کی موجودگی میں فعال توانائی کم ہو جاتی ہے۔ کئی تعداد کے سالے توانائی کی رکاوٹ کو پار کرتے ہیں۔ لہذا تعامل کی شرح میں اضافہ کر کے حاصلات (Products) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

کارروائی

دو امتحانی نالیاں لیں۔ ان کو A اور B نام دیں۔ دونوں امتحانی نالیوں میں 7 ml کا ہلکایا ہوا 0.1N آکسلاک ترشہ کا محلول، 5 ml 0.1N KMnO_4 اور 5 ml ہلکایا ہوا 2N سلفیورک ترشہ (H_2SO_4) شامل کریں۔ دونوں امتحانی نالیوں میں محلول کا رنگ گلابی (Pink) ہے۔

اب امتحانی نالی A کے مواد میں مینکینز سلفیٹ کی چند قلمیں شامل کریں۔ گلابی رنگ پھیکا پڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس تعامل میں MnSO_4 تماشائی عامل کی طرح عمل کرتا ہے اور MnO_4^- سے $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ کی تکسید کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔


ادویات سازی میں کیمیائی حرکیات

ادویات کے میدان میں کیمیائی حرکیات کے بہت سے اطلاقات ہیں۔ جسم کے اندر زندگی بھر ادویات کی حیاتی دستیابی کے مطالعہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس کی اس شاخ کو Pharma Cokinetics کہا جاتا ہے۔ اس سے طبیب عموماً دوائی کو دن کے مختلف وقتوں میں لینے کی تجویز کرتے ہیں، جیسے کچھ دوائیوں کو دن میں دو مرتبہ لیا جاتا ہے جب کہ دوسری دوائیوں کو تین مرتبہ یا صرف ایک مرتبہ لیا جاتا ہے۔ Pharmacokinetics کا مطالعہ دستور العمل (Dosage & Frequency) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثال۔ پیراسیٹامول ایک معروف بخار اور درد کی دوا ہے جو بخار اور جسمانی درد کی صورت میں تجویز کی جاتی ہے۔ دوا سازی کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے پیراسیٹامول کی نصف حیات جسم کے اندر 2.5 گھنٹے ہے۔ جیسے دوائی کے پلازما کا ارتکاز 2.5 گھنٹوں کے بعد آدھا ہو جاتا ہے۔ 10 گھنٹوں کے بعد (4- نصف مدت) صرف 6.25% دوا باقی رہتی ہے۔ اس طرح کے مطالعات کی بنیاد پر مقدار دوا اور تعدد کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ پیراسیٹامول کی صورت میں عام طور پر شرط کے مطابق 6 گھنٹے میں ایک بار لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

خلاصہ

- کیمیائی حرکیات ارتکاز، دباؤ، تپش کی دی گئی شرائط کے تحت کیمیائی تعامل کا میکا نزم اور شرح کا مطالعہ ہے۔
- فی اکائی وقت کے کیمیائی تعامل پر مشتمل نوعیت کے ارتکاز میں تبدیلی تعامل کی شرح دیتی ہے۔
- تعامل کے دوران کسی خاص وقفے پر تعامل کی شرح کو فوری شرح کہا جاتا ہے۔ ہم جس قدر کم وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس وقت ہم فوری شرح کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔
- شرح اس رفتار کی نمائندگی کرتی ہے جس پر تعاملات کسی بھی وقت حاصلات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
- شرح مستقل تناسبی مستقل ہے اور یہ تعامل کی شرح کے مساوی ہوتا ہے۔ جب تعاملات میں سے ہر ایک کا ارتکاز ایک ہوتا ہے۔
- تعامل کی سالمیت (Molecularity) ابتدائی مرحلہ میں مشتمل تعاملات کی جملہ تعداد کی نوعیت ہے۔
- ایک تعامل کی نصف حیات مدت کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ تعاملات کے ارتکاز کو اپنی ابتدائی قیمت سے نصف حصے تک پہنچنے کے لئے درکار وقت ہے۔ پہلے درجہ کے تعامل (First order reaction) کے لئے نصف حیات مدت مستقل ہے۔ یعنی یہ ابتدائی ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتا۔

- تصادم کے نظریے کے مطابق، ایک کیمیائی تعامل، متعاملات کے سالموں کے مابین تصادم کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے۔
 - عموماً، تپش میں اضافہ سے تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے تاہم اس میں کچھ رعایت ہے۔ شرح میں اضافے کی شدت مختلف تعامل کے لئے مختلف ہوتی ہے۔ ایک خام اصول کے تحت، جب کمرے کی تپش میں 10°C کا اضافہ ہو جائے تو کئی متعاملات کی شرح دگنی ہو جاتی ہے۔
 - اریٹینس کے مطابق، تعامل کی فعاک توانائی وہ کم از کم توانائی ہے، جو سالموں کو تعامل کرنے کے لئے ضروری ہے۔
 - تعامل کی شرح مندرجہ ذیل عوامل کو متاثر کرتی ہے۔
- 1- متعاملات کی نوعیت اور حالت
 - 2- متعاملات کا ارتکاز
 - 3- متعاملات کا سطحی رقبہ
 - 4- متعاملات کی تپش
 - 5- تماسی عامل کی موجودگی



(d) اور c دونوں



محاسبہ



1- پہلے درجہ کے تعامل $A \rightarrow B$ کے لئے شرح کا مستقل $x \text{ min}^{-1}$ ہے۔ اگر A کا ابتدائی ارتکاز 0.01 M ہو تو، ایک گھنٹے کے بعد A کے ارتکاز کو ذیل کے اظہار سے دیا گیا ہے۔

$$1 \times 10^{-2} (1 - e^{-60x}) \quad (b) \quad 0.01 e^{-x} \quad (a)$$

$$(c) \quad (1 \times 10^{-2}) e^{-60x} \quad (d) \quad \text{ان میں سے کوئی نہیں}$$

2- صفر درجہ کے تعامل، حاصلات $X \rightarrow$ میں ابتدائی ارتکاز 0.02 M کے ساتھ نصف مدت حیات 10 منٹ ہے۔ اگر ایک 0.04 M ارتکاز کے ساتھ شروع ہو جائے، تو نصف مدت حیات یہ ہوگی۔

$$10 \text{ s} \quad (a) \quad 5 \text{ منٹ} \quad (b) \quad 20 \text{ منٹ} \quad (c)$$

(d) دی گئی معلومات استعمال کرتے ہوئے پیشن گوئی

نہیں کی جاسکتی۔

4- پہلے درجہ کے تعامل، حاصل $A \rightarrow$ کے لئے ابتدائی ارتکاز $x \text{ mol L}^{-1}$ ہے اور نصف مدت حیات 2.5 گھنٹے ہے۔ اسی تعامل کے ابتدائی ارتکاز $\left(\frac{x}{2}\right) \text{ mol L}^{-1}$ کے لئے نصف مدت حیات یہ ہوگی۔

3- مندرجہ ذیل ترسیم میں تعامل کی تپش (T) کے ساتھ شرح کے مستقل کی تغیر کو ظاہر کرتی ہے۔ پورے تپش کی حد میں اریٹینس کے طرز عمل کی نمائش کو یہ ظاہر کرتا ہے۔

c) $(\text{mol}^{1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s}^{-1}), (\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1})$

d) $(\text{mol L s}^{-1}), (\text{mol}^{1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s})$

8- کیمیائی تعامل کے دوران تھامسی عامل کے شامل کرنے پر

مندرجہ ذیل کی کون سی مقدار بدلے گی؟ (NEET)

(a) انتھالپی (Enthalpy)

(b) فعال توانائی (Activation energy)

(c) انٹروپی (Entropy)

(d) اندرونی توانائی (internal energy)

9- مندرجہ ذیل کے بیانات پر غور کیجئے۔

(i) متعاملات کے ارتکاز میں اضافے سے صفر درجہ کے تعامل کی

شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔

(ii) شرح کا مستقل k ، تصادم کے تعدد A کے مساوی ہوتا ہے۔

اگر $E_a = 0$ ہو۔

(iii) شرح کا مستقل k ، تصادم کے تعدد A کے مساوی ہوتا ہے

اگر $E_a = \infty$ ہو۔

(iv) $\ln(k)$ بمقابلہ T کی ترسیم ایک خط مستقیم ہے۔

(v) $\ln(k)$ بمقابلہ $\left(\frac{1}{T}\right)$ کی ترسیم مثبت میلان والی ایک

خط مستقیم ہے۔

صحیح بیانات یہ ہیں۔

(a) صرف (ii) (b) (ii) اور (iv)

(c) (ii) اور (v) (d) (i)، (ii) اور (v)

10- ایک رجعی تعامل میں، انتھالپی کی تبدیلی اور فعال توانائی آگے

کی سمت میں بالترتیب $-x \text{ kJ mol}^{-1}$ اور $y \text{ kJ mol}^{-1}$

ہے۔ لہذا پیچھے کی سمت میں فعال توانائی یہ ہے۔

a) $(y-x) \text{ kJ mol}^{-1}$

b) $(x+y) \text{ J mol}^{-1}$

c) $(x-y) \text{ kJ mol}^{-1}$

d) $(x+y) \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$

a) گھنٹے (2.5×2)

b) گھنٹے $\left(\frac{2.5}{2}\right)$

c) گھنٹے 2.5

(d) شرح کا مستقل معلوم کئے بغیر دئے گئے معطیات

(data) سے $t_{1/2}$ معلوم نہیں کر سکتے۔

5- تعامل $2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2$ کے لئے، اگر

, if $\frac{-d[\text{NH}_3]}{dt} = k_1 [\text{NH}_3]$,

$\frac{d[\text{N}_2]}{dt} = k_2 [\text{NH}_3]$, $\frac{d[\text{H}_2]}{dt} = k_3 [\text{NH}_3]$

ہو تو k_1 ، k_2 اور k_3 کے درمیان تعلق یہ ہے۔

a) $k_1 = k_2 = k_3$

b) $k_1 = 3 k_2 = 2 k_3$

c) $1.5 k_1 = 3 k_2 = k_3$

d) $2k_1 = k_2 = 3 k_3$

6- کم دباؤ پر ٹنگسٹن پر (PH_3) فاسفین کی تحلیل پہلے درجہ کا

تعامل ہے، کیونکہ اس کی (NEET)

(a) شرح گھیری ہوئی سطح کے تناسب میں ہوتی ہے۔

(b) شرح گھیری ہوئی سطح کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔

(c) شرح گھیری ہوئی سطح پر منحصر نہیں ہے۔


(d) تحلیل کی شرح سست ہے۔

7- تعامل کی شرح $k[\text{Acetone}]^{3/2}$ کے لئے، تب شرح

کا مستقل اور تعامل کی شرح بالترتیب یہ ہے۔

a) $(\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}), (\text{mol}^{1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s}^{-1})$

b) $(\text{mol}^{1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s}^{-1}), (\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1})$



تفاعل کی تعداد	[A] (min)	[B] (min)	ابتدائی شرح Initial rate (M s ⁻¹)
1	0.1	0.1	x
2	0.2	0.1	2x
3	0.1	0.2	4x
4	0.2	0.2	8x

a) rate = k[A]²[B] b) rate = k[A][B]²

c) rate = k[A][B] d) rate = k[A]^{1/2}[B]^{3/2}

16- توثیق: اگر پہلے درجہ کے تفاعل میں متعامل کا ارتکاز دگنا ہو تو تفاعل کی شرح بھی دگنی ہوگی۔
سبب: شرح کا مستقل بھی دگنا ہوگا۔

(a) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں اور توثیق سبب کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔

(b) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں مگر سبب توثیق کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔

(c) توثیق صحیح ہے مگر سبب غلط ہے۔

(d) توثیق اور سبب دونوں غلط ہیں۔


17- ایک تفاعل کی شرح کا مستقل 5.8 × 10⁻² s⁻¹ ہے۔ اس تفاعل کا درجہ یہ ہوگا۔

(a) پہلے درجہ کا (First order)

(b) صفر درجہ کا (Zero order)

(c) دوسرے درجہ کا (Second order)

(d) تیسرے درجہ کا (Third order)



اس تفاعل کے لئے N₂O₅ کے غائب ہونے (گمشدگی)

(disappearance) کی شرح کی قیمت 6.5 × 10⁻² mol

L⁻¹ s⁻¹ دی گئی ہے۔ NO₂ اور O₂ کی تشکیل کی شرح

بالترتیب اس طرح ہوگی۔

11- تفاعل کے لئے متحرک توانائی کیا ہے اگر ایک تفاعل کی شرح دگنی ہو جائے اور تپش کو 200K سے 400K تک بڑھا دی جائے تو اس تفاعل کی فعال توانائی کیا ہوگی؟

$$(R=8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1})$$

a) 234.65 kJ mol⁻¹

b) 434.65 kJ mol⁻¹

c) 2.305 kJ mol⁻¹

d) 334.65 J mol⁻¹

12- $\triangle \longrightarrow \searrow$ یہ تفاعل حرکیات کے پہلے درجہ

(First order Kinetics) کی پیروی کرتا ہے۔ ایک مخصوص

تپش پر شرح کا مستقل 2.303 × 10⁻² hour⁻¹ ہے۔

سائیکلو پروپین کا ابتدائی ارتکاز 0.25M ہے۔ 1806 منٹوں کے

بعد سائیکلو پروپین کا ارتکاز کیا ہوگا؟ (log 2 = 0.3010)

0.215M (b)

0.125M (a)

0.05M (d)

0.25 × 2.303M (c)

13- پہلے درجہ کے تفاعل کے لئے شرح کا مستقل

6.909 min⁻¹ ہے۔ 75% تبدیلی کے لئے لیا گیا وقت

منٹوں میں یہ ہے۔

a) $\left(\frac{3}{2}\right) \log 2$

b) $\left(\frac{2}{3}\right) \log 2$

c) $\left(\frac{3}{2}\right) \log \left(\frac{3}{4}\right)$

d) $\left(\frac{2}{3}\right) \log \left(\frac{4}{3}\right)$

14- پہلے درجہ کے تفاعل $y \rightarrow x$ میں، اگر k شرح کا مستقل

ہے اور متعامل x کا ابتدائی ارتکاز 0.1M ہے، تو اس کی نصف

مدت حیات یہ ہوگی۔

a) $\left(\frac{\log 2}{k}\right)$

b) $\left(\frac{0.693}{(0.1) k}\right)$

(c) $\left(\frac{\ln 2}{k}\right)$

(d) ان میں کوئی نہیں

15- مندرجہ ذیل میں دئے گئے معطیات (data) کی بنیاد پر

درج ذیل تفاعل کے لئے شرح کے کلیہ کی پیشن گوئی کریں۔

$$d) k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{2P_0}{3P_0 - 2P} \right)$$

22۔ اگر پہلے درجہ کے تعامل (First order reaction) کا 75% حصہ 60 منٹوں میں مکمل ہوتا ہے تو اسی تعامل کو انہیں شرائط پر 50% مکمل ہونے کے لئے لیا گیا وقت یہ ہوگا۔

(a) 20 منٹ (b) 30 منٹ

(c) 35 منٹ (d) 75 منٹ

23۔ ایک تابکار عنصر کی نصف مدت حیات 140 دن ہے۔ 560 دنوں کے بعد، 1g وزن والا عنصر کم ہو کر اتنا ہو جائے گا۔

a) $\left(\frac{1}{2} \right) g$ b) $\left(\frac{1}{4} \right) g$
c) $\left(\frac{1}{8} \right) g$ d) $\left(\frac{1}{16} \right) g$

24۔ پہلے درجہ کے تعامل اور دوسرے درجہ کے تعامل کے درمیان صحیح فرق یہ ہے۔ (NEET)

(a) پہلے درجہ کے تعامل کو متاسی عامل انگیزی کیا جاسکتا ہے، دوسرے درجہ کے تعامل کو متاسی عامل انگیزی نہیں کیا جاسکتا۔

(b) پہلے درجہ کے تعامل کے لئے نصف مدت حیات

(half - life) $[A_0]$ پر منحصر نہیں ہوتی، دوسرے درجہ کے تعامل کے لئے نصف مدت حیات $[A_0]$ پر منحصر ہوتی ہے۔

(c) پہلے درجہ کے تعامل کی شرح متعامل کے ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتی۔ دوسرے درجہ کے تعامل کی شرح متعامل کے ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے۔

(d) پہلے درجہ کے تعامل کی شرح متعامل کے ارتکاز پر منحصر ہوتی ہے۔ دوسرے درجہ کے تعامل کی شرح متعامل کے ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتی۔

25۔ ایک تابکار مادہ دو گھنٹوں کے بعد اس کی اصلی مقدار میں سے $\left(\frac{1}{16} \right)^{th}$ ہو جاتا ہے۔

a) $(3.25 \times 10^{-2}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 $(1.3 \times 10^{-2}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

b) $(1.3 \times 10^{-2}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 $(3.25 \times 10^{-2}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

c) $(1.3 \times 10^{-1}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 $(3.25 \times 10^{-2}) \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

(d) ان میں سے کوئی نہیں

19۔ H_2O_2 کی تحلیل کے دوران ڈائی آکسیجن (dioxygen) دیتا ہے۔ ایک خاص وقت پر فی منٹ میں 48g آکسیجن دیتا ہے۔ اسی نقطہ پر پانی کے تشکیل کی شرح یہ ہوگی۔

a) $0.75 \text{ mol min}^{-1}$

b) 1.5 mol min^{-1}

c) $2.25 \text{ mol min}^{-1}$

d) 3.0 mol min^{-1}

20۔ اگر متعاملات کے ابتدائی ارتکاز کو دگنا کر دیا جائے تو نصف تعاملات (half- reaction) کا وقت بھی دگنا ہو جاتا ہے، تب تعامل کا درجہ یہ ہوگا۔

(a) صفر (b) ایک

(c) کسر (Fraction) (d) کوئی نہیں

21۔ ایک ہم متجانس تعامل $A \rightarrow B+C+D$ میں، ابتدائی دباؤ P_0 تھا۔ لمحہ کے بعد وہ P ہو گیا۔ P_0 ، P اور t کے لئے شرح کے مستقل کا اظہار اس طرح ہوگا۔

a) $k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{2P_0}{3P_0 - P} \right)$

b) $k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{2P_0}{P_0 - P} \right)$

c) $k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{3P_0 - P}{2P_0} \right)$

تب اس کی نصف مدت حیات (منٹوں میں) یہ ہے۔

(a) 60 منٹ (b) 120 منٹ

(c) 30 منٹ (d) 15 منٹ

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں:

1- اوسط شرح (Average rate) اور فوری شرح کی تعریف کیجئے۔

2- شرح کا کلیہ اور شرح کے مستقل کی تعریف کیجئے۔

3- صفر درجہ کے تعامل، حاصلات $A \rightarrow$ کے لئے مربوط شرح کے کلیہ کو اخذ کیجئے۔

4- ایک تعامل کے لئے نصف مدت حیات (Half life) کی تعریف کیجئے۔ یہ ظاہر کریں کہ پہلے درجہ کے تعامل کے لئے نصف مدت حیات، ابتدائی ارتکاز پر منحصر نہیں ہے۔

5- ابتدائی تعامل (Elementary reaction) کیا ہے؟

ایک تعامل کی ترتیب اور سالمیت کے درمیان فرق بتائیے۔

6- شرح کو تعین کرنے کے مرحلہ کو مثال کے ساتھ واضح کیجئے۔

7- پہلے درجہ کے تعامل کے لئے تریسی نمائندگی کی وضاحت کیجئے۔

8- مندرجہ ذیل تعامل کے لئے شرح کا کلیہ لکھئے۔

(a) ایک تعامل جس کا درجہ x میں $3/2$ ہے اور y میں

اس کی ترتیب صفر ہے۔

(b) ایک تعامل جو NO میں دوسرا درجہ رکھتا ہے اور Br_2

میں پہلا درجہ رکھتا ہے۔

9- تعامل کی شرح پر تھامی عامل کے اثر کو مثال کے ساتھ واضح کیجئے۔

10- A اور B اور C تعامل کے لئے شرح کا کلیہ اس طرح

پایا گیا۔ $\text{شرح} = k[A]^2[B][L]^{3/2}$

تعامل کی شرح کیسے بدلے گی جب

(i) [L] کا ارتکاز چوگنا کر دیا جائے۔

(ii) [A] اور [B] دونوں کے ارتکاز کو دوگنا کر دیا جائے۔

(iii) [L] کے ارتکاز کو نصف کر دیا جائے۔

(iv) [A] کے ارتکاز کو $(1/3)$ تک کم کر دیا جائے اور [L] کے ارتکاز کو چوگنا کر دیا جائے۔

11- ایک دوسرے درجہ کے تعامل میں دو ترکیبیہ (dimer)

(مماثل سالموں کا مرکب) کے بننے کی شرح، ایک سالمہ (مونومر)

کے ارتکاز 0.05 mol L^{-1} پر $7.5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ہے۔ شرح کا مستقل محسوب کیجئے۔

12- حاصلات $x + y + z \rightarrow$ ، تعامل کے لئے، شرح

کا کلیہ اس طرح دیا گیا ہے۔ $\text{شرح} = k[x]^3[y]^{1/2}$

اس تعامل کے لئے مجموعی ترتیب کیا ہوگی؟ z کے لحاظ سے تعامل کا درجہ کیا ہوگا؟

13- دو سالماتی تعامل (bimolecular) کے لئے تصادم نظریہ کو تفصیل سے بیان کیجئے۔

14- ارنینیس کی مساوات لکھئے اور اس میں موجود اصطلاحات کی وضاحت کیجئے۔

15- 500 K پر Cl_2O_7 کی تحلیل گیس ہیٹ (gas phase)

سے Cl_2 اور O_2 کے لئے پہلے درجہ کا تعامل ہے۔ 500 K پر

ایک منٹ کے بعد Cl_2O_7 کا دباؤ 0.08 سے 0.04 atm تک گرتا ہے۔ شرح کے مستقل کو s^{-1} میں محسوب کیجئے۔

16- صفر درجہ کے تعامل کے لئے دو مثالیں لکھئے۔

17- کاذب پہلے درجہ کے تعامل (Pseudo First order reaction) کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیجئے۔

18- مندرجہ ذیل تعاملات کے لئے درجہ کی شناخت کیجئے۔

(i) لوہے کا زنگ آلودہ ہونا۔

(ii) تابکار عناصر $^{235}_{92}U$ کا انشطار (Disintegration)

(iii) حاصلات $2A + 3B \rightarrow$ ؛ $\text{شرح} = k[A]^{1/2}[B]^2$

19- گیس ہیٹی تعامل (Gas Phase reaction) کی فعلی

توانائی 200 kJ mol^{-1} ہے۔ اگر تعامل کا تعددی جزء


(Frequency Factor) $1.6 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$ ہو تو 600 K پر

شرح کا مستقل محسوب کیجئے۔ $(e^{-40.09} = 3.8 \times 10^{-18})$

20- $2x + y \rightarrow L$ تعامل کے لئے مندرجہ ذیل معطیات سے شرح کا کلیہ معلوم کیجئے۔

[x] (M)	[y] (M)	rate (M s ⁻¹)
0.2	0.02	0.15
0.4	0.02	0.30
0.4	0.08	1.20

28- آبی محلول میں بزمین ڈائی افرونیٹیم کلورائیڈ اس مساوات کے مطابق تحلیل پاتا ہے۔



اس کا ابتدائی ارتکاز 10 g L^{-1} ہے۔ 50°C میں حاصل شدہ N_2 گیس کا حجم، وقت کے مختلف وقفوں میں اس طرح دیا گیا ہے۔

t (min):	6	12	18	24	30	∞
Vol. of N_2 (ml):	19.3	32.6	41.3	46.5	50.4	58.3

یہ ظاہر کریں کہ مذکورہ بالا تعامل پہلے درجہ کے حرکیات کی پیروی کرتا ہے۔ شرح کے مستقل کی قیمت کیا ہے؟

29- مندرجہ ذیل معطیات سے یہ ظاہر کریں کہ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کی تحلیل پہلے درجہ کا تعامل ہے۔

t (min)	0	10	20
V (ml)	46.1	29.8	19.3

جس میں t وقت منٹوں میں V معیاری $KMnO_4$ محلول کا حجم، تعاملی آمیزے (reaction Mixture) کے مساوی حجم کو Titration کرنے کے لئے درکار ہے۔

30- ایک پہلے درجہ کا تعامل 50 منٹ میں 40% مکمل ہوتا ہے۔ شرح کے مستقل کی قیمت محسوب کیجئے۔ اسی تعامل کو 80% مکمل ہونے کے لئے کتنا وقت لگے گا؟

21- متعاملات کا ارتکاز، تعامل کی شرح کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟

22- کس طرح متعاملات کی فطرت تعامل کی شرح کو متاثر کرتی ہے؟

23- ایک پہلے درجہ کے تعامل کے لئے شرح کا مستقل

$$1.54 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \text{ ہے۔ نصف مدت حیات}$$

(Half- Life time) محسوب کیجئے۔

24- $SO_2Cl_2 \rightarrow SO_2 + Cl_2$ ہم متجانس گیس

تبادل کی نصف مدت حیات 8.0 منٹ ہے، جو پہلے درجہ کی حرکیات کے تابع ہے۔ SO_2Cl_2 کے ارتکاز کو ابتدائی قیمت کے 1% تک کم کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟

25- کسی مادے A کے پہلے ترتیب تحلیل کے لئے نصف تبدیلی کے لئے 60 سکنڈ ہے۔ شرح مستقل محسوب کیجئے۔ 180 سکنڈ کے بعد A کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا۔


26- 20 منٹ میں ایک صفر ترتیب کا تعامل 20% مکمل ہوتا ہے۔ شرح کے مستقل کی قیمت محسوب کیجئے۔ 80% تعامل مکمل ہونے کے لئے اسے کتنا وقت لگے گا؟

27- ایک تعامل کی فعال توانائی $22.5 \text{ k Cal mol}^{-1}$

ہے۔ 40°C پر شرح مستقل کی قیمت $1.8 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

ہے۔ تعددی عامل (Frequency Factor) محسوب کیجئے۔

ذہنی خاکہ





کیمیائی حرکیات

CHEMICAL KINETICS

اس آلہ کی مدد سے ہم تصادم اور فعلی توانائی کو سمجھ سکیں گے۔ تم اس سے مجازی حرکیاتی تجربہ بھی کر سکیں گے جس سے تعامل کی شرح پر تپش کے اثر سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی۔

دئے گئے URL کو ٹائپ کیجئے

<https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/reactions-and-rates>

یادائیں جانب کے QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔




مرحلے :

■ براؤزر کھولنے اور دئے گئے URL کو ٹائپ کیجئے یا QR کوڈ کو اسکین کیجئے۔ ایک ویب پیج کھلے گا، جس میں reactions and rates نامی ایک java applet کھلے گا۔ اس میں کلک کرنے پر ایک window کھلے گا، جیسا کہ خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ اس applet میں تین module ہیں، جن کو سلیکٹ کیا جاسکتا ہے۔

■ single collision tab کو سلیکٹ کریں، (tab 1) اس سے دو سالموں کے درمیان تصادم کو دیکھ سکتے ہیں۔ تم اس سے تعامل کے آگے بڑھنے کو (box 5) دیکھ سکتے ہیں۔ سلائیڈر (box 2) کی مدد سے تپش میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تپش کے اضافہ سے اس نظام کے توانائی میں اضافہ کو دیکھ سکتے ہو اور متعامل کو توانائی کی رکاوٹ سے گزر کر حاصلات حاصل ہوتے ہیں۔ (box 1) میں کلک کر کے تم ان تجربوں کو مزید سالموں کے ساتھ دہرا سکتے ہو۔

■ rate experiment mode سے تم مجازی حرکی تجربہ کو کر سکتے ہو۔ تم تعامل کرنے والے سالموں کی قسمیں اور ان کی مقادیر پر تپش کو (box 2) سے انتخاب کر سکتے ہو۔ دئے گئے وقت میں متعامل اور حاصل کے سالموں کی تعداد panel میں دکھائی دے گا (box 3)۔ تعامل کی شرح پر تپش کے اثر کو دیکھنے کے لئے تپش میں اضافہ (box 4) سے کیا جاسکتا ہے۔



جوابات ANSWERS

جلد
I

اکائی - I


صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

1. $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 2. SO_2 3. $\text{MgCO}_3 \longrightarrow \text{MgO} + \text{CO}_2$ 4. a) Al 5. b) Al_2O_3 6. d) دھاتی سلفائیڈوں کے لئے کاربن اور ہائیڈروجن مناسب تسکیدی عامل ہیں۔ 7. c) A-iv , B-ii , C-iii , D-i 8. برقیاتی علیحدگی 9. $\text{Cu(s)} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ 10. c) sodium 11. b) نا گھٹنے والے والے لوٹوں سے حل پذیر لوٹوں میں 12. c) Galena 13. a) الوینا کے نقطہ پگھلاؤ کو کم کرتا ہے 14. a) کاربن سے تسکید 15. c) جست کے ساتھ ہٹاؤ 16. c) Mg 17. b) وین آرکل پراسس 18. d) (a) اور (c) دونوں 19. d) سونے کی دھات کاری میں دھات کو ہلکائے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ کے محلول سے ترویق کی جاتی ہے۔ 20. b) غیر خالص تانبہ 21. b) ΔG^0 Vs T 22. c) $\left(\frac{\Delta G^0}{\Delta T} \right)$ is negative 23. $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr} \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al}$ 24. b) CO_2 کی تشکیل کی ترسیم ایک خط مستقیم ہے، جو آزاد توانائی کے محور کے تقریباً متوازی ہے۔

اکائی - 2

صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

1. c) اساسی



a) Al < Ga < In < Tl 18.

+1 کی تکسیدی حالت، جامد جوڑی کے اثر کی وجہ سے
گروپ میں نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔

اکائی 3

صحیح جواب منتخب کیجئے۔

a) Nessler's reagent 1.

d) ability to form $p\pi-p\pi$ bonds with itself 2.

d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 3.

b) P_4 (white) and PH_3 4.

a) H_3PO_3 5.

a) H_3PO_3 6.

b) 2 7.

a) 6N 8.

d) 9. تو شق اور سبب دونوں غلط ہیں۔ اس کا برعکس صحیح ہے۔

b) F_2 10.

b) $HF > HCl > HBr > HI$ 11.

d) NeF_2 12.

c) He 13.

c) XeO_3 14.


a) HI 15.

d) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$ 16.

d) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$ 17.

c) $Cu(NO_3)_2$ and NO_2 18.

d) 2. پروٹان خارج کر کے پانی سے OH^- حاصل کرتا ہے۔



b) B_3H_6 3.

nido borane : B_nH_{4+n}

aracno borane : B_nH_{6+n}

B_3H_6 is not a borane

Aluminium a) 4.

four c) 5.

دو $3c - 2e$ بندشیں ہیں یعنی، پل میں موجود
بندشیں 4 الیکٹرانوں کے ذمہ دار ہیں۔


Lead c) 6.

sp^2 hybridised c) 7.

+4 a) 8.

مثال : CH_4 ، جس میں کاربن کی تکسیدی حالت +4 ہے۔

d) $(SiO_4)^{4-}$ 9.



a) Me_3SiCl 11.

d) dry ice 12.

خشک برف ٹھوس CO_2 ہے، جس میں کاربن sp مخلوط ہے۔

a) 13. سہ پہلو اہرامی (Tetrahedral)

d) 14. فلسفہ ایک سہ ابعادی سلیکیٹ ہے۔

a) A-b , B-1 , C-4 , D-3 15.

d) Al, Cu, Mn, Mg 16.

Al-95% , Cu-4% , Mn-0.5% , Mg-0.5%

a) Metal borides 17.

اکائی 4

صحیح جواب منتخب کیجئے۔

1. b) Sc میں 3d مدار جزوی طور پر بھرے ہوئے ہیں، مگر Zn میں یہ مکمل طور پر بھرے ہوئے

2. a) Cr

$\text{Cr} \Rightarrow [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

3. a) Ti

4. c) Ni^{2+}

5. a) 5.92 BM

$3d^5$ میں 5 غیر جوڑی دار الیکٹران موجود ہیں۔ $\text{Mn}^{2+} \Rightarrow$

$$n=5; \dots = \sqrt{n(n+2)} \text{ BM}$$


$$\dots = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.92 \text{ BM}$$

6. c) متغیر تکسیدی حالتوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت

7. a) $\text{VO}_2^+ < \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} < \text{MnO}_4^-$


$\text{VO}_2^+ < \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} < \text{MnO}_4^-$ تکسیدی حالت کے بڑھنے سے تکسیدی طاقت زیادہ ہوتی ہے

8. b) Carbon dioxide




9. b) حجمی تجزیہ (Volumetric analysis) میں $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ کی بہ نسبت $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ کو ترجیح دی جاتی ہے۔


10. b) Mn^{2+}






11. c) 3



12. c) 0.6



$5e^-$ acception $3e^-$ release



13. c) الوینیم کی بہ نسبت تمام لیتھانوں زیادہ تعامل پذیر ہیں

جب ہم La سے Lu کی طرف چلتے ہیں تو ان کی دھاتی خصوصیت، الوینیم کے تقریباً مشابہ ہے۔

14. b) Yb^{2+}

$\text{Yb}^{2+} - 4f^{14}$ غیر جوڑی دار الیکٹران نہیں ہے۔ دوہری مقناطیسی

15. d) 3
 16. a) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں اور سبب، توثیق کی صحیح وضاحت کرتا ہے۔
 17. b) +3
 18. a) Np, Pu, Am
 19. a) Lu(OH)_3 کی بہ نسبت La(OH)_2 کم اساسیت رکھتا ہے۔


اکائی - 5

صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

- 1- کمپلکس $[\text{M(en)}_2(\text{Ox})]\text{Cl}$ میں مرکزی دھاتی رواں M^{3+} کے لئے ابتدائی گرفت +3 ہے
 ثانوی گرفت 6 ہے۔
 ابتدائی گرفت اور ثانوی گرفت کا حاصل جمع $3+6=9$ ہے۔
 جواب : (d)
- 2- کمپلکس $[\text{M(H}_2\text{O)}_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ ہے۔
 کمپلکس کے 1M محلول کا 1000 ml، Cl^- روانوں کے 2 مول دیتا ہے۔
 کمپلکس کے 0.01M محلول کا 1000 ml، اتنے مول دے گا۔

$$\frac{100 \text{ ml} \times 0.01 \text{ M} \times 2\text{Cl}^-}{1000 \text{ ml} \times 1 \text{ M}} = 0.002 \text{ مول}$$





 جواب : (b)
- 3- سالمی ضابطہ $\text{MSO}_4\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
 بیریم کلورائیڈ کے ساتھ سفید رسوب کا بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ SO_4^{2-} کے رواں کوآرڈینیٹیشن کے کرہ کے باہر موجود ہیں۔ اور AgNO_3 کے ساتھ رسوب کا نہ بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ Cl^- رواں، کوآرڈینیٹیشن کے کرہ کے اندر موجود ہیں۔ چونکہ M کا کوآرڈینیٹیشن عدد 6 ہے، Cl^- اور $5\text{H}_2\text{O}$ لگیڈ ہیں، باقی $1\text{H}_2\text{O}$ اور SO_4^{2-} ، کوآرڈینیٹیشن کے کرہ کے باہر موجود ہیں۔
 جواب : (c)




5. جواب : (d)

6. جواب : (d)

7. جواب (c)



8. جواب (b)




$$[3 \times (-0.4) + 2 (0.6)] \Delta_0$$

$$[-1.2 + 1.2] \Delta_0 = 0$$

9. جواب (a)


10. جواب (d)

تمام کمپلیکسوں میں مرکزی دھاتی رواں Co^{3+} ، دئے گئے لگینڈ میں CN^- سب سے طاقتور لگینڈ ہے، جس سے زیادہ کرسٹل فیلڈ کے شک کی توانائی زیادہ ہوگی۔ یعنی Δ_0 ہوگا۔



(a), (c) اور (d) میں دئے گئے کمپلیکسوں میں تشاکلی عناصر ہیں، لہذا وہ بصری طور پر غیر حساس ہیں۔

11. جواب (d)



12۔ تین ہم ترکیبے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک لگینڈ کو حوالہ کے طور پر لیں (فرض کریں (py)، تو تین لگینڈوں کی ترتیب (Cl اور Br, NH3)، (py) کے لحاظ سے تین شکلی ہم ترکیبے بنتے ہیں۔

13۔ جواب (c)


(a) ہم ربطی ترکیبے

(b) ہم ترکیبے نہیں ہیں۔ (مختلف ساختی ضابطہ)

(c) $\leftarrow \text{NCS}$ ، $\leftarrow \text{SCN}$ ہم ربطی جوہر مختلف ہیں۔ ربطی ہم ترکیبیت

14۔ جواب (a)

$[MA_4B_2]^{n+}$ مرکبات کے لئے شکلی ہم ترکیبیت ممکن ہے۔



15۔ جواب (d)

(a) اور (b) کے لئے شکلی ہم ترکیبیت ممکن ہے۔


(c) کے لئے روانی ہم ترکیبیت ممکن ہے۔

(d) کے لئے constitutional isomerism یا تجسیمی ہم ترکیبیت ممکن نہیں ہے۔

Answer : option(c) 16.

(a) Fe^{2+} (b) Fe^{3+} (c) Fe^0

Answer : option(d) 17.



Answer : option(c) 18.


(a) $Zn^{2+} (d^{10} \Rightarrow \text{دوہری مقناطیسیت والا})$

(b) $Co^{3+} (d^6 \text{ Low spin} \Rightarrow t_{2g}^6, e_g^0 ; \text{دوہری مقناطیسیت والا})$



(c) $Ni^{2+} (d^8 \text{ Low spin} \Rightarrow t_{2g}^6, e_g^2 ; \text{اکہری مقناطیسیت})$

(d) $[Ni(CN)_4]^{2-} (dsp^2 ; \text{دوہری مقناطیسیت، مربع سطحی})$

Answer : option(c) 19.





Answer : option(d) 20.



آپشن (a)، (b) اور (c) میں دئے گئے بیانات غلط ہیں۔

درست بیان اس طرح ہے۔

(a) چونکہ آٹھ سطحی میں crystal field stabilisation زیادہ ہے، مربع سطحی کمپلکسوں کی بہ نسبت آٹھ سطحی کمپلکس زیادہ



1- c) دونوں ہم گرفتہ قلمیں ہیں۔

2- b) AB_3

$$A = \left(\frac{N_c}{8} \right) = \left(\frac{8}{8} \right) = 1$$

$$B = \left(\frac{N_f}{2} \right) = \left(\frac{6}{2} \right) = 3$$

3- b) 1:2

اگر قریبی پیک شدہ جوہروں کی تعداد N ہو تو
ٹرائیڈرل خالی جگہوں کے بننے کی تعداد 2N ہے۔
آٹھ سطحی خالی جگہوں کے بننے کی تعداد N ہے۔

$$N : 2N = 1 : 2$$

4- c) سالماتی ٹھوس

جالی کے نقاط پر CO_2 کے سالمے قائم ہیں۔

5- a) توثیق اور سبب دونوں صحیح ہیں، اور توثیق کی صحیح وضاحت سبب دیتا ہے۔

6- CaF_2 کی ترتیب مکعبی قریب پیک شدہ ہے۔

Ca^{2+} رواں رُخ مرکزی مکعبی ترتیب میں ہیں۔ Ca^{2+} کا ہر رواں F^- کے 8 رواںوں سے گھرا ہوا ہے اور ہر ایک

F^- کے رواںوں کو Ca^{2+} 4 سے گھرا ہوا ہے۔

چنانچہ Ca^{2+} کا کوآرڈینیٹیشن عدد 8 اور F^- کا 4 ہے۔

7- BCC اکائی خانہ میں

$$2 \text{ جوہر} = 1 \text{ اکائی خانہ}$$

8g کے عنصر میں جوہروں کی تعداد

$$\text{مول کی تعداد} = \frac{8g}{40 g \text{ mol}^{-1}} = 0.2 \text{ mol}$$

ایک مول میں 6.023×10^{23} جوہر پائے جاتے ہیں۔

0.2 مول میں $0.2 \times 6.023 \times 10^{23}$ جوہر

$$\left(\frac{1 \text{ اکائی خانہ}}{2 \text{ جوہر}} \right) \times 0.2 \times 6.023 \times 10^{23}$$

$$6.023 \times 10^{22} \text{ اکائی خانے}$$

b) 848.5pm 13.
فرض کریں کہ فاصلہ $a =$

$$\sqrt{2}a = 4r$$

$$a = \frac{4 \times 300}{\sqrt{2}}$$

$$a = 600 \times 1.414$$

$$a = 848.4 \text{ pm}$$

b) $\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 14.

$$\left(\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}\right) = \left(\frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3}\right) = \left(\frac{\pi}{6}\right)$$

15. F a) مرکز میں الیکٹرانوں کا مشتعل ہونا

c) $\left(\frac{1}{2}a : \frac{\sqrt{3}}{4}a : \frac{1}{2\sqrt{2}}a\right)$ 16.

$$sc \Rightarrow 2r = a \Rightarrow r = \frac{a}{2}$$

$$bcc \Rightarrow 4r = \sqrt{3}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$

$$fcc \Rightarrow 4r = \sqrt{2}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{2}a}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$\left(\frac{a}{2}\right) : \left(\frac{\sqrt{3}a}{4}\right) : \left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)$$

d) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$ 17.

اگر ضلع کا فاصلہ a ہو تو، اہم وتر جو جسم مرکزی جوہر سے گزرتا ہے $\sqrt{3}a$

$$\text{درکار فاصلہ} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$$

a) 915 kg m⁻³ 18.

$$\rho = \frac{n \times M}{a^3 N_A}$$

for bcc

M₃N₂ d) 8.

اگر M جوہروں کی کل تعداد n ہو تو

ٹرائیڈرل گڑھوں کی تعداد $2n =$ ہے

دیا گیا ہے $\left(\frac{1}{3}\right)$ ٹرائیڈرل گڑھوں کو

یعنی $2n \times \left(\frac{1}{3}\right)$ کو N جوہروں پر قائم ہیں۔

$$\therefore M:N \Rightarrow n : \left(\frac{2}{3}\right)n$$

$$1 : \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$3 : 2 \Rightarrow M_3N_2$$

9. c) 6

$$\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}} = \frac{0.98 \times 10^{-10}}{1.81 \times 10^{-10}} = 0.54$$

یہ 0.414 تا 0.732 کی حد میں ہیں۔ لہذا ہر رواں کا کوآرڈینیٹیشن عدد 6 ہے۔

d) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 400 \text{ pm}$ 10.

$$\sqrt{3} a = r_{Cs^+} + 2r_{Cl^-} + r_{Cs^+}$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) a = (r_{Cs^+} + r_{Cl^-})$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) 400 = \text{بین روانی فاصلہ}$$

a) $\left(\frac{100}{0.414}\right)$ 11.

$$fcc \text{ ساخت کے لئے } \frac{r_{X^+}}{r_{Y^-}} = 0.414$$

$$r_{X^+} = 100 \text{ pm}$$

$$r_{Y^-} = \frac{100 \text{ pm}}{0.414}$$

c) 32% 12.

$$= 68\% \text{ پیکنگ کی کارکردگی}$$

چنانچہ خالی جگہ کا فیصد

$$(100-68) = 32\%$$

$$n = 2$$

$$M = 39$$

$$2r = 4.52 \text{ قریبی فاصلہ}$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times 4.52 \times 10^{-10}}{\sqrt{3}} = 5.21 \times 10^{-10}$$

$$\rho = \frac{2 \times 39}{(5.21 \times 10^{-10})^3 \times (6.023 \times 10^{23})}$$

$$\rho = 915 \text{ Kg m}^{-3}$$

$$N_A$$

19. (b) جالی سے مساوی تعداد کے مشرواں اور منفرواں غائب ہیں۔

20. (c) فرنکل اثر

21. (d) توثیق اور سبب دونوں غلط ہیں۔

22. (b) FeO

23. (a) XY₈

اکائی - 7

صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔

1. option (c)

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$k = \left(\frac{1}{t} \right) \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$e^{kt} = \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$[A] = [A_0] e^{-kt}$$

اس صورت حال میں۔

$$k = x \text{ min}^{-1} \text{ and } [A_0] = 0.01M = 1 \times 10^{-2}M$$

$$t = 1 \text{ hour} = 60 \text{ min}$$

$$[A] = 1 \times 10^{-2} (e^{-60x})$$

2. option (c)

$$\text{for } n \neq 1 \quad t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1) k [A_0]^{n-1}}$$

$$\text{for } n = 0 \quad t_{1/2} = \frac{1}{2 k [A_0]^{-1}}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A_0]}{2 k}$$

$$t_{1/2} \propto [A_0] \text{ —————(1)}$$

دیا گیا ہے

$$[A_0] = 0.02M ; t_{1/2} = 10 \text{ min}$$

$$[A_0] = 0.04M ; t_{1/2} = ?$$

(1) میں بھرتی کرنے پر

$$10 \text{ min} \propto 0.02M \text{ —————(2)}$$

$$t_{1/2} \propto 0.04M \text{ —————(3)}$$

$$\frac{(3)}{(2)}$$

$$\Rightarrow \frac{t_{1/2}}{10 \text{ min}} = \frac{0.04 M}{0.02 M}$$

$$t_{1/2} = 2 \times 10 \text{ min} = 20 \text{ min}$$

option (b) 3.

$$k = A e^{\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right) \left(\frac{1}{T}\right)$$

یہ مساوات خط مستقیم کی مساوات کی شکل میں ہے۔

$$y = c + m x$$

$\ln k$ بمقابلہ $\left(\frac{1}{T}\right)$ کی ترسیم ایک خط مستقیم ہے جس کا میلان منفی ہے۔

option(c) 4.

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

$t_{1/2}$ ابتدائی ارتکاز پر منحصر نہیں ہوتا اور یہ مستقل رہتا ہے۔ (ابتدائی ارتکاز چاہے کتنا بھی ہو)

$$t_{1/2} = 2.5 \text{ hrs}$$

option(c) 5.

$$\text{شرح} = \left(\frac{-1}{2} \right) \frac{d[\text{NH}_3]}{dt} = \frac{d[\text{N}_2]}{dt} = \left(\frac{1}{3} \right) \frac{d[\text{H}_2]}{dt}$$

$$\left(\frac{1}{2} \right) k_1 [\text{NH}_3] = k_2 [\text{NH}_3] = \left(\frac{1}{3} \right) k_3 [\text{NH}_3]$$

$$\left(\frac{3}{2} \right) k_1 = 3k_2 = k_3$$

$$1.5 k_1 = 3k_2 = k_3$$

option(a) 6.

دیا گیا ہے : کم دباؤ پر تعامل پہلے درجہ پر عمل پیرا ہے، چنانچہ

$$[\text{متعامل}]^1 \propto \text{شرح}$$

$$(\text{سطحی رقبہ}) \propto \text{شرح}$$

اعلیٰ دباؤ پر سطحی رقبہ کے مکمل طور پر چھا جانے کی وجہ سے تعامل صفر درجہ پر عمل پیرا ہے،

$$[\text{متعامل}]^0 \propto \text{شرح}$$

چنانچہ شرح، سطحی رقبہ پر غیر منحصر ہے۔

option(b) 7.

$$\text{شرح rate} = k[A]^n$$

$$\text{شرح rate} = \frac{-d[A]}{dt}$$

$$\text{شرح کی اکائی unit of rate} = \frac{\text{mol L}^{-1}}{s} = \text{mol L}^{-1} s^{-1}$$

$$\text{شرح کے مستقل کی اکائی unit of rate constant} = \frac{(\text{mol L}^{-1} s^{-1})}{(\text{mol L}^{-1})^n} = \text{mol}^{1-n} \text{L}^{n-1} s^{-1}$$

اس صورت حال میں

$$\text{شرح rate} = k[\text{Acetone}]^{3/2}$$

$$n = \frac{3}{2}$$

$$\text{mol}^{1-(3/2)} \text{L}^{(3/2)-1} s^{-1}$$

$$\text{mol}^{-(1/2)} \text{L}^{(1/2)} s^{-1}$$

option(b) 8.

ایک تماسی عامل ایک تعامل کو کم فعلی توانائی دیتے ہوئے ایک نئی راہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ فعلی توانائی کو کم کر دیتا ہے۔

option(a) 9.

صفر درجہ کے تعامل میں متعامل کے ارتکاز کو بڑھانے سے اس کی شرح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ بیان (1) غلط ہے۔

$$k = A e^{\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}$$

اگر $E_a = 0$ ہو تو بیان (ii) صحیح ہے، اور بیان (iii) غلط ہے۔

$$k = A e^0$$

$$k = A$$

$$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right)$$


یہ مساوات خط مستقیم کی مساوات کی شکل میں ہے۔

$$y = c + m x$$

$\ln k$ بمقابلہ $\left(\frac{1}{T}\right)$ منفی میلان والی ایک خط مستقیم ہے۔

چنانچہ بیانات (iv) اور (v) غلط ہیں۔

option(d) 10.



$$(x + y) \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$(x + y) \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$$

option(c) 11.

$$T_1 = 200\text{K} ; k = k_1$$

$$T_2 = 400\text{K} ; k = k_2 = 2k_1$$

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right)$$

$$\log\left(\frac{2k_1}{k_1}\right) = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}} \left(\frac{400 \text{ K} - 200 \text{ K}}{200 \text{ K} \times 400 \text{ K}}\right)$$

$$E_a = \frac{0.3010 \times 2.303 \times 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 200 \text{ K} \times 400 \text{ K}}{200 \text{ K}}$$

$$E_a = 2305 \text{ J mol}^{-1}$$

$$E_a = 2.305 \text{ kJ mol}^{-1}$$

option(a) 12.

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$2.303 \times 10^{-2} \text{ hour}^{-1} = \left(\frac{2.303}{1806 \text{ min}} \right) \log \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$\left(\frac{2.303 \times 10^{-2} \text{ hour}^{-1} \times 1806 \text{ min}}{2.303} \right) = \log \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$\left(\frac{1806 \times 10^{-2}}{60} \right) = \log \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$0.301 = \log \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$\log 2 = \log \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$2 = \left(\frac{0.25}{[A]} \right)$$

$$[A] = \left(\frac{0.25}{2} \right) = 0.125 \text{ M}$$

option(b) 13.

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$[A_0] = 100 ; [A] = 25$$

$$6.909 = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{100}{25} \right)$$

$$t = \left(\frac{2.303}{6.909} \right) \log (4)$$

$$t = \left(\frac{1}{3} \right) \log 2^2$$

$$t = \left(\frac{2}{3} \right) \log 2$$

option(c) 14.

$$k = \left(\frac{1}{t} \right) \ln \left(\frac{[A_0]}{[A]} \right)$$

$$[A_0] = 0.1 ; [A] = 0.05$$

$$k = \left(\frac{1}{t_{1/2}} \right) \ln \left(\frac{0.1}{0.05} \right)$$

$$k = \left(\frac{1}{t_{1/2}} \right) \ln(2)$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

option(b) 15.

$$\text{rate}_1 = k [0.1]^n [0.1]^m \text{ ———(1)}$$

$$\text{rate}_2 = k [0.2]^n [0.1]^m \text{ ———(2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)}$$

$$\frac{2x}{x} = \frac{k [0.2]^n [0.1]^m}{k [0.1]^n [0.1]^m}$$

$$\frac{2x}{x} = 2^n \quad \therefore n = 1$$

$$\text{rate}_3 = k [0.1]^n [0.2]^m \text{ ———(3)}$$

$$\text{rate}_4 = k [0.2]^n [0.2]^m \text{ ———(4)}$$

$$\frac{(4)}{(3)}$$

$$\frac{8x}{2x} = \frac{k [0.2]^n [0.2]^m}{k [0.2]^n [0.1]^m}$$

$$\frac{8}{2} = 2^m \quad \therefore m = 2$$

$$\therefore \text{rate} = k [A]^1 [B]^2$$

option(c) 16.

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے اگر متعامل کے ارتکاز کو دو گنا کر دیا جائے تو تعامل کی شرح بھی دو گنی ہو جائے گی۔
شرح کا مستقل، ارتکاز پر غیر منحصر ہے اور مستقل تپش پر یہ مستقل ہوتا ہے۔

option(a) 17.

شرح کے مستقلہ کی اکائی s^{-1} ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعامل پہلے درجہ کا ہے۔

option(c) 18.

$$Rate = \frac{d[N_2O_5]}{dt} = \left(\frac{1}{2}\right) \frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{2}{dt} \frac{d[O_2]}{dt}$$


دیا گیا ہے

$$\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 6.5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\frac{d[NO_2]}{dt} = 2 \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{6.5 \times 10^{-2}}{2} = 3.25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

option(d) 19.



$$\text{شرح } Rate = \frac{-d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{2d[O_2]}{dt}$$

$$\text{آکسیجن کے مول کی تعداد} = \left(\frac{48}{32}\right) = 1.5 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{آکسیجن کے بننے کی شرح} = 1.5 \text{ mol min}^{-1}$$

$$\therefore \text{پانی کے بننے کی شرح} = 2 \times 1.5 = 3 \text{ mol min}^{-1}$$

option(a) 20.

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے $t_{1/2}$ ابتدائی ارتکاز پر غیر منحصر ہے یعنی ایسی صورت حال کے لئے $n \neq 1$ ،

$$t_{1/2} \propto \frac{1}{[A_0]^{n-1}} \text{ ----- (1)}$$

$$\text{If } [A_0] = 2[A_0] ; \text{ then } t_{1/2} = 2t_{1/2}$$

$$2 t_{1/2} \propto \frac{1}{[2 A_0]^{n-1}} \text{ ----- (2)}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow$$

$$2 = \frac{1}{[2A_0]^{n-1}} \times \frac{[A_0]^{n-1}}{1}$$

$$2 = \frac{[A_0]^{n-1}}{[2A_0]^{n-1}}$$

$$2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$2 = (2^{-1})^{n-1}$$

$$2^1 = (2^{-n+1})$$

$$n = 0$$

Answer : option(a) 21.

	A	→	B	C	D
Initial ابتدائی	a		0	0	0
وقت t پر تعامل ہونا Reacted at time t	x		-	-	-
t وقت کے بعد After time t	(a-x)		x	x	x
Total number of moles مول کی جملہ تعداد	= (a + 2x)				

$$a \propto P_0$$

$$(a + 2x) \propto P$$

$$\frac{a}{(a + 2x)} = \frac{P_0}{P}$$

$$x = \frac{(P - P_0) a}{2P_0}$$

$$(a - x) = a - \left(\frac{(P - P_0) a}{2P_0} \right)$$

$$(a - x) = a \left\{ \frac{3P_0 - P}{2P_0} \right\}$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{a}{a - x} \right)$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{a}{a \left\{ \frac{3P_0 - P}{2P_0} \right\}} \right)$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{2P_0}{3P_0 - P} \right)$$

Answer : option(b) 30min 22.

$$t_{75\%} = 2t_{50\%}$$

$$t_{50\%} = \left(\frac{t_{75\%}}{2} \right) = \left(\frac{60}{2} \right) = 30 \text{ min}$$

Answer : option(d) 23.

140 دنوں میں $\Leftarrow$ ابتدائی ارتکا زگھٹ کر $\left(\frac{1}{2} \right) g$ ہو جائے گا۔

280 دنوں میں $\Leftarrow$ ابتدائی ارتکا زگھٹ کر $\left(\frac{1}{4} \right) g$ ہو جائے گا۔

420 دنوں میں $\Leftarrow$ ابتدائی ارتکا زگھٹ کر $\left(\frac{1}{8} \right) g$ ہو جائے گا۔

560 دنوں میں $\Leftarrow$ ابتدائی ارتکا زگھٹ کر $\left(\frac{1}{16} \right) g$ ہو جائے گا۔

Answer : option(b) 24.

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے

$$t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$$

دوسرے درجہ کے تعامل کے لئے

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1) k [A_0]^{n-1}}$$

$$n = 2$$

$$t_{1/2} = \frac{2^{2-1} - 1}{(2-1) k [A_0]^{2-1}}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k [A_0]}$$

Answer : option(c) 25.

$$1 \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{2} \right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{4} \right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{8} \right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{16} \right)$$

$$\therefore 4 t_{1/2} = 2 \text{ hours}$$

$$t_{1/2} = 30 \text{ min}$$

10۔ حل

$$\text{شرح} = k[A]^2[B][L]^{\frac{3}{2}} \text{-----}(1)$$

(i) جب $[L] = [4L]$

$$\text{شرح} = k[A]^2[B][4L]^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{شرح} = 8\left(k[A]^2[B][L]^{\frac{3}{2}}\right) \text{-----}(2)$$

(1) اور (2) کا موازنہ کرنے پر شرح 8 گنا بڑھ جاتا ہے۔

(ii) جب $[A] = [2A]$ and $[B] = [2B]$

$$\text{شرح} = k[2A]^2[2B][L]^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{شرح} = 8\left(k[A]^2[B][L]^{\frac{3}{2}}\right) \text{-----}(3)$$

(1) اور (3) کا موازنہ کرنے پر شرح 8 گنا بڑھ جاتا ہے۔

(iii) جب $[A] = \left[\frac{A}{2}\right]$

$$\text{شرح} = k\left[\frac{A}{2}\right]^2[B][L]^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{شرح} = \left(\frac{1}{4}\right)\left(k[A]^2[B][L]^{\frac{3}{2}}\right) \text{-----}(4)$$

(1) اور (4) کا موازنہ کرنے پر شرح $\frac{1}{4}$ گنا کم ہو جاتا ہے۔

(iv) جب $[A] = \left[\frac{A}{3}\right]$ and $[L] = [4L]$


$$\text{شرح} = k\left[\frac{A}{3}\right]^2[B][4L]^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{شرح} = \left(\frac{8}{9}\right)\left(k[A]^2[B][L]^{\frac{3}{2}}\right) \text{-----}(5)$$

(1) اور (5) کا موازنہ کرنے پر شرح $\frac{8}{9}$ گنا کم ہو جاتا ہے۔

11۔ حل

فرض کیجئے کہ ایک یک ترکیبیہ کا دو ترکیبیہ بنا M ہے۔



$$\text{شرح} = k[M]^n$$

دیا گیا ہے $n=2$ اور $[M] = 0.05 \text{ mol L}^{-1}$

$$\text{شرح} = 7.5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

$$k = \frac{\text{Rate}}{[M]^n}$$

$$k = \frac{7.5 \times 10^{-3}}{(0.05)^2} = 3 \text{ mol}^{-1} \text{Ls}^{-1}$$

12۔ حل

$$\text{شرح} = k[x]^{\left(\frac{3}{2}\right)}[y]^{\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$\text{مجمملہ درجہ} = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) = 2$$

یعنی دوسرے درجہ کا تعامل

چونکہ شرح کے اظہار میں z کا ارتکاز نہیں ہے، z کے لحاظ سے یہ تعامل صفر درجہ کا ہے۔

15۔ حل

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \frac{2.303}{1 \text{ min}} \log \frac{[0.08]}{[0.04]}$$

$$k = 2.303 \log 2$$

$$k = 2.303 \times 0.3010$$

$$k = 0.6932 \text{ min}^{-1}$$

$$k = \left(\frac{0.6932}{60}\right) \text{ s}^{-1}$$

$$k = 1.153 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

19۔ حل

$$k = A e^{\left(-\frac{E_a}{RT}\right)}$$

$$k = 1.6 \times 10^{13} \text{ s}^{-1} e^{\left(-\frac{200 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times 600 \text{ K}}\right)}$$

$$k = 1.6 \times 10^{13} \text{ s}^{-1} e^{-(40.1)}$$

$$k = 1.6 \times 10^{13} \text{ s}^{-1} \times 3.8 \times 10^{-18}$$

$$k = 6.21 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

20. حل

ایک درجہ کے تعامل کے لئے

$$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$t = \frac{2.303}{0.087 \text{ min}^{-1}} \log \left(\frac{100}{1} \right)$$

$$t = 52.93 \text{ min}$$

25 حل

$$\text{تفاعل کا درجہ} = 1; \quad t_{1/2} = 60;$$

$$k = ? \text{ , سکینڈ}$$

$$k = \frac{0.6932}{t_{1/2}} \text{ ہم جانتے ہیں کہ}$$

$$k = \frac{2.303}{60} = 0.01155 \text{ s}^{-1}$$

ii) $[A_0] = 100\%$ $t = 180 \text{ s}$, $k = 0.01155 \text{ seconds}^{-1}$, $[A] = ?$

For the first order reaction

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$0.01155 = \frac{2.303}{180} \log \left(\frac{100}{[A]} \right)$$

$$\frac{0.01155 \times 180}{2.303} = \log \left(\frac{100}{[A]} \right)$$

$$0.9207 = \log 100 + \log [A]$$

$$\log [A] = \log 100 - 0.9207$$

$$\log [A] = 2 - 0.9207$$

$$\log [A] = 1.0973$$

$$[A] = \text{antilog of } (1.097)^3$$

$$[A] = 12.5\%$$

26 حل

i) Let $A = 100M$, $[A_0] - [A] = 20M$,

صفر درجہ کے تعامل کے لئے

$$k = \left(\frac{[A_0] - [A]}{t} \right)$$

$$\text{rate} = k [x]^n [y]^m$$

$$0.15 = k [0.2]^n [0.02]^m \text{ ———(1)}$$

$$0.30 = k [0.4]^n [0.02]^m \text{ ———(2)}$$

$$1.20 = k [0.4]^n [0.08]^m \text{ ———(3)}$$

$$\frac{(3)}{(2)}$$

$$\frac{1.2}{0.3} = \frac{k [0.4]^n [0.08]^m}{k [0.4]^n [0.02]^m}$$

$$4 = \left(\frac{[0.08]}{[0.02]} \right)^m$$

$$4 = (4)^m$$

$$\therefore m = 1$$

$$\frac{(2)}{(1)}$$

$$\frac{0.30}{0.15} = \frac{k [0.4]^n [0.02]^m}{k [0.2]^n [0.02]^m}$$

$$2 = \left(\frac{[0.4]}{[0.2]} \right)^n$$

$$2 = (2)^n$$

$$\therefore n = 1$$

$$\text{Rate} = k [x]^1 [y]^1$$

$$0.15 = k [0.2]^1 [0.02]^1$$

$$\frac{0.15}{[0.2]^1 [0.02]^1} = k$$

$$k = 37.5 \text{ mol}^{-1} \text{L s}^{-1}$$

23 حل

$$\text{ہم جانتے ہیں کہ}, \quad t_{1/2} = 0.693 / k$$

$$t_{1/2} = 0.693 / 1.54 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} = 450 \text{ s}$$

24. حل

$$\text{ہم جانتے ہیں کہ} \quad k = 0.693 / t_{1/2}$$

$$k = 0.693 / 8.0 \text{ minutes} = 0.087 \text{ minutes}^{-1}$$

$$\log A = \log k + \left(\frac{E_a}{2.303RT} \right)$$

$$\log A = \log (1.8 \times 10^{-5}) + \left(\frac{22500}{2.303 \times 1.987 \times 313} \right)$$

$$\log A = \log (1.8) - 5 + (15.7089)$$

$$\log A = 10.9642$$

$$A = \text{antilog } (10.9642)$$

$$A = 9.208 \times 10^{10} \text{ collisions s}^{-1}$$

حل -28

پہلے درجہ کے تعامل کے لئے

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{V_\infty}{V_\infty - V_t}$$

$$V_\infty = 58.3 \text{ ml. موجودہ صورت حال میں}$$

مختلف وقتوں میں k کی مختلف قیمتوں کو اس طرح محسوب کیا جاسکتا ہے۔

$$k = \left(\frac{20M}{20\text{min}} \right) = 1 \text{ Mmin}^{-1}$$

ایک تعامل کے شرح کا مستقل = 1 M min^{-1}

(ii) 80% تعامل کو مکمل کرنے کے لئے وقت کو محسوب کرنا

$$k = 1 \text{ Mmin}^{-1}, [A_0] = 100M, [A_0] - [A] = 80M, t = ?$$

چنانچہ

$$t = \left(\frac{[A_0] - [A]}{k} \right) = \left(\frac{80M}{1 \text{ Mmin}^{-1}} \right) = 80 \text{ min}$$

حل -27

یہاں ہمیں یہ دیا گیا ہے۔

$$E_a = 22.5 \text{ kcal mol}^{-1} = 22500 \text{ cal mol}^{-1}$$

$$T = 40^\circ\text{C} = 40 + 273 = 313 \text{ K}$$

$$k = 1.8 \times 10^{-5} \text{ sec}^{-1}$$

مساوات میں قیمتوں کو درج کرنے پر

$t \text{ (min)}$	V_t	$V_\infty - V_t$	$\frac{2.303}{t} \log \frac{V_\infty}{V_\infty - V_t}$
6	19.3	$58.3 - 19.3 = 39.0$	$k = \frac{2.303}{6} \log \left(\frac{58.3}{39} \right) = 0.0670 \text{ min}^{-1}$
12	32.6	$58.3 - 32.6 = 25.7$	$k = \frac{2.303}{12} \log \left(\frac{58.3}{25.7} \right) = 0.0683 \text{ min}^{-1}$
18	41.3	$58.3 - 41.3 = 17.0$	$k = \frac{2.303}{18} \log \left(\frac{58.3}{17} \right) = 0.0685 \text{ min}^{-1}$
24	46.5	$58.3 - 46.5 = 11.8$	$k = \frac{2.303}{24} \log \left(\frac{58.3}{11.8} \right) = 0.0666 \text{ min}^{-1}$

لہذا k کی قیمت مستقل کے قریب آ جاتی ہے۔ دیا گیا تعامل پہلے درجہ کا ہے۔
 k کی اوسط قیمت (mean value) 0.0676 min^{-1} ہے۔

29- حل:

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{V_0}{V_t} \right)$$

دئے گئے مرحلے میں $V_0 = 46.1 \text{ ml}$

ہر وقت پر k کی قیمت مندرجہ ذیل سے محسوب کر سکتے ہیں

$t \text{ (min)}$	V_t	$k = \left(\frac{2.303}{t} \right) \log \left(\frac{V_0}{V_t} \right)$
10	29.8	$k = \frac{2.303}{10} \log \left(\frac{46.1}{29.8} \right) = 0.0436 \text{ min}^{-1}$
20	19.3	$k = \frac{2.303}{20} \log \left(\frac{46.1}{19.3} \right) = 0.0435 \text{ min}^{-1}$

چنانچہ k کی قیمت مستقل کے قریب آ جاتی ہے۔ اس لئے یہ تعامل پہلے درجہ کا ہے۔

30- حل:

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]} \quad \text{i) پہلے درجہ کے تعامل کے لئے}$$

فرض کریں کہ $[A_0] = 100 \%$, $t = 50 \text{ minutes}$

Therefore, $[A] = 100 - 40 = 60$

$$k = (2.303 / 50) \log (100 / 60)$$

$$k = 0.010216 \text{ min}^{-1}$$

اس لئے شرح مستقل کی قیمت $0.010216 \text{ min}^{-1}$ ہے۔

(ii) $t = ?$ جب تعامل 80% مکمل ہوتا ہے

$$[A] = 100 - 80 = 20 \%$$

From above, $k = 0.010216 \text{ min}^{-1}$

$$t = (2.303 / 0.010216) \log (100 / 20)$$

$$t = 157.58 \text{ min}$$

80% تعامل مکمل ہونے کے لئے درکار وقت 157.58 منٹ ہے۔

عملی مشق (پریکٹکس)

PRACTICALS

+2

I۔ نامیاتی معیاری تجزیہ (Organic Qualitative Analysis)

عدد	تجربہ (Experiment)	مشاہدہ (Observation)	نتیجہ (Inference)
ابتدائی جانچ (Preliminary Test)			
1	بو: Odour نامیاتی مرکبات کی بو کو پہچاننا	(i) مچھلی کی بو (ii) کڑوے بادام کی بو (iii) فیئال کی بو (iv) خوشبودار پھل کی بو	(i) امین (Amine) ہو سکتا ہے۔ (ii) بنزائیڈ ہو سکتا ہے۔ (iii) فیئال ہو سکتا ہے۔ (iv) اسٹر ہو سکتا ہے۔
2	لٹمس کاغذ کی جانچ نامیاتی مرکبات کے ساتھ نم لٹمس کاغذ کومس کرنا	(i) نیلے لٹمس کو سرخ میں تبدیل ہونا (ii) سرخ لٹمس کو نیلے میں تبدیل ہونا (iii) رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی	(i) کارباکسلک ترشہ یا فیئال ہو سکتا ہے۔ (ii) امین ہو سکتا ہے (iii) کارباکسلک ترشہ فیئال اور امین کی غیر موجودگی
3	سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ساتھ تعامل: ایک امتحانی نالی میں 2ml سیر شدہ بائی کاربونیٹ کا محلول لیں۔ نامیاتی مرکبات کے دو یا تین قطرے (یا ٹھوس کی چٹکی) شامل کریں	(i) فوری بلبے (ii) فوری بلبے نہیں آتے	(i) کارباکسلک ترشہ کی موجودگی (ii) کارباکسلک ترشہ کی غیر موجودگی
4	بورش تعامل انگیز کے ساتھ عمل: (Borsche's reagent) ایک امتحانی نالی میں تھوڑی مقدار کا نامیاتی مرکبات لیں۔ 3ml کا بورش تعامل انگیز اور 1ml کا مرکنز HCL شامل کریں۔ اس آمیزہ گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔	زرد یا نارنجی یا سرخ تلچھٹ / رسوب	آلڈہائیڈ یا کیٹون کی موجودگی

5	خشک جلا کر جانچ (Charring Test) ایک خشک امتحانی نالی میں تھوڑی سی مقدار کا نامیاتی مرکب لیں۔ 2ml مرکب سلفیورک ترشہ شامل کریں اور اس آمیزے کو گرم کریں۔	جلی ہوئی شکر کی بو کی طرح جلنا۔ کاربوہائیڈریٹ کی موجودگی
الیفٹک یا ارومیٹک فطرت کی جانچ (Test for Aliphatic or Aromatic Nature)		
6	احتراقی جانچ (Ignition Test) ایک نکل کے چمچے میں نامیاتی مرکبات کی کچھ مقدار لیں اور بنسن شعلہ میں جلائیں۔	(i) ارومیٹک مرکبات کی موجودگی (ii) الیفٹک (Aliphatic) مرکبات کی موجودگی (i) کالک کے ساتھ جلنا۔ (ii) کالک کے بغیر جلنا۔
غیر سیر شدہ مرکبات کے لئے جانچ (Test for unsaturation)		
7	برومین کے پانی سے جانچ Bromine water Test ایک امتحانی نالی میں کچھ مقدار کا نامیاتی مرکبات لیں۔ 2ml کی کشید کردہ پانی سے حل کریں۔ اس محلول کے ساتھ برومین پانی کے چند قطرے ملائیے۔ اس آمیزے کو اچھی طرح ہلایئے۔	(i) برومین پانی کا رنگ نارنجی-زرد سے بے رنگ ہو جاتا ہے۔ (ii) رنگ کی کوئی تبدیلی نہیں۔ (iii) بے رنگ ہو کر سفید رسوب کا بننا (i) دیا گیا مادہ غیر سیر شدہ ہے۔ (ii) مادہ سیر شدہ ہے۔ (iii) ارومیٹک امین یا فینال کی موجودگی
8	محلول $KMnO_4$ سے جانچ ایک امتحانی نالی میں تھوڑی سی مقدار کا نامیاتی مرکب لیں۔ 2ml کا کشید کردہ پانی سے حل کریں۔ اس محلول کے ساتھ ہلکائے ہوئے قلعوی $KMnO_4$ محلول کے چند قطرے شامل کریں اور خوب ہلایئے۔	(i) گلابی رنگ کا $KMnO_4$ بے رنگ ہو جاتا ہے۔ (ii) رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ (i) دیا گیا مادہ غیر سیر شدہ ہے۔ (ii) دیا گیا مادہ سیر شدہ ہے۔
منتخب شدہ نامیاتی فعلی گروپ کے لئے جانچ (Test for selected organic functional groups)		
فینال کے لئے جانچ		
9	تعدیلی $FeCl_3$ سے جانچ: ایک خشک امتحانی نالی میں 1 ملی لیٹر کا تعدیلی فیئرک کلورائیڈ کا محلول لیں۔ نامیاتی مرکبات کے دو سے تین قطرے (یا ایک چمکی ٹھوس) نامیاتی مرکبات شامل کریں۔ اگر کوئی رنگ نظر نہ آئے تو الکحل کے تین یا چار قطرے شامل کریں۔	(i) بنفشی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ (ii) بنفشی۔ نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ (iii) سبز رنگ دکھائی دیتا ہے۔ (i) فینال کی موجودگی (ii) α -نافتحال کی موجودگی (iii) β -نافتحال کی موجودگی

(Test for Carboxylic Acid) کار باکسلک ترشہ کی جانچ			
10	اسٹرسازی کا تعامل: ایک صاف امتحانی نالی میں 1 ml نامیاتی مرکب یا (ایک ٹھوس چٹکی) لیں۔ 1 ml کا اتھل الٹھل اور چار سے پانچ قطرے مرکب سلفیورک ترشہ کے شامل کریں۔ اس آمیزے کو پانچ منٹ کے لئے خوب گرم کریں۔ بیکر میں موجود سوڈیم کاربونیٹ محلول میں اس آمیزہ کو ڈالیں۔ بو کو پہچانئے۔	(i) خوشبودار پھلوں کی بو محسوس کی جاتی ہے۔	کار باکسلک گروہ کی موجودگی
(Test for aldehydes) آلدی ہائیڈ کی جانچ			
11	ٹالن تعامل انگیز کی جانچ: Tollen's reagent Test ایک خشک صاف امتحانی نالی میں 2ml کا ٹالن تعامل انگیز لیں۔ نامیاتی مرکب کے تین سے چار قطرے (یا) (0.20) ٹھوس شامل کریں۔ پانچ منٹ کے لئے اس آمیزے کو مانی کا برتن (Water bath) میں گرم کریں۔	ایک چمکدار چاندی کا آئینہ بنتا ہے	آلدی ہائیڈ کی موجودگی
12	فہلنگ جانچ: (Fehling's test) ایک امتحانی نالی میں 1 ملی لیٹر کا فہلنگ محلول A اور B لیں۔ چار سے پانچ قطرے نامیاتی مرکبات یا (0.2g) ٹھوس شامل کریں۔ اس آمیزے کو پانی کے برتن (water bath) میں پانچ منٹ کے لئے گرم کریں۔	سرخ رسوب بنتا ہے۔	آلدی ہائیڈ کی موجودگی
کیٹون کی جانچ:			
13	لیگل کی جانچ (Legal's test) ایک امتحانی نالی میں مادے کی تھوڑی سی مقدار لیں۔ 1 ملی لیٹر (Sodium Nitro Prusside) سوڈیم ہائیڈراکسائیڈ کو قطرہ بہ قطرہ شامل کریں۔	سرخ رنگ کا ظاہر ہونا	کیٹون کی موجودگی

امین کے لئے جانچ (Test for an amine)			
14	رنگین مادوں سے جانچ (Dye test)	Scarlet	ایک پاک و صاف امتحانی نالی میں تھوڑی سی مقدار کی نامیاتی مادے لیں۔ اس کو 2ml کے HCl سے حل کریں۔ NaNO_2 کی چند قلمیں شامل کریں۔ اس آمیزے کو Ice bath میں ٹھنڈا کریں۔ اس کے بعد 2ml کا ٹھنڈا β-Naphthol NaOH شامل کریں۔
ڈائی امائیڈ کی جانچ (Diamide Test)			
15	بی یورٹ کی جانچ (Biuret test)	بنفشی رنگ کا ظاہر ہونا	ایک امتحانی نالی میں تھوڑی سی مقدار نامیاتی مرکب لیں۔ اچھی طرح گرم ہونے کے بعد ٹھنڈا کریں۔ 2ml کے پانی سے تلچھٹ کو حل کریں۔ 1ml کے ہلکے ہوئے کارپرسلفٹ محلول کے ساتھ 10% سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے چند قطرے قطرہ بہ قطرہ شامل کریں۔
کاربوہائیڈریٹ کی جانچ (Test for Carbohydrates)			
16	مولیش کی جانچ (Molisch's Test)	دو مائع کے ملنے کی جگہ پر بنفشی یا جامنی رنگ کا حلقہ بنتا ہے۔	ایک امتحانی نالی میں تھوڑی سی مقدار کاربوہائیڈریٹ مرکب لیں۔ 2ml کے پانی سے حل کریں۔ تین سے چار قطرے آلفا نافتھال شامل کریں۔ اس کے بعد مرکب سے H_2SO_4 کو امتحانی نالی کے کنارے میں احتیاط سے شامل کریں۔
17	اوزونون جانچ: (Osazone test)	زرد رنگ کی قلمیں حاصل ہوتی ہیں۔	ایک امتحانی نالی میں نامیاتی مرکب کی تھوڑی مقدار لیں۔ 1 ml کا Phenyl hydrazine شامل کریں۔ اس آمیزے کو پانچ منٹ کے لئے ابلتے ہوئے پانی کے برتن (water bath) میں رکھیں۔

نتیجہ (رپورٹ): (Report)

دیا گیا نامیاتی مرکب ہے۔

(i) ارومیٹک / الیفیٹک

(ii) سیر شدہ / غیر سیر شدہ

(iii) فعلی گروہ


تجزیہ کے لئے نامیاتی مرکبات کی فہرست:

1- بنزالڈی ہائیڈ	5- بنزوئک ترشہ	9- انیلین
2- سنامالڈی ہائیڈ	6- سنامک ترشہ	10- سیلیسلک ترشہ
3- اسیٹوفینون	7- یوریا	
4- بنزوینون	8- گلوکوز	

وجوہات:

3- سوڈیم ہائی کاربونیٹ کے ساتھ عمل:

کارباکسلک ترشہ، سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ تعامل پاکر CO_2 خارج کرتا ہے۔ CO_2 کا اخراج فوری جلیے (Brisk Effervescence) دیتا ہے۔




4- بوش تعامل انگیز (Borsche's reagent) کے ساتھ عمل

میٹھانول اور تھوراسا سلفیورک ترشہ پر مشتمل محلول میں 2,4-dinitrophenylhydrazine حل کر کے بوش تعامل انگیز تیار کیا جاتا ہے۔


آلڈی ہائیڈ اور کیٹون بورش عامل کے ساتھ تعامل پاکر زرد-نارنجی یا سرخ رسوب دیتا ہے۔ (dinitro phenylhydrazone) ایفائلک کاربونیل کے مرکبات گہرے زرد رنگ کا رسوب دیتے ہیں۔

الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے کاربونیل گروپ کی معیاری شناخت کے لئے 2,4-dinitrophenyl hydrazine استعمال کیا جاتا ہے۔ 2,4-dinitrophenyl hydrazine کا زرد یا نارنجی-سرخ رسوب بننا الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے مثبت نتیجہ کو ظاہر کرتا ہے۔



5- جلانے کی جانچ (Charring test)

جب کاربوہائیڈریٹ کو مرکز سلفیورک ترشہ کے ساتھ تعامل کیا جاتا ہے تو کاربوہائیڈریٹ کی نابیدگی کے نتیجے میں جل جاتا ہے۔




6- احتراقی آتش گیری کی جانچ (Ignition Test)

ارومٹک مرکبات تیز سیاہ کالک (Soot) کے ساتھ جلتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اعلیٰ کاربن-ہائیڈروجن تناسب پایا جاتا ہے۔
ایلیفٹک مرکبات کالک کے بغیر شعلے کے جلتے ہیں۔


7- برومین کے پانی کے ساتھ جانچ (Test with bromine water)

اس جانچ میں غیر سیر شدہ نامیاتی مرکب کے محلول کے ساتھ برومین کا پانی شامل کئے جانے پر اس کا نارنجی-سرخ محلول غائب ہو کر بے رنگ ہو جاتا ہے۔



8- KMnO₄ سے جانچ (Bayer's Test)

اس جانچ میں جب غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کے ساتھ قلعی KMnO₄ شامل کیا جاتا ہے تو KMnO₄ کا رنگ غائب ہو جاتا ہے۔
گلابی رنگ کا غائب ہونا MnO₂ کے بھوری (Brown) رسوب کے تشکیل کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔




9- تعدیلی FeCl₃ سے جانچ

فینال فیرک رواں کے ساتھ تعامل پاکر بنفشی رنگ کا کمپلکس بناتا ہے۔
نافتھال کا آبی محلول تعدیلی فیرک کلورائیڈ کے ساتھ کوئی مخصوص رنگ نہیں دیتا۔ لیکن a اور b نافتھال کا الکوحلی محلول،
بائی نافتھال binaphthols کے بننے کی وجہ سے بالترتیب نیلا-بنفشی اور سبز رنگ دیتا ہے۔


10- اسٹریساز سے جانچ (Esterification - Test)

کاربوکسلک ترشہ الکحل کے ساتھ تعامل پا کر پھلوں کی خوشبو والا مرکب بناتا ہے جسے Ester کہتے ہیں۔ اس اسٹریساز میں مرکب سلفیورک ترشہ کو متاسی عامل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔



11- ٹالن کے تعامل انگیز سے جانچ (Tollen's reagent test)

آلڈی ہائیڈ، ٹالنس تعامل انگیز (Tollen's reagent) کے ساتھ تعامل پا کر امتحانی نالی کی اندرونی سطح پر عنصری چاندی کی سطح بناتا ہے۔ لہذا امتحانی نالی کی اندرونی دیواروں پر چاندی کا آئینہ بنتا ہے۔




ٹالن کے تعامل انگیز کی تیاری (Tollen's reagent preparation)

ٹالنس تعامل انگیز، امونیائی سلور نائٹریٹ (Ammoniacal Silver Nitrate) ہے۔ یہ مندرجہ ذیل کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ ایک صاف خشک امتحانی نالی میں تقریباً 1 g سلور نائٹریٹ کی قلموں کو کشید کئے ہوئے پانی میں حل کیا جاتا ہے۔ اس سلور نائٹریٹ کے آبی محلول میں 2ml کا ہلکا یا ہوا NaOH محلول شامل کیا جاتا ہے۔ سلور آکسائیڈ کا بھورا (Brown) رسوب بنتا ہے۔ ہلکائے ہوئے امونیا کے محلول کو قطرہ بہ قطرہ شامل کر کے اس رسوب کو حل کیا جاتا ہے۔

12- فہلنگ محلول سے جانچ: (Fehling's Test)

فہلنگ محلول A کا پیرسلفیٹ کا آبی محلول ہے۔ فہلنگ محلول B سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ کا صاف محلول (Rochelle Salt) اور طاقت ور قلی (NaOH) ہے۔ فہلنگ محلول A اور B کے مساوی حجم کو شامل کر کے فہلنگ محلول حاصل کیا جاتا ہے، جو گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ فہلنگ محلول میں کا پر (II) رواں قلوں میں ٹارٹریٹ رواں کے ساتھ کمپلکس بناتا ہے۔ الڈی ہائیڈ، فہلنگ محلول میں موجود کا پر (II) کے رواں کو تخیل کر کے کپرس آکسائیڈ (I) کا پر (I) آکسائیڈ کا سرخ رسوب دیتا ہے۔





نوٹ:

بنز الڈی ہائیڈ (Benzaldehyde) یہ جانچ (Test) نہیں دے سکتا۔ اس لئے کہ تعامل بہت سست ہے۔


(Sodium Nitroprusside Test) کی جانچ: Sodium Nitroprusside (13)

قلوی (alkali) سے بننے والا کیٹون کا مشعر واں، نائٹرو پرو سائڈ رواں کے ساتھ تعامل پا کر سرخ رنگین کمپلکس بناتا ہے۔ یہ جانچ الڈی ہائیڈ نہیں دے سکتا۔




(Azo-dye Test) کی جانچ: ایزو-رنگین مادے کی جانچ (14)

ارو میٹک پرائمری امینین یہ ٹسٹ دیتا ہے۔ ارو میٹک پرائمری امینین، نائٹرس ترشہ کے ساتھ تعامل پا کر ڈائی ایزو نیم نمک (diazonium salt) بناتا ہے۔ یہ ڈائی ایزو نیم نمک، نافتحال کے ساتھ جمعی تعامل (Coupling reaction) پا کر نارنجی رنگ کا ایزو رنگ (Azo dye) بناتا ہے۔




(Biuret Test) کی جانچ: (15) بائی یورٹ جانچ

Diamide (جیسے یوریا) کو تیز گرم کرنے پر بائی یورٹ بناتا ہے، جو کا پر سلفیٹ کے محلول سے Cu²⁺ رواں کے ساتھ کا پر کمپلکس بناتا ہے۔ یہ کا پر-بائی یورٹ کا کمپلکس گہرا بنفشی رنگین ہوتا ہے۔




(16) مولش کی جانچ: (Molisch's test)

طاقتور معدنیاتی ترشے سے ڈائی سیکرائڈ (Disaccharides) اور پالی سیکرائڈ (Polysaccharides) آبدگی پا کر مونوسیکرائڈ (monosaccharides) بناتے ہیں۔ پٹوس نابیدہ ہو کر Furfural بناتا ہے۔ جب کہ ہکڑوس Hexoses نابیدہ ہو کر 5-hydroxymethylfurfural بناتا ہے۔ اس طرح سے بننے والا الڈی ہائڈ، α -Naphthol کے دوسالموں کے ساتھ تکشف پا کر بینگنی رنگ کا حاصل بناتا ہے، جسے نیچے دکھایا گیا ہے۔



(17) اوسازون سے جانچ: (Osazone Test)

اسٹیک ترشہ میں Phenyl Hydrazine، کو جب تحویلی شکر کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے تو (Osazone) اوسازون بنتا ہے۔ اس تعامل میں کاربن کے پہلے دو جوہر شامل ہوتے ہیں۔ وہ شکر جو ان کاربنوں کی اپنی تشکیل میں مختلف ہوتے ہیں، وہ ایک ہی قسم کا اوسازون دیتے ہیں۔ لہذا گلوکوز، فرکٹوز اور مینوس (Glucose, Fuctose and Mannose) ایک ہی سوئی کی قسم کے زرد قلمیں دیتے ہیں۔




II۔ حجمی تجزیہ (Volumetric Analysis)

1۔ فیروس سلفیٹ کا تخمینہ: (Estimation of Ferrous Sulphate)

مقصد: دئے گئے نامعلوم 750 ml محلول میں حل شدہ فیروس سلفیٹ (FeSO_4) کی مقدار کا حجمی اندازہ لگائیے۔ اس کے لئے تمہیں 0.1102N ارتکاز (Normality) کا معیاری فیروس امونیم سلفیٹ کا محلول اور لنک محلول کی طرح پوٹاشیم پرمینگنیٹ محلول دیا گیا ہے۔

اصول: اس حجمی تجزیے (Titration) کے دوران، (فیروس نمک سے) Fe^{2+} رواں، MnO_4^- رواں میں تکسید پاتے ہیں اور

MnO_4^- ، Mn^{2+} سے Mn^{2+} رواں میں تحویل پاتے ہیں۔



شمار عدد	مواد	حجمی تجزیہ I -	حجمی تجزیہ II -
1	شیشے کا ظرفک	KMnO_4	KMnO_4
2	نالیچہ کا محلول	20ml کا معیاری FAS	20ml کا نامعلوم FeSO_4
3	شامل کیا جانے والا ترشہ	2N کا 20ml سلفیورک ترشہ (تقریباً)	2N کا 20ml سلفیورک ترشہ (تقریباً)
4	تپش	تجربہ گاہ کی تپش	تجربہ گاہ کی تپش
5	نمائندہ	خود نمائندہ (KMnO_4)	خود نمائندہ (KMnO_4)
6	اختتامی نقطہ	مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری	مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری
7	FeSO_4 کا معادل وزن		

طریقہ :

معاثرہ I -

(لنک KMnO_4) بمقابلہ (معیاری FAS)

شیشے کے ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو KMnO_4 محلول سے کھنگال (rinse) کرا سی

KMnO_4 محلول سے صفر نشان تک بھر دیا جاتا ہے۔

ٹھیک 20 ملی میٹر کے معیاری FAS محلول کو صاف دھوئی ہوئی مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اس FAS محلول میں تقریباً 20ml

کے 2N سلفیورک ترشہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک سے لنک محلول KMnO_4 کے خلاف اس آمیزے کا معاثرہ (Titrate) کیا جاتا

ہے۔ KMnO_4 کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جائے جب تک کہ مستقل ہلکا گلابی رنگ نمودار ہو۔ ظرفک (Burette) کی نگارش کو نوٹ کریں

- Concordant ہم آہنگی قیمت حاصل کرنے تک اس طریقہ کار کو دہرایا جاتا ہے۔

معاثرہ I- (Titration-I)

(KMnO₄ لنک) بمقابلہ (معیاری FAS)

Concordant Value ہم آہنگی قیمت (ml) کا KMnO ₄	ظرفک		معیاری FAS کا حجم (ml)	شمار عدد
	اختتامی نگارش (ml)	ابتدائی نگارش (ml)		
			20	1
			20	2
			20	3

حسابات:

$$(V_1) = \dots\dots\dots \text{ ml} \quad \text{لنک (KMnO}_4 \text{ محلول کا حجم)}$$

$$(N_1) = \dots\dots\dots \text{ N} \quad \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا ارتکاز (Normality)}$$

$$(V_2) = 20 \text{ ml} \quad \text{معیاری FAS محلول کا ارتکاز}$$

$$\text{Normality of standard FAS solution } (N_2) = 0.1102 \text{ N}$$

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \quad \text{ارتکاز کے مساوات کے مطابق}$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$(N_1) = \dots\dots\dots \text{ X } \dots\dots\dots \text{ N} \quad \text{لنک (KMnO}_4 \text{ محلول کا ارتکاز (Normality)}$$

معاثرہ II- (Titration-II)

(نامعلوم FeSO₄) مخالف (لنک KMnO₄)

ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ KMnO₄ محلول سے کھگال rinse کر کے اسی KMnO₄ کو پیمانے کے صفر نشان تک بھردیا جاتا ہے۔ 20ml نامعلوم FeSO₄ محلول کو نالیچے سے صاف مخروطی صراحی میں ڈالا جاتا ہے۔ اس FeSO₄ محلول میں تقریباً 2N، 20ml سلفیورک ترشہ کا شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک Burette سے لنک محلول KMnO₄ کے خلاف اس آمیزے کا معاثرہ (titration) کیا جاتا ہے۔ KMnO₄ محلول کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ مستقل ہلکا گلابی رنگ نمودار ہو جائے۔ ظرفک کی نگارش کو نوٹ کر کے اور اس طریقہ کار کو ہم آہنگ (Concordant Value) قیمت حاصل کرنے تک دہرایا جاتا ہے۔

معاثرہ II- (Titration-II)

(لنک KMnO_4) بمقابلہ (نامعلوم FeSO_4 محلول)

شمار عدد	نامعلوم FeSO_4 کا حجم (ml)	تیشے کا درجہ دار پیمانہ کی نگارشات		ہم آہنگ قیمت KMnO_4 کا حجم (ml)
		ابتدائی (ml)	اختتامی (ml)	
1	20			
2	20			
3	20			

حسابات:

$$\text{نامعلوم } \text{FeSO}_4 \text{ محلول کا حجم} \quad V_1 = 20 \text{ ml}$$

$$\text{نامعلوم } \text{FeSO}_4 \text{ کا ارتکاز (Normality)} \quad N_1 = ? \text{ N}$$

$$\text{لنک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا حجم} \quad V_2 = \text{ml}$$

$$\text{لنک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا ارتکاز (Normality)} \quad N_2 = X \text{ N}$$

$$\text{Normality ارتکاز مساوات کے مطابق} \quad V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \frac{Y}{\text{}} \text{ N}$$

$$\text{نامعلوم } \text{FeSO}_4 \text{ محلول کی نارمالٹی (ارتکاز) (Normality)} = \text{ } \text{ N}$$

کمیت کے حسابات:

1 لیٹر کے محلول میں حل پذیر FeSO_4 کی مقدار (معادل کمیت) $\times$ (ارتکاز)

$$750 \text{ ملی لیٹر کے محلول میں حل پذیر } \text{FeSO}_4 \text{ کی مقدار} = \frac{750 \times \text{معادل کمیت} \times \text{ارتکاز}}{1000}$$

$$N_1 = \frac{Y \times 278 \times 3}{4}$$

$$= \text{ g}$$


رپورٹ :

$$750 \text{ ml کے محلول میں حل پذیر } \text{FeSO}_4 \text{ کی مقدار} = \text{ g}$$

2- فیرس امونیم سلفیٹ (FAS) کا تخمینہ لگانا (Estimation of Ferrous Ammonium Sulphate (FAS))

مقصد:

دئے گئے نامعلوم محلول کے حجم کے 1500ml میں جی طور پر حل پذیر فیرس امونیم سلفیٹ (FAS) کی مقدار کا تخمینہ لگانا۔ اس کے لئے تمہیں KMnO_4 محلول انک محلول کی طرح اور 0.1024N (Normality) ارتکاز کا معیاری فیرس سلفیٹ دیا گیا ہے۔



مختصر طریقہ کار :

Titration-II	معاثرہ-II	Titration I	معاثرہ-I	شمار عدد مواد-Content	
KMnO_4		KMnO_4		ظرفک (Burette) محلول	1
FAS	20ml کا نامعلوم	FeSO_4	20 ملی لیٹر کا معیاری	نالیچہ محلول (Pipette)	2
	2N کا 20 ملی لیٹر H_2SO_4 (تقریباً)		2N کا 20 ملی لیٹر H_2SO_4 (تقریباً)	شامل کیا جانے والا ترشہ	3
	تجربہ گاہ کی تپش		تجربہ گاہ کی تپش	تپش	4
	خود کار نمائندہ (Self-indicator)		خود کار نمائندہ (Self-indicator)	نمائندہ	5
	مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری		مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری	اختتامی نقطہ	6
				FAS کی معادل کمیت = 392	7

طریقہ کار

معاثرہ I - Titration - 1

(نیک KMnO_4) بمقابلہ (معیاری FeSO_4)

ظرفک Burette کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ KMnO_4 محلول سے کھنگال کر (rinse) اسے صفر نشان تک FeSO_4 محلول سے بھرا جاتا ہے۔ نالیچہ (Pipette) سے تقریباً 20ml کا معیاری FeSO_4 محلول کو صاف پاک مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اس محلول کے ساتھ تقریباً 2N کا 20ml سلفیورک ترشہ شامل کیا جاتا ہے۔

ظرفک (Burette) سے منسلک محلول KMnO_4 کے خلاف اس آمیزے کا معاثرہ (Titration) کیا جاتا ہے۔ مستقل ہلکے گلابی رنگ کے نمودار ہونے تک KMnO_4 کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک Burette کی نگارش نوٹ کی جاتی ہے۔ ہم آہنگ قیمت حاصل کرنے تک اس طریقہ کار کو دوہرایا جاتا ہے۔

معاثرہ - I Titration - 1

(لنک KMnO_4) بمقابلہ (معیاری FeSO_4)

شمار عدد	معیاری FeSO_4 کا حجم (ml)	ظرف کی نگارش		ہم آہنگ قیمت KMnO_4 کا حجم (ml)
		ابتدائی (ml)	اختتامی (ml)	
1	20			
2	20			
3	20			

حسابات:

$$\text{(لنک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا حجم)} \quad V_1 = \text{ml}$$

$$\text{KMnO}_4 \text{ محلول کی نارمالٹی (Normality)} \quad N_1 = ?N$$

$$\text{معیاری } \text{FeSO}_4 \text{ محلول کا حجم} \quad V_2 = 20 \text{ ml}$$

$$\text{معیاری } \text{FeSO}_4 \text{ محلول کی نارمالٹی (Normality)} \quad N_2 = 0.1024 N$$

ارتکاز (Normality) مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \quad \text{مساوات کے مطابق نارمالٹی}$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$\text{(لنک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا ارتکاز (Normality)} \quad (N_1) = \frac{X}{\quad} N$$

معاثرہ - II (Titration-II)

نامعلوم (FAS) بمقابلہ (لنک KMnO_4)

ظرف کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کو KMnO_4 محلول سے کھنگال (rinse) کر اسی KMnO_4 محلول سے صفر نشان تک پر کر دیا جاتا ہے۔ نالیچہ سے FAS محلول کو پاک صاف مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ FAS محلول کے ساتھ تقریباً 2N کا 20ml سلفیورک ترشہ شامل کیا جاتا ہے۔ مستقل ہلکے گلابی رنگ کے نمودار ہونے تک KMnO_4 محلول کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرف (Burette) کی نگارش کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو ہم آہنگ قیمت کے حاصل کرنے تک دہرایا جاتا ہے۔

(لنک KMnO_4) بمقابلہ (نامعلوم FAS)

ہم آہنگ قیمت KMnO_4 کا حجم (ml)	ظرف کی نگارشات		نامعلوم FAS کا حجم	شمار عدد
	اختتامی (ml)	ابتدائی (ml)		
			20	1
			20	2
			20	3

حسابات:

$$\begin{aligned}
 V_1 &= 20\text{ml} \quad \text{نامعلوم FAS محلول کا حجم} \\
 N_1 &= ? \text{ N} \quad \text{نامعلوم FAS محلول کا (Normality)} \\
 V_2 &= \text{ml} \quad \text{(لنک) } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کا حجم} \\
 N_2 &= \text{N} \quad \text{لنک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کی نارمالٹی (Normality)} \\
 \text{مساوات کے مطابق Normality} &= V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2
 \end{aligned}$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \frac{Y}{\quad} \text{ N}$$

$$\text{نامعلوم FAS محلول کا ارتکاز} = \frac{Y}{\quad} \text{ N}$$

وزن کے حسابات: Weight Calculation

$$\begin{aligned}
 &= \text{ایک لیٹر کے محلول میں حل پذیر FAS کی مقدار} \times \text{نارمالٹی (ارتکاز)} \\
 &= \frac{1500 \times \text{معادل وزن} \times \text{نارمالٹی}}{1000} \\
 &= \frac{Y \times 392 \times 1500}{1000} \\
 &= \text{g}
 \end{aligned}$$

رپورٹ : (Report)

$$1500 \text{ ml کے محلول میں حل پذیر FAS کی مقدار} = \text{g}$$


3۔ آکسلاک ترشہ کا تخمینہ لگانا: (Estimation of oxalic acid)

مقصد :

دئے گئے محلول کے 500ml میں حل پذیر آکسلاک ترشہ کی مقدار کا تجزیہ اندازہ/تخمینہ لگائیے۔ اس کے لئے آپ کو لنک محلول کی طرح KMnO_4 اور 0.1N نارمالٹی کا (FAS) فیرس امونیم سلفیٹ کا معیاری محلول دیا گیا ہے۔

اصول:

اس معارہ (Titration) کے دوران، آکسلاک ترشہ CO_2 میں تکسید پاتا ہے، اور MnO_4^- (KMnO_4 سے) Mn^{2+} کے روانوں میں تحویل پاتے ہیں۔



چونکہ آکسلاک ترشہ کے ایک مول سے الیکٹران کے دو مول خارج ہوتے ہیں۔ آکسلاک ترشہ کی معادل کیت $= \frac{106}{2} = 63$
(آکسلاک ترشہ دو آبدہ ہے)

مختصر طریقہ کار :

شمار عدد	مواد Content	معارہ I-	معارہ II-
1	ظرفک (Burette) محلول	KMnO_4	KMnO_4
2	نالیچہ محلول (Pipette)	20ml کا معیاری FAS	20ml کا نامعلوم آکسلاک ترشہ
3	شامل کیا گیا ترشہ	2N کا 20ml تقریباً	2N کا 20ml (تقریباً)
4	تپش	تجربہ گاہ کی تپش	60 - 70° C
5	نمائندہ	خود۔ نمائندہ (KMnO_4)	خود۔ نمائندہ (KMnO_4)
6	اختتامی نقطہ	مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری	مستقل ہلکے گلابی رنگ کی نموداری۔
7	63 = آکسلاک ترشہ کا معادل وزن		

طریقہ کار:

معارہ I- (Titration-1)

(لنک KMnO_4) بمقابلہ (معیاری FAS)

ظرفک (Burette) کو دھویا جاتا ہے۔ محلول KMnO_4 سے کھگال کر اسی KMnO_4 محلول کو صفر نشان تک پر کر دیا جاتا ہے۔ نالیچہ (Pipette) سے بالکل 20ml کا معیاری FAS محلول کو پاک دھوئی ہوئی مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اس FAS محلول کے ساتھ تقریباً 2N کا 20ml سلفیورک ترشہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک (Burette) سے لنک KMnO_4 کے خلاف اس آمیزے کا معارہ (Titration) کیا جاتا ہے۔ مستقل ہلکے گلابی رنگ کے نمودار ہونے تک KMnO_4 کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک (Burette) کی نگارش نوٹ کی جاتی ہے۔ ہم آہنگ قیمت حاصل کرنے تک اس طریقہ کو دہرایا جاتا ہے۔

معاثرہ - I Titration - 1

(منسلک KMnO_4) (معیاری FAS محلول)

ہم آہنگ قیمت KMnO_4 کا حجم (ml)	ظرف کی نگارشات		معیاری FAS کا حجم (ml)	شمار عدد
	اختتامی (ml)	ابتدائی (ml)		
			20	1
			20	2
			20	3

حسابات:

$$V_1 = \text{ml} \quad \text{لنک محلول } \text{KMnO}_4 \text{ کا حجم}$$

$$N_1 = ? \text{ N} \quad \text{لنک محلول } \text{KMnO}_4 \text{ کی نارمالٹی}$$

$$V_2 = 20 \text{ ml} \quad \text{معیاری FAS محلول کا حجم}$$

$$N_2 = 0.1 \text{ N} \quad \text{معیاری FAS محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

نارمالٹی (Normality) مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \text{لنک } \text{KMnO}_4 \text{ کی نارمالٹی } N_1 = N$$

معاثرہ - II (Titration-II)

(نا معلوم آکسائلک ترشہ) بمقابلہ (لنک KMnO_4)

ظرف (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ KMnO_4 محلول سے ظرف کو کھگال کر اسی محلول سے صفر نشان تک بھرا جاتا ہے۔ 20ml کا نا معلوم آکسائلک ترشوی محلول کو نالیچہ (Pipette) سے پاک دھوئی ہوئی مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اسی آکسائلک ترشوی محلول کے ساتھ 2N کا تقریباً 20ml سلفیورک ترشہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس آمیزے کو بنسن برنر (Bunsen Burner) استعمال کر کے 60°C - 70°C تک گرم کیا جاتا ہے اور اس گرم محلول کو (Burette) منسلک محلول KMnO_4 کے خلاف معاثرہ کیا جاتا ہے۔ مستقل ہکا گلابی رنگ نمودار ہونے تک KMnO_4 کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرف کے نگارش کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو ہم آہنگ قیمت حاصل کرنے تک دوہرایا جاتا ہے۔

معائرہ II- (Titration-II)

(نامعلوم آکسائلک ترشہ) بمقابلہ (لنک KMnO_4)

شمار عدد	نامعلوم آکسائلک ترشہ کا حجم (ml)	ظرف کی نگارشات		ہم آہنگ قیمت KMnO_4 کا حجم (mi)
		ابتدائی (ml)	اختتامی (ml)	
1	20			
2	20			
3	20			

حسابات:

$$V_1 = 20 \text{ ml} \quad \text{نامعلوم آکسائلک ترشوی محلول کا حجم}$$

$$N_1 = ? \text{ N} \quad \text{نامعلوم آکسائلک ترشوی محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

$$V_2 = \text{ml} \quad \text{منسلک } \text{KMnO}_4 \text{ کا حجم}$$

$$N_2 = \text{N} \quad \text{منسلک } \text{KMnO}_4 \text{ محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \quad \text{نارمالٹی کی مساوات کے مطابق}$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \frac{Y}{\text{نامعلوم آکسائلک ترشوی محلول کی نارمالٹی}} \text{ N}$$

وزن کے حسابات محسوب کرنا:

$$\text{ایک لیٹر کے محلول میں حل پذیر آکسائلک ترشہ کی مقدار} = (\text{نارمالٹی}) \times (\text{معادل وزن})$$

$$\begin{aligned} 500 \text{ ml کے محلول میں حل پذیر آکسائلک ترشہ کی مقدار} &= \frac{Y \times 63 \times 500}{1000} \\ &= \frac{x 63 \times 500}{1000} \\ &= \text{g} \end{aligned}$$

رپورٹ :

$$\text{دئے گئے 500 ml کے محلول میں حل پذیر آکسائلک ترشہ کی مقدار} = \text{g}$$


4- سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کا تخمینہ لگانا (Estimation of NaOH)

مقصد:


دئے گئے نامعلوم محلول کا 250 ml میں حل پذیر سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی مقدار کا حجمی تخمینہ لگائیے۔ اس کے لئے تمہیں لنک محلول کی طرح ہائیڈروکلورک ترشہ اور 0.0948 N نارمالٹی کا معیاری سوڈیم کاربونیٹ کا محلول دیا گیا ہے۔

اصول:

HCl سے سوڈیم کاربونیٹ کی تعدیل کو نیچے دیا گیا ہے۔ اختتامی نقطہ (End Point) کو ظاہر کرنے کے لئے میتھیل آرنج نمائندہ کی طرح استعمال ہوتا ہے۔



HCl سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی تعدیل کو نیچے دیا گیا ہے۔ اختتامی نقطہ کو ظاہر کرنے کے لئے فینا فتھلین نمائندہ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔



مختصر طریقہ عمل:

شمارہ	مواد (Content)	معاثرہ I	معاثرہ II
1	ظرفک کا محلول	HCl (لنک محلول)	HCl (لنک محلول)
2	نالیچہ کا محلول	20ml کا معیاری محلول	20ml کا نامعلوم NaOH محلول
4	درجہ حرارت	تجربہ گاہ کی درجہ حرارت	تجربہ گاہ کی درجہ حرارت
5	نمائندہ	میتھیل آرنج	فینا فتھلین
6	اختتامی نقطہ	زرد سے ہلکے گلابی رنگ میں تبدیلی	گلابی رنگ کا غائب ہونا
7	NaOH = 40 کا معادل وزن		

طریقہ عمل:

معاثرہ I -

(منسلک HCl) بمقابلہ (معیاری Na_2CO_3)

ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ HCl محلول سے کھنگال کر اسی محلول سے صفر نشان تک پر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک 20ml کے معیاری Na_2CO_3 محلول کو پاک، دھوئے ہوئے مخروطی صراحی میں ڈالا جاتا ہے۔ نمائندہ میتھیل آرنج کے دو تین قطرے اس محلول میں شامل کر کے ظرفک (Burette) سے لنک محلول HCl سے معاثرہ (Titrate) کیا جاتا ہے۔ ہلکے زرد رنگ سے ہلکے گلابی رنگ کے آنے تک HCl قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک (Burette) کے نگارشات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو ہم آہنگ قیمت حاصل کرنے تک دہرایا جاتا ہے۔

معائرہ I- (Titration-I)

(لنک HCl) بمقابلہ (معیاری Na₂CO₃)

ہم آہنگ قیمت HCl کا حجم (ml)	ظرفک کی نگارشات		معیاری Na ₂ CO ₃ کا حجم (ml)	
	اختتامی (ml)	ابتدائی (ml)		
			20	1
			20	2
			20	3

حسابات:

$$V_1 = \text{ml HCl کے محلول (لنک) کا حجم}$$

$$N_1 = ? \text{ N (لنک) محلول HCl کی نارمالٹی}$$

$$V_2 = 20 \text{ ml معیاری Na}_2\text{CO}_3 \text{ محلول کا حجم}$$

$$\text{Normality of standard Na}_2\text{CO}_3 \text{ solution } N_2 = 0.0948 \text{ N}$$

نارمالٹی (Normality) مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2 \text{ نارمالٹی (Normality) مساوات کے مطابق}$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$(N_1) = \frac{\quad \times \quad}{\quad} \text{ N (Normality) لنک محلول کی نارمالٹی}$$

معائرہ II- (Titration-II)

(نامعلوم NaOH) بمقابلہ (لنک HCl)

ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ HCl محلول سے کھنگال کر کے (rinse) محلول سے صفر نشان تک پر کر دیا جاتا ہے۔ نالیچہ (Pipette) سے ٹھیک 20ml کے نامعلوم NaOH کو پاک صاف مخروطی صراحی میں ڈالا جاتا ہے۔ نمائندہ فیناف تھلین کے دو سے تین قطرے اس محلول میں شامل کئے جاتے ہیں اور ظرفک سے لنک HCl محلول کے خلاف معائرہ کیا جاتا ہے۔ گلابی رنگ مکمل غائب ہونے تک HCl قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک کے نگارشات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ ہم آہنگ قیمت حاصل کرنے تک تجربے کو دہرایا جاتا ہے۔

(لنک HCl) بمقابلہ (نامعلوم NaOH محلول)

ہم آہنگ قیمت HCl کا حجم (ml)	ظرف کی نگارشات		نامعلوم NaOH کا حجم (ml)	شمار عدد
	اختتامی (ml)	ابتدائی (ml)		
			20	1
			20	2
			20	3

حسابات:

$$V_1 = 20 \text{ ml} \quad \text{نامعلوم NaOH محلول کا حجم}$$

$$N_1 = ? \text{ N} \quad \text{نامعلوم NaOH محلول کی نارمالٹی}$$

$$V_2 = \text{ml} \quad \text{لنک محلول HCl کا حجم}$$

$$N_2 = \text{N} \quad \text{لنک محلول HCl کی نارمالٹی (Normality)}$$

نارمالٹی کی (Normality) مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \frac{Y}{\text{}} \text{ N (Normality) محلول کی نارمالٹی}$$

وزن کے حسابات:

$$= (\text{معادل وزن}) \times (\text{نارمالٹی}) \quad \text{ایک لیٹر کے محلول میں حل پذیر NaOH کی مقدار}$$

$$250 \text{ ml} = \frac{250 \times \text{معادل وزن} \times \text{نارمالٹی}}{1000}$$

$$= \frac{Y \times 40 \times 250}{1000}$$

$$= \frac{\text{ } \times 40 \times 250}{1000} \text{ g}$$

رپورٹ:

$$750 \text{ ml کے محلول میں حل پذیر NaOH کی مقدار} = \text{g}$$


5- آکسالیک ترشہ کا تخمینہ لگانا: (Estimation of Oxalic Acid)

مقصد:


دئے گئے نامعلوم محلول کے 1250 ml میں حل پذیر آکسالیک ترشہ کی مقدار کا تجزیہ تخمینہ (Estimate) لگائیے۔ اس کے لئے تمہیں سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ لنک محلول کی طرح اور 0.1010N نارمائیٹی (Normality) کا معیاری HCl محلول دیا گیا ہے۔

اصول:

HCl سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی تعدیل کو نیچے بتایا گیا ہے۔ اختتامی نقطہ کو ظاہر کرنے کے لئے، نمائندہ کی طرح فینا فتھیلین استعمال کیا جاتا ہے۔



آکسالیک ترشہ سے سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کی تعدیل کو نیچے دیا گیا ہے۔ اختتامی نقطہ کو ظاہر کرنے کے لئے نمائندہ کی طرح فینا فتھیلین استعمال کیا جاتا ہے۔



مختصر طریقہ کار:

شمار عدد	مواد (Content)	معاثرہ I	معاثرہ II
1	ظرفک (Burette) کا محلول	HCl (معیاری محلول)	آکسالیک ترشہ (نامعلوم محلول)
2	نالیچہ کا محلول (Pipette)	NaOH کا 20ml (لنک محلول)	NaOH کا 20ml (لنک محلول)
4	تپش	تجربہ گاہ کی تپش	تجربہ گاہ کی تپش
5	نمائندہ	فینا فتھیلین	فینا فتھیلین
6	اختتامی نقطہ	گلابی رنگ کا غائب ہو جانا	گلابی رنگ کا غائب ہو جانا
7	63 = آکسالیک ترشہ کا معادل وزن		

طریقہ کار:

معاثرہ I - (Titration-I)

معیاری HCl بمقابلہ (لنک NaOH)

ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ HCl محلول سے کھگال کر اسی HCl محلول سے صفر نشان تک بھر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک 20 ملی میٹر کے NaOH محلول کو نالیچہ سے پاک و صاف مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اس محلول میں نمائندہ فینا فتھیلین کے دو سے تین قطرے شامل کئے جاتے ہیں اور ظرفک (Burette) سے HCl کے خلاف معاثرہ (Titrate) کیا جاتا ہے۔ گلابی رنگ کے مکمل غائب ہونے تک HCl کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک (Burette) کے نگارشات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس طریقہ کو ہم آہنگ قیمت حاصل ہونے تک دہرایا جاتا ہے۔

معاثرہ-I (Titration-1)

(معیاری HCl) بمقابلہ (لنک NaOH)

شمار عدد	NaOH کا حجم (ml)	ظرفک کی نگارشات		ہم آہنگ قیمت معیاری HCl کا حجم (ml)
		ابتدائی (ml)	اختتامی (ml)	
1	20			
2	20			
3	20			

حسابات:

$$V_1 = 20 \text{ ml} \quad \text{NaOH (لنک) محلول کا حجم}$$

$$N_1 = ? \text{ N} \quad \text{NaOH (لنک) محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

$$V_2 = \text{ml} \quad \text{معیاری HCl محلول کا حجم}$$

$$N_2 = 0.1010 \text{ N} \quad \text{معیاری HCl محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

نارمالٹی (Normality) کی مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$N_1 = \frac{\times 0.1010}{20} =$$

$$N_1 = \frac{X}{\text{NaOH (لنک) محلول کی نارمالٹی (Normality)}}$$

معاثرہ-II (Titration-II)

(نامعلوم آکسائلک ترشہ) بمقابلہ (لنک NaOH)

ظرفک (Burette) کو پانی سے دھویا جاتا ہے۔ آکسائلک ترشہ سے کھگال کر اسی محلول سے صفر نشان تک پر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک 20ml کے NaOH محلول کو نالیچہ سے صاف مخروطی صراحی میں لیا جاتا ہے۔ اس محلول کے ساتھ نمائندہ فینا فٹھیلین کے دو سے تین قطرے شامل کئے جاتے ہیں اور ظرفک (Burette) سے آکسائلک ترشہ محلول کے خلاف معاثرہ (Titrate) کیا جاتا ہے۔ گلابی رنگ مکمل غائب ہونے تک آکسائلک ترشہ کو قطرہ بہ قطرہ شامل کیا جاتا ہے۔ ظرفک کی نگارشات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہم آہنگ قیمت حاصل ہونے تک اس طریقہ کو دہرایا جاتا ہے۔

(نک NaOH) بمقابلہ (نامعلوم آکسائلک ترشہ محلول)

شمار عدد	NaOH کا حجم (نک) (ml)	ظرف کی نگارشات		ہم آہنگ قیمت آکسائلک ترشہ کا حجم (ml)
		ابتدائی (ml)	اختتامی (ml)	
1	20			
2	20			
3	20			

حسابات:

$$V_1 = \text{ml} \quad \text{نامعلوم آکسائلک ترشہ کے محلول کا حجم}$$

$$N_1 = ? \quad \text{نامعلوم آکسائلک ترشہ کے محلول کی نارمالٹی Normality}$$

$$V_2 = 20 \text{ ml} \quad \text{NaOH محلول کا حجم}$$

$$N_2 = N \quad \text{NaOH محلول کی نارمالٹی (Normality)}$$

نارمالٹی کی (Normality) مساوات کے مطابق

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$$N_1 = \frac{Y}{\text{نامعلوم آکسائلک ترشہ کے محلول کی نارمالٹی (Normality)}} \times N$$

وزن کے حسابات :

$$(\text{معادل وزن}) \times (\text{نارمالٹی}) = \text{ایک لیٹر کے محلول میں حل پذیر آکسائلک ترشہ کی مقدار}$$

$$1250 \text{ ml} = \frac{1250 \times \text{معادل وزن} \times \text{نارمالٹی}}{1000}$$

$$= \frac{Y \times 63 \times 1250}{1000}$$

$$= \frac{Y \times 63 \times 1250}{1000}$$

$$= \text{g}$$

رپورٹ:

$$1250 \text{ ml} = \text{محلول میں حل پذیر آکسائلک ترشہ کی مقدار}$$

اصطلاحات - Glossary

Acidic oxide	ترشوی آکسائیڈ
Activated complex	فعال کامپلکس
Activation energy	فعال توانائی
Ambidentate ligand	دو طرف چھائے ہوئے لگینڈ
Amorphous solid	نقلمی ٹھوس
Amphoteric oxide	ترشوی اور قلعوی خواص رکھنے والے آکسائیڈ
Anionic complex	مشر وانی کامپلکس
Anisotropy	غیر ہم زوجیت
Antiferromagnetic	ضد فیرومقناطیسی
Basic oxide	اساسی آکسائیڈ
Blast furnace	جھکڑ بھٹی
Bleaching	رنگ کٹ
BM	بور میگنٹان
Body centered cubic unit cell	جسم مرکزی مکعبی اکائی خانہ
Brass	پیتل
Bronze	کانسی
Brown ring test	بھورے حلقے کی جانچ
Cast iron	خام لوہا / ڈھلوان لوہا
Catalysts	تماسیت
Cationic complex	منفروانی کامپلکس
Central metal ion	مرکزی دھاتی رواں
CFT	کرشل فیلڈ تھیوری
Chalcogens	چالکوجن
Chelating ligand	خلب سازی کے لگینڈ
Chemiluminescence	کیمیائی چمک
Chile saltpeter	چلی سالٹ پیٹر
Chromatography	کروماٹوگرافی
Close packed arrangement	قریب ترین پیک شدہ ترتیب
Coinage metals	سکہ سازی کی دھاتیں
Collision theory	تصادم کا نظریہ
Column chromatography	ستونی کروماٹوگرافی
Completely filled	مکمل طور پر بھرے ہوئے
Concentration of the ore	کچ دھاتوں کا ارتکاز

Conductivity	ایصالیت
Coordination compounds	ہم گرفتہ مرکبات
Coordination isomerism	ہم گرفتہ ہم ترکیب
Coordination number	کوآرڈی نیشن
Coordination sphere	کوآرڈی نیشن کرہ
Crystal defect	قلمی ٹھوس
Crystal field splitting	کرسٹل فیلڈ کا انتشار
Crystalline solid	ٹھوس قلمیں
Cupellation	دھاتوں کو صاف کرنے کا ایک طریقہ
Decay	گلنا سڑنا
Degenerate orbitals	زوال پذیر مدارے
Deliquescent	آب گیر شے
Density	کثافت
Dibasic acid	دوہرے ترشے
Diffraction	انکسار موج
Double salts	دوہرے نم
Ductility	تار پذیری
Earth's crust	قشر ارض
Edge	کنارہ
Electro metallurgy	برقی دھات کاری
Electrolytic refining	برقی تخلیص
Electroplating	برقی ملمع سازی
Enameling	مینا کاری
Excited state	مشتعل حالت
Extraction	حصول
Extrinsic semiconductor	بیرونی نیم موصل
Face	رخ، چہرہ
Face centered cubic unit cell	رخ مرکزی مکعبی اکائی خانہ
Facial isomer	رخ ہی ہم ترکیبے
Ferromagnetic	فیرو مقناطیسی
Flash photolysis	چمک سے ضیا پاشیدگی
Flints	چقماق
Fluorescence	فلوریت
Fluorescing surface	فلوریتی سطح

Froth floatation	جھاگ کے تیراؤ کا عمل
Galvanizing	جست کاری
Gangue	گل معدن
Garlic	لہسن
Geometrical isomerism	ہندسوی (شکلی) ہم ترکیبے
Gravity separation	جاذبی علیحدگی
Half filled	نیم بھرتی
Halogens	ہیلوجن
Hardness of water	پانی کی سختی
Heteroleptic complex	مختلف قسم کے لگائیڈ رکھنے والے کمپلکس
High spin complex	اعلیٰ گردش کے مرکبات
Hole	سوراخ
Homoleptic complex	ایک ہی قسم کے لگائیڈ رکھنے والے کمپلکس
Hybrid orbitals	مخلوط مدارے
Hydration energy	آبدگی کی توانائی
Hydro metallurgy	آبی دھات کاری
Hygroscopic	نم گیری
Incompressibility	دبا بنے کی خاصیت نہیں رکھنا
Indian saltpeter	پوٹاشیم نائٹریٹ
Inert gases	جامد گیسیں
Inert pair effect	جامد جوڑی کا اثر
Inner d orbital complex	اندرونی d مدار سے کمپلکس
Inner transition metals	دروں مروری/عبوری عناصر
Instantaneous rate of reaction	فوری شرح تعامل
Interfacial angle	بین رخ زاویہ
Interstitial defect	بین داخلی نقص
Interstitial void	بین داخلی گڑھا
Intrinsic semiconductor	اندرونی نیم موصل
Ionisation enthalpy	روانی انتھالپی
Ionisation isomerism	روانی ہم ترکیبیت
Isotropy	ہم رخ
Kinetic stability	فعلی قیام پذیری
Lanthanide contraction	لینتھانائیڈ کاسکیر
Lattice plane	جالی کی سطح

Leaching	ترولق
LFT	LFT
Ligands	لگینڈ
Linkage isomerism	رہی ہم ترکیبیت
Low spin complex	کم گردش کا کمپلکس
Luminescence	چمکیلا پن
Magnetic resonance imaging	مقناطیسی گمک سے خاکہ نگاری
Magnetic separation	مقناطیسی علیحدگی
Malleability	ورق پذیری
Meridional isomer	نصف النہاری ہم ترکیب
Metal deficiency defect	دھات کی کمی کا نقص
Metal excess defect	دھات کے اضافہ کا نقص
Metallic lustre	دھاتی چمک
Metalloids	دھتونت
Metallurgy	دھات سازی
Minerals	معدنیات
Molecularity	سالمیت
Molten state	پگھلی ہوئی حالت
Monobasic acid	ایک اساسی ترشہ
MOT	سامی مدار یوں کا کلیہ
Mustard	رائی، سرسوں
Negative catalyst	منفی تہاسی عامل
Nitrogenous fertilizers	نائٹروجنی کھاد
Octahedral	آٹھ سطحی
Opaque	غیر شفاف
Optical isomerism	بصری ہم ترکیبیت
Orbital angular momentum	مداری زاویائی معیار حرکت
Order of the reaction	شرح تعامل
Ores	کچ دھاتیں
Outer d orbital complex	بیرونی d مدار یہ کا کمپلکس
Oxidation number	تکسیدی عدد
Oxoanion	آکسو مشیر واں
Oxocations	آکسو منفرواں
Packing fraction	پیکنگ کی کسر
Phosphorescence	فاسفوریت

Photo sensitizer	ضیائی حساس
Photochemical reaction	ضیا کیمیائی تعامل
Pickling of steel	فولا دکوصاف کرنا
Pig iron	ڈھلو ان لوہا
Planar	سطحی
Positive catalyst	مثبت تہاسی عامل
Preservative	محفوظ گر
Primary valency	ابتدائی گرفت
Pulverization	کوٹنا/ توڑنا/ پینا
Pyro metallurgy	آتش/ حرارتی دھات سازی
Quantum efficiency	کوانٹم کی کارکردگی
Radioactive	تابکار
Rate constant	شرح کا مستقل
Refrigerant	مبرد
Rigid	سخت
Roasting	بھوننا
Rocket fuels	راکت کا ایندھن
Seaweeds	سمندری الجی
Secondary valency	ثانوی گرفت
Self-reduction	خود-تحويل
Simple cubic unit cell	سادہ مکعبی اکائی خانہ
Slag	دھاتی میل
Smelting	پگھلانا
Solvate isomerism	حل کرنے والا ہم ترکیبہ
Spectrochemical series	طیفی کیمیائی سلسلہ
Square planar	مربع سطحی
Stability constant	قیام پذیری کا مستقل
Stabilizers	قیام پذیری لانے والے
Strong field ligands	طاقتور میدان کے لگینڈ
Structural isomerism	ساختی ہم ترکیبیت
Successive reaction	سلسلہ وار تعامل
Super conducting magnets	اعلیٰ ایصالیت والے مقناطیس
Superconductivity	اعلیٰ موصلیت
Symmetry	تشاکل
Synergic effect	دواشیاء کا باہمی اثر

Tetrahedral	سہ پہلو اہرامی/چار سطحی
Thermal decomposition	حرارتی تحلیل
Thermodynamic stability	حرارتی قیام پذیری
Transition metals	مروری/عبوری عناصر
Transition state	مروری حالت
Tribasic acid	سہ اساسی ترشہ
Trigonal bipyramidal	تین سطحی دواہرامی
Trigonal pyramid	تین سطحی اہرامی
Unit cell	اکائی خانہ
Unpaired electrons	غیر جوڑی دار الیکٹران
Unpleasant	ناخوشگوار
Vapour phase refining	بخاراتی ہیئت کو صاف کرنا
VBT	گرفتگی بندش کا کلیہ
Void	گڑھا/خالی جگہ
Weak field ligand	کمزور میدان والے لگند
Wool	اولن
Wrought iron	پٹوان لوہا
Zone refining	منطقہ تخلیص

حوالہ جات:

1. Basic concept of chemistry, L. J. Malone & T. O. Dolter, 8th Edition.
2. Chemistry in your life, Colin Baird, 2nd Edition.
3. Chemistry structure and properties, N. J. Tro, 2nd Edition.
4. General chemistry, R. Chang, 5th Edition.
5. Introductory chemistry for today, S. L. Seagal, M. R. Slabaugh, 8th Edition.
6. Basic Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, G. Wilkinson and P. L. Gaus, 3rd Edition.
7. Inorganic chemistry principles structure and reactivity, O. K. Medhi, E. A. Keiter, J. E. Huheey, R. L. Keiter, 4th Edition.
8. Inorganic chemistry, A. K. De.
9. Inorganic chemistry, Holleman-wiberg, 1st Edition.
10. Elements of physical chemistry, P. Atkins, 7th Edition.
11. Physical chemistry, I. Levine, 6th Edition..
12. Physical chemistry, G. Mortimer, 3rd Edition.

Chemistry Volume-I - Class XII - Urdu Medium

کیمیاء برائے بارہویں جماعت

List of Translators and Reviewer

Translators :

Mubeen Taj,

P.G. Asst., Govt. Urdu HSS, Hosur, Krishnagiri Dt.

S.K. Shahida Begum,

B.T. Asst., Islamiah Boys' HSS, Vaniyambadi, Tirupattur Dt.

P.M. Fahmeeda Begum,

B.T. Asst., Nusrathul Islam GHSS, Pernambut, Vellore Dt.

S. Tahseen Begum,

B.T. Asst., Nusrathul Islam GHSS, Pernambut, Vellore Dt.

Hasan Mohamed Noorullah

B.T. Asst. Islamiah Boys' HSS, Vaniyambadi, Tirupattur Dt.

Reviewer

Mohamed Jaweed Akram

P.G. Asst., Islamiah Boys' HSS, Vaniyambadi, Tirupattur Dt.

Academic Head and Co-ordinator :

Dr. Mrs. Shameem,

Deputy Director, SCERT, Chennai

Co-ordinators :

Dr. R. Anbazhagan,

Principal, DIET, Ranipet District.

M. Suresh Kumar,

Lecturer, DIET, Ranipet,

A. Siva Kumar,

Lecturer, DIET, Ranipet

Mohamed Jaweed Akram

P.G. Asst., Islamiah Boys' HSS, Vaniyambadi, Tirupattur Dt.

Urdu DTP and Layout

TAJ Printers, Vaniyambadi.

This Book has been printed on 80 GSM Elegant Maplitho paper

Printed by Offset at :

مترجمین :

مبین تاج

پی. جی. اسٹنٹ، گورنمنٹ اردو ہائر سکول، ہوسور، ضلع کرشنگری

ایس۔ کے۔ شاہدہ بیگم

بی. ٹی. اسٹنٹ، اسلامیاہ گرلز ہائر سکول، وانم باڑی، ضلع ترپاتور

پی. ایم. فہمیدہ بیگم

بی. ٹی. اسٹنٹ، نصرت الاسلام گرلز ہائر سکول، پرنام ہٹ، ضلع ویلور

ایس. تحسین بیگم

بی. ٹی. اسٹنٹ، نصرت الاسلام گرلز ہائر سکول، پرنام ہٹ، ضلع ویلور

حسن محمد نور اللہ

بی. ٹی. اسٹنٹ، اسلامیاہ ہائر سکول، وانم باڑی۔

نظر ثانی

محمد جاوید اکرم

پی. جی. اسٹنٹ، اسلامیاہ ہائر سکول، وانم باڑی۔

تعلیمی سربراہ اور معاون

ڈاکٹر مسز شمیم

ڈپٹی ڈائریکٹر، ایس. بی. ای. آر. ٹی، چنئی۔

معاونین

ڈاکٹر آر. انبازگان

پرنسپل، DIET، رانی پیٹ

ایم. سورش کمار

اسٹنٹ پروفیسر، DIET، رانی پیٹ

اے۔ سواکمار

اسٹنٹ پروفیسر، DIET، رانی پیٹ

محمد جاوید اکرم،

پی. جی. اسٹنٹ، اسلامیاہ ہائر سکول،

وانم باڑی، ضلع ترپاتور

ترتیب و تزئین

تاج پرنٹرز، وانم باڑی۔